



## تقدمة الكتاب

لمولاي حضرة صاحب الدولة

واصفه باشا متصرف لبنان

المعظم

خير ما يبذل الإنسان في الهيئة الاجتماعية من المال والأعمال  
ما تقوم به فائدة العموم . وأجل الفوائد التي تحتاج اليها بلادنا هي التي  
توفر بها ثروة الزراع وتناول الى راحتهم . وإنما راحة البلاح و ثروته  
بزرعه وما شئت . وهكذا نفس القول في المكاري لأن قيام معيشته في  
ظهد ابنه . هذا فضلاً عن احتياج الفارس الى فرسه لاقامة عزه ونجاح  
اعماله . فالفائدة الشاملة لهذه الاسس الثلاثة التي عليها يتوقف صالح  
بلادنا هي التي قصدها عبدكم يا مولاي اقدمها خدمة لابناء وطني  
اللبنانيين خصوصاً ولسائر ابناء البلاد عمومًا مفتخرًا بان المرء تذكر  
بعده آثاره . وإذ كنتم دولتكم من اول تشريفكم بلادنا قد باشرتكم  
بالغيرة والهمة الاعمال التي لم تقصدوا بها الأرفاهيم الاها الى وخصب  
البلاد . واظهرتم من الميل الى ذلك ما يحرك كل قلب على الجدي في  
سبيل ارادتكم السنية راي عبدكم ضربة لازب الاهتمام بما فيه شي



من المنافع العمومية ولذلك قد شمرت عن ساعد الجهد ونويت  
 النية التي بها انال رضى دولتكم وتعطفانكم وباشرت تأليف هذا  
 الكتاب الوجيز العبارة الواقي بالغرض لسهولة ماخذهِ وجمعه  
 اشتات الاراء الصحيحة في فن الطب الحيواني آملاً أنه ينال المحظوة  
 الثامة في بلاد طالما تشوقت الى مبادئه وطالما تافست سائمتهام وماشيتها  
 لعدم تيسر وسائط طيبة تمنع الاضرار المرضية والوبائية. ولما ظننته  
 قد جاء طبق ما ينمى الجمهور وإفياً بكل ما فيه الفائدة المقصودة  
 تجاسرت ان اطرحه لدى دولتكم آملاً ان يفوز بالالتفات الشريف  
 فيكون لي بذلك الفخر الاعظم وكتابي النفوذ التام. سائلاً المولى  
 تعالى ان يؤيد دولتكم بالعز والاقبال وبصون مقامكم من كل شاغل  
 بال. انه وحده الطيب الشافي وله المنة والكرم الواقي

وبناء على رجائي الوطيد في التفات دولتكم الى مشروعي هذا المهم  
 واستعطافاً لرضاكم العالي اقدم لديكم هذه الايات راجياً حسن  
 قبولها

## الرجاء الوطيد

مثل اوصافك الغراء قد وجبا	نظم القوافي التي تسترخس الذهبيا
دين علينا مدح فيك حيث غدا	ظهوره رقصت منه الورى طربا
وكل نظم غدت ذكراك محوره	مجازته في سماع الكل قد عذبا

لو كان بنظمه من دون تروية  
 تلج عليه بجاياك الحميدة ما  
 ممط مناقبك الغراء بنظمها  
 لذلك ياتي صحيحا ما يو كذب  
 وكيف يكذب من يروي كما شهدت  
 وكيف تنكر اوصافك لك اشتهرت  
 اغرقت بالفضل شعبا انت حاكمه  
 ما يرتجون ويحرم المعد يغرم  
 والامن مد لواه فوقهم ولهم  
 والاهر قد صار عبدا خاضعا لم  
 وكلما طلبوا ليت دعوتهم  
 ما خاب فيك رجاء في تميمه  
 سهلت بين الوري طرق النجاة وما  
 ان لم تكن اهل ما نرجوه منك فمن  
 وانت اولي بما فيه تقدمنا  
 قدمت للغير بابا ليس بقرعه  
 ودمت اهلا لمدح نظم جوهره

بعض الاعاجم اعجب دونه العربا  
 يروي عنك فان يحسن فلا عجا  
 يو فيسهل معه كفيها انقلبا  
 واحسن المدح ما لم يالف الكذبا  
 عناه او سمعت اذناه ما كتبنا  
 وبنجة البدر لا تخفى وان حجبا  
 حتى غدوا لك اولادنا وصرت ابا  
 من بعد هذا ودوح الخير قد خصبا  
 روض الهنا وطيب النفس قد رحبا  
 فلا يخافون من احكام عطا  
 يامن غيوت نداء نسبق الطلبا  
 خبر لمن ينتهي من فضلك الاربا  
 نراك الالفعل الخير متدبا  
 عليه يستند الراجي بما رغبنا  
 يامن يجود يديه بفضل العجا  
 راجيه الا لاني منك الذي طلبنا  
 لثل اوصافك الغراء قد وجبا

بنده

جرجس طنوس عون  
 اللبناني

## مقدمة

### في البيطرة

ويقال ايضاً الطب البيطري او الحيواني

هو علم يبحث فيه عن احوال الحيوانات الالهية من حيث معالجة امراضها وحفظ صحتها والاعتناء بشانها. وقد كان هذا الفن محصوراً في طب الخيل وغيرها من ذوات الحافر ثم عم سائر الحيوانات الالهية فصار يعبر عنه بالطب الحيواني وبالتوسع يشمل كل حيوان للانسان عليه تسلط وله منه منفعة من دواب وطيور وزواحف تربي في البيوت. وهذا العلم من اجل فروع الطب لكن لم يعن بشانه الا في العصر المتاخرة وخصوصاً في بلاد اوربا فكان يتقدم بتقديم صناعة الطب لان بنية الحيوانات كبنية الانسان من حيث نموها وصحتها وتعرضها للعلل الى غير ذلك. واذا كان بعض الحيوانات عظيم النفع في اشغال الانسان كان الاضطراب الى اتيان هذا الفن ضربة لازب لان الحيوانات اذا ضربت بوبا اضررت كثيراً بالناس وبالبلاد معاً. مثال ذلك ضربة مصر التي

ماتت بها كل حيوانات المصربين والضربة التي وقعت بها الفروح  
على الناس والحيوانات. وفي كتابات ابقراط وارسطو ملاحظات  
مدققة على امراض الحيوانات. غير ان كتاباتهم لم يلتفت اليها حتى  
مع كثرة مباحثها في تشريح الحيوانات وامراضها وقانون صحتها فكان  
الفن مقتصرًا عليه عند الفلاحين والرعاة بطريق الاختبار لا بقواعد  
يبني عليها. وفي القرن الثامن عشر اخذ اطباء يعتنون فيه ويكتبون  
الرسائل الجليلة. والذي نبه افكارهم الى ذلك خصوصًا هو الوباء  
الحيواني الذي ائلف ماشية اوربا اتلافًا عظيمًا. ومعاودة سنة ١٧٧٤  
نبهت الافكار الى اقامة جمعية طبية تشتغل في معالجة الوباء وتعني  
في امور التحفظ من وفودها وصارت الحكومة تنشط الكتبية فكتبوا  
كثيرًا الى ان انشئت المدرسة البيطرية في ليون من فرنسا فنشأ فيها  
العلم نشأً صحيحًا واخذ مقامًا خاصًا بين الفروع الطبية وساعد ملك  
فرنسا لويس الرابع عشر بنحو ٥٠ ألف فرنك في امور تتعلق بهذا الفن  
تنشيطًا لاربابه وسماها بالمدرسة الملكية البيطرية وجعل لها امتيازات  
جليلة. ويا حبذا لو التفت دولتنا العلية الى هذا الامر بعين المساعدة  
الخاصة فان بلادنا السورية في غاية الاحتياج الى اناس لم خبرة  
كافية في هذا الفن

واعلم ان طب الانسان والحيوان واحد لا فرق بينهما الا بقوة

التشخيص ومقادير الادوية وصعوبة سياسة الحيوان وعدم خضوعه لقانون. واذ ليس في بلادنا السورية كتب وافية تقريباً بهذا الفن اجهدت نفسي بجمع ما تيسر لي جمعة اما من لسان اهل الخبرة او نقلاً عن كتب عربية وافرنجية وحاولت اخنصار الشرح وحسن التعبير لتكون مجموعتي هذه سهلة المأخذ جديدة باطلاع العالم وقرية حتى من فهم الساذج. وعشي انها تحوز القبول عند اصحاب الماشية الذين مها علمتهم التجارب يضطروا احياناً الى قانون يستشيرونه او الى علاج غير الذي جربوه واملي وطيد معرفتي بما بابناء بلادي من محبة المناظرة والتقليد ان مولني هذا ينهض هم اصحاب الاقلام فيبنون على ما اسست ويثمون ما بدأت ويسطون ما لخصت

وقبل ان ندخل في البحث عن امراض الحيوانات وعلاجاتها نتكلم اولاً عن كل حيوان على حدة لنبين للقاري نوعية ذلك الحيوان وطبائعه ومنافعه وكيفية تربيته والاعناء بتحسين حاله من حيث النمو والكياسة الى غير ذلك مما تجب معرفته وتلذذ مطالعته ومن المعلوم ان مواليد الطبيعة ثلاث فئات او مالك. معدنية ونباتية وحيوانية. فالملكة الحيوانية تتضمن ما كان ذا حيوة وحس وحركة ارادية ومنها قوة الهضم والتوليد. وقد قسموها الى اربعة اقسام

رئيسة اولاً الفقرية (ذوات السلسلة الظهرية المولفة من الفقار)  
 ثانياً المفصلية اي التي جسمها مولف من قطعة ذات مفاصل  
 كالحشرات والديدان . ثالثاً الرخوة او الهلامية اي التي ليس  
 فيها عظم ولا مفصل كالاخطبوط والاصداف . رابعاً الشعاعية او  
 الحيوانية النباتية كالتوتيا البحرية والاسفنج . وقسموا القسم الاول  
 الى اربعة صفوف اولاً الثديية ثانياً الطيور ثالثاً الزواحف  
 رابعاً الاسماك . ولا اتكلم في كتابي هذا الا عن ذوات  
 الاربع من الحيوانات الثديية التي تخدم الانسان  
 وتغذيه بلحمها ولبنها وتكسوهُ بجلدها  
 وشعرها



## القسم الاول

في طبائع الدواب الاهلية

الباب الاول في ذوات الحافر من آكلة النبات

الفصل الاول في الخيل

الفرس حيوان ثديي من ذوات الحافر السمكية الجلد غير  
المجتر. ذوا صبع واحدة غير ظاهرة لانها ضمن الحافر وللفرس ٤٢ سنًا  
وست قواطع فوقية وست تحنية ونابان فوقيتان ونابان تحنيتان  
بينهما وبين الاضراس خلوة يناسب لوضع اللجام وله اربعة عشر  
ضرسًا فوقية واثنا عشر ضرسًا تحنية اكليلها خشن. وتختلط  
الخيل للتناسل بمجوانات اخرى كالحمار الاهلي وحمار الوحش وغيرها  
ولا يهجن منها سوى الفرس والحمار. واما البغل فهو مولد من الحمار  
والحجرة. والنغل من الاتان والحصان وهما عقيمان طبيعًا مع ان اعضاء  
التناسل فيها تامة ولهما ميل شديد الى التزو

والخيل توجد في جميع اقطار الارض لانها رافقت الانسان في  
مجاهراته وهي مختلفة القدود والالوان كما هو معروف وشعر بعض الخيل

مستطيل جعد قليلاً ولكن الغالب ان يكون قصيراً سبطاً وتكون  
ان يكون جلد بعضها اجرد. واما اذانها فلا تقوت الفتر طويلاً وليس  
على سراتها اي اعلى ظهرها شعر مستطيل وعلى اكتافها خط اسود من  
الشعر واذنانها مزينة بشعر من عكوبها الى طرفها

وقال العالم بوفون اعظم نصر فازه الانسان هو انتصاره  
على ذلك الحيوان الكريم المحمس الذي يشاركه في اتعاب الحرب  
ومجد الظفر. اما لحم الخيل فالذين تعودوا اكله يقولون انه لذيق حال  
كونه موافقاً للصحة والاوربيون ياكلونه ويظن ان قلة الحيوانات  
المعول على اكل لحومها تلجئ الى تعميم اكل لحم الخيل ويبيع في مجازر  
مخصوصة في فرنسا والنمسا وباقاريا وهانوفر وغيرها

واكرم الخيل العربية وان لم تكن اجمالها. والفرس العربي  
ذو راس مستوي الجهات وجبهة مستقيمة او قريية من الاستقامة  
وعنق مستقيمة وعضلات واعصاب ناشئة وحوافر صلبة صغيرة  
وشعر ناعم ومفاصل متينة وصدر متسع وقوائم دقيقة عصبية وهي  
قوية جداً سريعة. تلوح على وجوها لوائح المجد. واكرم الخيل العربية  
خيل نجد وعنزة واثانها غالبية جداً فيبيع الفرس من ٤٠ الى ٦٠  
الف غرش والانات منها تباع باكثر من ذلك. وسنة ١٨٥١ ارسلت  
الحكومة الفرنسية موسيو بتنيو الى الشرق لايتباع خيل كريمة فراى



حجرة ورغب ان يشتريها باربعة مائة وثلاثين الف غرش ولم تعط  
 له. والسبب في تفضيل الاثني على الذكر الارتفاع بها بالتوليد.  
 ومن الموكد ان اكرم اجناس الخيل واقدرها واشدها عدوا واجملها  
 واكثرها صبرا على الاتعاب واحتمال الشدائد هي الافراس العربية  
 وما هو من نسلها وان كان مختلطاً بخنسٍ اخر. وهي لاتزال تعد في  
 الرتبة الاولى عند جميع امم الدنيا

واما الخيل الشامية اي خيل سورية المشهورة فخمسة اصناف  
 وهي نجادى صفلاوية. وام عرقوب. والشويما. وكحيلة العجوز.  
 وعيبة. ويقال ان الصفلاوية سميت كذلك لصقالة شعرها وكان  
 اسم صاحبها الاول جدران فسموها صفلاوية جدران. وام عرقوب  
 لالتواء عرقوبها واسم صاحبها شوية. والشويما لشامات كانت بها  
 واسم صاحبها سباح فقبل لها شويمة السباح. والكحيلة لكل عينها  
 وكان اسم صاحبها العجوز فسميت كحيلة العجوز. والعيبة لوقوع عبادة  
 صاحبها حين تسابق اصحاب هذه الخيل المذكورين بعد ان تيسر  
 لهم تدجينها فانها كانت ابدة اي بريّة. ويقال ان العيبة لاتزال  
 رافعة ذيلها والمباحة عليه الى اخر السباق واسم صاحبها شراك فقيل  
 لها عيبة الشراك. ويقال ان جميع خيل سورية الكريمة من نسل هذه  
 الافراس. ولها فروع. وفروع صفلاوية الجدران. صفلاوية او يبرية

وصفلاوية نجبة الصبح. وصفلاوية امرية. وصفلاوية قميصية.  
 وفرع ام عرقوب. اشبكي. وفرع شوية السباح. شوية الكيشا.  
 وفروع كحلة العجوز. راس الفداوي وكحلة الثامري. وكحلة الجنوب  
 وكحلة المعارف. وكحلة المنديل. وكحلة المضي. وكحلة المشهور.  
 وكحلة النعام. وكحلة الجوهرة. وكحلة الشريف. وكحلة الاخرس  
 وكحلة مخلدية. وكحلة حمدان السامري. وكحلة الطوسية. وكحلة  
 ودنا الخريس. وكحلة معنقة. وكحلة حرجية وكحلة الجريسا.  
 وكحلة ام عامر. وفروع عية. عية الشراك. وعية ام جريس.  
 وعية الخضر. وعية هدبا البشير. وفي سوريا صنف اخر من  
 الخيل الكريمة يسمى هدابة وهو خمسة اقسام ايضا جلتي. ومعنقة.  
 ودعجانية وجعيثنية. وفريجية. ولها فروع ايضا فروع الجلفي.  
 جلقة سعد الطوفان. وجلقة الغصيني. وجلقة الفطيسي. وجلقة  
 العجي. وفرع المعنقة. معنقة السيني. وقد اجمع العرب على ان  
 اصل جميع هذه الفروع كحلة العجوز. واكرم الكحيلات كحيلات بني  
 مدلج والنجاديات. ومن فحول هذه الاصناف العشرة ما يصلح  
 للتزو ومنها ما لا يصلح له. فيقولون ان ام التي لا تصلح للتزو مظلومة  
 لانها علفت من فحل اصل ابيه مجهول. وينسبون الفحل الى امه.  
 ومن اشهر الخيل الان خيل مشايخ بني ظافر وهم مشايخ قبيلة نعيم بين

بغداد والبصرة ولا يبيعونها باغلى الاثمان وخيل بجبل اوراس بين  
تونس وقسنطينة

وفي جلد الفرس دوائر تولدها هيئة الشعر ويقال لها النياشين  
والخلالات. فمنها مدوح ومنها مذموم. فالمدوح نيشان العمود وهو الذي  
في موضع القلادة قريب من المعرفة ونيشان السامة وهو في وسط  
العنق. ونيشان الهقعة وهو في عرض زور الفرس تحت ابطه قيل ان  
المقوق لا يسبق ابداً وقيل انه ابني الخيل واصبرها ونيشان اللطاة  
اذا كان مفركاً مدح واذا تعدد ذم ويعرف بالنطاحي وهو في وسط  
الجبهة. ونيشان اللاهذ وهو الذي يكون في العظم الثاني في الخي  
تحت الاذن ونيشان البيئقة وهو في نحر الفرس ونيشان القالع وهو  
الذي تحت اللبد. ونيشان الناحس وهو الذين تحت الفخذ وهو  
محل ضرب الفرس بذنبه على فخذه وبقية النياشين مسكوت عنها  
ومن النياشين التي ذكرت بالثمين والبركة انه اذا كان الفرس  
على جفنته العليا دأثره او في صدره او على خاصرته او على نحره وفي  
عنفه او على اذنيه شعر نبات كزهر النبات كان ذلك الفرس ما  
يربط وتنفى عليه الحوائج ويكون صاحبه موفقاً لا يرى في اموره الا  
خيراً. ومن النياشين التي يتشاعم بها ما كان في مقدم يده دائرة  
او في ركبته او في اصل اذنيه من الجانيين او على خده او على جفنته

السفلى او على ملتقى الحية او على شترته او على بطنه شعر منتشر او على خصيتيه شعر مخالف للونه

وما يذكر في الخيل ايضا الفرة وهي انواع لطيفة وشاذة وسائلة وشمراخ ومنقطعة وسارحة وحنفا وشهبا ومنمصرة. فاللطي هي التي يصيب بياضها عيني الفرس او احدها او خذيه او احدهما. واذا فشت في الوجه ودقت وسالت ولم تنصب العينين فهي شاذة واذا اعتدلت على قصبة الانف وعرضت في الجبهة او سالت على الارنية حتى رثمتها فهي سائلة واذا دقت وسالت في الجبهة وعلى قصبة الانف ولم تبلغ المحفلة فهي شمراخ واذا بلغت محل الرسن ثم انقطعت فهي منقطعة وهي احسن الفرر واذا كان البياض من المخر ثم ارتفع حتى بلغ العينين ولم يبلغ الجبهة فهي ايضا منقطعة وان ملأت الوجه ولم تبلغ العينين فهي سارحة وان كان فيها شعر يخالف البياض فهي شهبا وان كانت على الجبهة وعلى قصبة الانف وبين العينين منقطعة فهي منمصرة. والحاصل ان كل بياض فشا في وجه الخيل فوق الدرهم يسمى غرة على اختلاف انواعها كما تقدم فان كان بقدر الدرهم فادونه فهي القرحة. والقرحة ان كانت بين العينين فهي فجحة وهي احسن القرحة فان كانت على المحفلة العليا فهي رثما وان كانت على المحفلة السفلى فهي لمظا وان كانت على

قصبة الانف فهي عيسوب . والغرة ان استدارت وحكت حرف الهاء في الكتابة فانها تدل على اليمن والبركة وانه لا يصاب عليها فارس والشعرات القليلة خير ونجاة . والسائلة ان غطت عيناً واحدة فانها تدل على الشؤم وانها تقتل مع راكبها ومنهم من خص هذا بالعين الشمال فان غطت الاثنتين فانها تدل على انها تعصب ويقهر صاحبها فان كانت مائلة الى جهة اليمن فانها تدل على الشؤم وإلى جهة اليسار تدل على المكاسب والمغانم فان سالت الى الانف فانها تدل على البركة والنسل المجيد ونجاح الحال والمنقطة دون الانف عكسها وان عمت الحاجب فلا خير فيها

وما يحسن فيها أيضاً التحجيل وهو بياض يكون في قوائم الفرس يبلغ نصف الوظيف ما خوذ من الحجل وهو القيد أو الخخال فاذا اصاب البياض القوائم كلها فهو محجل اربع وان كان في ثلاث قوائم فهو محجل ثلاث مطلق يد او رجل اليمنى او يسرى . فكل قائمة فيها بياض فهي ممسكة وان كانت خالية من البياض فهي مطلقة واذا كان التحجيل بخلاف هذا قل او كثر فهو مشكول وهو مكروه عند الشارع والشكل ان يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى او يده اليمنى ورجله اليسرى ويعرف الشكل في القطر الشامي بالجبراص . وتحجيل القوائم ارجل واعصم فالارجل هو الذي يكون

البياض في احدى رجليه وهو مستكره الا ان يكون فيه وضع وقيل  
لا يستكره الا اذا كان البياض في رجله اليسرى فان كان في اليمنى  
فهو غير مستكره. والاعصم هو الذي يكون البياض باحدى يديه  
قل اوكثر فان كان في اليمنى فهو اعصم اليمنى وان كان في اليسرى فهو  
اعصم اليسرى ويقال له حيثئذ منكوس اليسرى وهو مكروه وان كان  
البياض بيديه جميعاً فهو اعصم اليدين الا ان يكون بوجهه وضع  
فيقال له محجل ويذهب عنه اعصم. وان كان باحدى يديه بياض  
فهو اعصم لا يقع عليه وضع الوجه اسم التحجيل. ووضع القوائم تخديم  
وتجيب ومسرول واخرج فان جاوز البياض الارساغ فهو تخديم  
وان ارتفع في القوائم الى الحجب فافوق ذلك ما لم يبلغ الركبتين  
والعرقوبين فهو تجيب وان بلغ الركبتين والعرقوبين او جاوز  
العضدين والتخذين فهو مسرول الى ان يبلغ الذراعين والساقين  
فهو اخرج وكل بياض في التحجيل مستطيل فهو مستريح. وشرط  
التحجيل الادارة. وان خلا البدن من البياض يسمى بهيماً والفرس الذي  
في ذنبه او ناصيته او قذله خصلة بيضاء يسمى اشعل

— ١٠٠ —

في اسماء مفاصل الفرس ومنابت شعره واسنانه  
سراة كل فرس اعلاه. والفونس ما بين اذنيه. والناصية

الشعر المسترسل على الجبهة والفدال مجمع مؤخر الراس وهو محل عقد العذار. والعرف ما ينبت من شعر العنق الى عززته. والعزرة الشعر الذي يقبض عليه الراكب حين ينهض الفرس ومحل منبت العرف يسمى المعرفة. ويكنف العرف عرقان تسميان عليا وعت. والعصنور العظم الظاهر في الجبين والناهقان عظامان اسفل عينيهِ وصفحنا الوجه هما الخدان والمرسن من انفه حيث مصاب الرسن. والمنخران هما المنخران مخرج النفس ونخرة الانف مارق من فوقه ولان. وشفتاهما الحفلتان والغيدما الشعرتان النابتان فوق الشفتين. والفم فيه اربع ثنايا واربع رباعيات وبعدهن اربع تسمى قوارح. واربع انياب وثمانية اضراس في كل شق اثنتان. وصفحنا العنق تسميان صليفتين والجلدة التي بين العنق والمنخر تسمى الجران. وما جرى عليه سير اللبب يسمى اللبان ويقال له لبة. والكلكل الصدر. والصدر ما عرض عند ملتقى اعلى يديه ما يلي العنق. والحفمتان اللتان في الزور تسميان فهدتين. والحمارك الكاهل وهو ملتقى فروع كتفيه. والصردان هما العظامان اللذان يكتنفان جنبي اللسان. وصهوة الفرس حيث يقعد فارسة. والنقطة مكان الردف. والمعد هو الذي تقع عليه دفنا السرج. والمخزم الذي يجري عليه سير الحزام. والمحصير جنبه وهو ما ظهر من اعالي ضلوعه. والحجبات راس

الوركين. والعكوة أصل الذنب وعظمه وجلده يسمى عسيباً. والشعر الذي عليه يسمى سيبياً وهلباً وقيل السيب يطلق على الناصية فقط ومضرباً ذنبه على فخذه يقال لها جاعرتان والصلوان عرقان في مضربي الذنب. والغائلان عرقان في الفخذين. والنسوان عرقان في الساقين ولحمتا الساقين يقال لها حاميتان وفي اليدين العضدان واسم رؤوس العضدين من أعلى وأبلىتان. والذراعان هما العضوان من تحت ومن فوقهما العضدان ومنتهى أحدهما من اليدين الركبتان وفي الركبتين عظام مدوران يسميان ذنا غضتين. والوظيفان من اليدين ما بين الركبتين والرسغين. وفي الوظيف ثنية من شعر تكون فوق الرسغ. والرسغ هو المفصل الذي يكفئه الحافر والوظيف. والسنبك طرف مقدم الحافر. وعن يمينه ويساره حاميتان. والصحن جوف الحافر. والذي في باطنه مثل النوى يسمى نسرأ. والشوى من ذوات الأربع هي القوائم



### التقفيز

هو نزول الذكر على الأنثى. فينبغي أن يكون في أول النهار في فصل الربيع لأن مداره على زمن تقع فيه الولادة وقد ذهب البرد فان المولود في الشتاء لا يتبع فعله هذا يكون التقفيز بالشام مثلاً



في شهر نيسان وبمصر في شباط حتى تلد في اول الربيع وياكل الفلوق  
 الفصيل بعد اربعين يوماً لان اصح الخيل ما اكل الفصيل وهو فلولو.  
 وقبل التنفيذ ينبغي ان يغسل الفرج بما بارد وتمشي الاثني وبعد ذلك  
 تلزم الراحة ولا تعلق رطباً ولا تسمع صهيل فحل الى احد وعشرين  
 يوماً فان انكش الفرج وسال منه شيء كالخياط ونفرت من الفحل  
 فقد علفت ولا يعرض عليها فان نفقت مراراً وظهرت علامات  
 الرطوبة كالسيلان ونحوه فارغ الصابون على اليد وادخلها في  
 الفرج واخرج الام بلطف واغسلها واعد عليها التزوفاتها تحمل.  
 ومن علامات الحمل ان يصغر طرف فرجها وينكش. ومدة حمل  
 الحجرة احد عشر شهراً وتضع في الثاني عشر. ومتى درت الحمة  
 اليمنى او اسودت الحلمات كثيراً او حلبت على الظفر وسال  
 الحليب فالحمل ذكر. واعلم ان الضراب اذا كثر على الفحل يضره  
 ويحدث فيه امراضاً متنوعة خصوصاً اذا كان معداً للركوب فغاية  
 ما يسمح به للضراب خمس مرات الى ثمان في السنة كلها. واما اذا  
 كان غير معد للركوب فيسمح بضرايه بدون تحديد عدد مخصوص

— ١٠٠٤ —

### في الافلية وعلامات اسنانها

ينبغي ان لا يفظم الفلواً بعد سبعة اشهر ومتى فطم يسقى

حلياً شهراً ثم شهرين مضافاً إليه دقيق الشعر ثم من شاء فليزد  
 الى ان يتم له سنة فانه ابلغ في نجه وقوته . وبعد خمسة ايام الى  
 سبعة من نجه الافلية تنبت ثناياها ومن الشهر الى الشهرين  
 تنبت رباعياتها ومن السبعة الى التسعة تنبت انيابها ومن  
 الثانية الى العشرة تنبت اضراسها وإذا بلغت من العمر سنة ودخلت  
 في الثانية تسمى حولية وعند دخولها في الثالثة تسمى جوارح وفيها تبدل  
 ثناياها واما اذا كان الابوان شابين فيتاخر القاءها الى السنة  
 الرابعة واذا كانا هرمين تلقىها وهي حولية . ثم تجزع وترجع وتقرح  
 في حول واحد فاذا دخلت في السنة الرابعة تبدل رباعياتها  
 وتنبت انيابها واما في الخامسة فهي قوارح وتبدل انيابها وهي التي  
 تسمى قوارح ومن الخامسة الى الثانية اعوام تسمى قوارح ثم تبندى في  
 النقص الى الاربعة عشر واذا تجاوزتها لا تبقى فيها منفعة لكر ولا  
 لفر ولا تصلح الا للتقفيز . وعلامة تبديل الخيل اسنانها ان التي لم  
 تبدلها تكون بيضاء ملساء والتي ابدلتها تضرب الى الصفرة وتكون  
 فيها شقوق وتكون اكبر من التي لم تبدلها واضراسها لا تبدل منها  
 شيئاً الا لعلة

### علف الخيل

علف الخيل بحسب البلاد والعادة ولاداعي لتعيين العلف

من نوع مخصوص ولا تقديره وقد يبرن الحيوان على ما ليس من شأنه تناوله كخيل التنر في أكل اللحم وللشعير فعل في كل ذي حافر وينبغي تنقية العلف ولا يعطى إلا بمقدار ويرش معه قليل ملح. وينبغي أن تعلق الخيل صباحاً نصف ما تعلقه مساءً ولا تعلق ولا تسقى حال تعبها وينبغي تقليل التبت لها وإن تورد الماء كل وقت وإن يكون الاصطبل مفروشاً برمل أو الواح أو أن ينشف تحت الخيل كل يوم بالزبل الناشف لأن رطوبة التراب والأرض تضر بالحوافر وتلينها. وينبغي علو المعلق وإن يكون أسفل على هيئة غربال ليتزل غبار العلف ولا يدخل في مناخر الفرس ويحصل منه ضرر. وينبغي مسح أبدان الخيل كل يوم صباحاً. واجود علف الربيع للخيل البرسيم لأنه ينقي بطن الحيوان من الأذى وبعده الفصيل والفصة والبقية وينبغي أن يكون الفصيل طويلاً لم يثر لأن المثير يخشن الحلق ويحدث منه سعال. وإذا سهلت الخيل تحفظ من البرد وإذا انعقد جوفها يخفف غطاؤها. قيل إذا كان بالخيل جرب أو حكة يؤخذ من أسهال جوفها ويحك به الحبل المصاب. وينبغي أن تربع الخيل أربعين يوماً لا تتركب في مديتها وبعد تربيعها تعلق شعيراً منقوعاً نحو أسبوع

## الفصل الثاني

### في الحبيرة

الحمار من الحيوانات الاهلية الكثيرة النفع وهو الطمها خلقاً  
واسهلها مراساً واصبرها على المشقة وادناها استخداماً واكثرها خدمة.  
والعرب تكني الحمار ابا صابر. واما زياد وهو الاشهر. ويقال للانان  
ام تولب. وام جحش. وام نافع. وام وهب. وقد يطلق على الحمار  
اسم غير ايضاً قال الدميري وليس من الحيوان ما يترو على غير  
جنسه وبلغ الأحمار والفرس غير ان هذا القول منقوض حتى من  
نفس كلام العرب. وهو يترو اذا اتم ٢٠ شهراً. ومنه نوع يصلح لحمل  
الاثقال ونوع لين الاعطاف سريع العدو. ومن عجيب امره انه اذا  
شم رائحة الاسد رمى نفسه عليه من شدة الخوف يريد بذلك الفرار  
منه. ووصف الحمار بالهداية الى سلوك الطرقات التي مشى فيها  
ولو مرة واحدة وبجدة السمع. وللناس في مدحه وذميه اقوال متباينة  
بحسب الاغراض. وهو معدود عند علماء الحيوان بين الحيوانات  
الثديية نوعاً من جنس الفرس. قال بوفون في وصفه "هذا  
الحيوان من طبعه وضع. صبور. ذو سكونة يقبل بلا تضجر الاهانة  
والضرب ومهما قدموا له من العلف لا يانف ولا يهتف امر من كنية

طعامه وكيفيته فانه يمنع باليسير والردي من النبات وغيره من فضلات الدواب لكنه يعاف الماء الأصافياً طيباً. وإذا كانوا لا يعانون كثيراً امر تنظيفه تراه غالباً يتمرغ على الكلال والتراب غير مبالٍ بحمله إذا كان حاملاً فكلما قدر ان ينام ويتمرغ لا يتوانى في مصلحة نفسه. وهو يقبل التعليم. وقد شوهدت حمير كثيرة علمت اعمالاً مضحكة لطيفة تدل على فطنة وخفة روح وبدن. وربما كان الحمار اقدر الحيوانات على كبر الجهل بالنسبة الى حجمه. ولما كانت نفقته قليلة كانت منافعه كثيرة لاهل الفلاحة والمطاحن ومع ما للحمار من المنافع والصفات الحميدة ترى له صفات قبيحة من وجه اخر فان نهيقه مزعج مكدر وقد يحزن مراراً حتى لو اهلكوه ضرباً لم يذعن ولا يغير ما اضر في نفسه ومع ذلك فهو على جانب عظيم من الحذق والفضة وان كان الناس يضربون به المثل في البلاهة وقلة الفهم. وليس للحمار عادة طاعة على سلوك الجبال كما يسلك السهل ولا على الطرق المستوعرة الخشنة كما على الطرق المستسهلة البسيطة. وما يفرق به الحمار عن الفرس امر معروف عند الجميع فلا احد يجهل ان راسه اخم واقصر وان اذنيه اطول وذنبه ليس فيه شعر طويل الا ملك الخصلة في طرفه واشهر ما يميز به عن سائر الحيوانات لاعن الفرس فقط جهره صوته وطريقة

نهيجه المردد المستطيل. ومعدل عمر الحمار من خمس عشرة سنة  
فما فوقها الى عشرين ويندران يتجاوزها. ومدة حمل الانثى ١١ اشهرًا  
وهي تلد عنقًا واحدًا. وحبر قبرص حسنة الاشكال نشيطة خفيفة  
السير قادرة على نقل الاحمال وفي كثير من البلدان يتخذها الاكابر  
مطية عوض الفرس. ولجلد الحمار منافع كثيرة في الصناعة فلحرونته  
ومنتاه يتخذ رقا للطبول ونحوها ورقوقا للكتابة ويصنع منه  
السخيان المعروف بالشاكرين عند الافرنج



## الفصل الثالث

### في البغال

البغل يطلق على كل حيوان متولد من حيوانين مختلفي  
النوع والمعروف عند الاطلاق انه الحيوان الاهلي المتولد من الحمار  
والفرس وبالعكس وهذا يسمى نغلا كما مر. قالوا فان كان الذكر  
حمارا فالبغل شديد الشبه بالفرس وان كان فرسا فشديد الشبه  
بالحمار. وكذلك اخلاقه مختلفة فليس له ذكاء الفرس ولا بلادة  
الحمار وله صبر الحمار وقوة الفرس. ويوصف برداهة الاخلاق والثلون

لاجل التركيب وعلى ذلك قال بعضهم  
 خلق الله جديداً كل يوم <sup>م</sup> مثل اخلاق البغال  
 ولكنه يوصف بالهداية في كل طريق يسلكه مرة واحدة وفي  
 جلده على الاحمال الثقيلة . واما اعضاؤه فقليل ان كل واحد منها  
 مشترك بين الفرس والحمار . اما راسه فهو اضخم واقصر من راس  
 الفرس واذنه قريبة الطول من اذان الحمار وسوقه قاسية وذيله  
 قليل الشعر ولكن جسده اقرب في الكبر الى جسد الفرس وكذلك  
 تقاطيع جسده وهيئة . وهو قلما يكبو ولذلك يستخدم في الاسفار  
 الجبلية ويستخدم ايضا مكان الفرس في جر العجلات وما شاكل  
 ذلك

والبغل من الحيوانات الالهية الكبيرة القيمة وهو معروف  
 بصفاته منذ الازمنة القديمة وطالما استعمل مركبا للملوك والفضة  
 والعلماء وامثالهم وكانوا يزينونه بافخر الزينة . والمعروف ان البغل  
 عقيم ولكن في حوادث سنة ٤٤٤ هجرية من تاريخ ابن البطريق ان  
 بغلة ولدت في بطن واحد حجرة سوداء وبغلا ابيض . وهذا اعجب  
 ما سمع . ونسب بعضهم السبب في العقم الى ان النطفة لاتعلق برحم  
 البغلة وقيل بل تعلق ولكن لا يخرج الجنين الا ويقتل الام لضيق  
 المخرج وبناء عليه لايتى على انثى البغل . واما الذكر فيخصونه

لكي تبقى فيه القوة المعروفة بها ولذلك قيل بطول عمره ايضاً .  
والبغال في بلادنا السورية كثيرة وهي اهم من غيرها لنقل الاثقال  
وقلما يستخدم سواها . وجاء في امثال العرب قيل للبغل من ابوك  
قال الفرس خالي وقالوا اعقر من بغل واعقم من بغلة . وقد ذكر  
العرب لاجزاء البغل خواص كثيرة كما ذكروا غيره من الحيوانات  
وفي امور لا يصدق منها الا ما جرب طباً او اشهر بمنفعة من المنافع



## الباب الثاني

في المجرة وهي ذوات الطلف والمخض


المجرة هي التي تمضغ اكلها ثانية بعد ازجوائده ولها اربع معد  
بعكس الانسان فانه ذو معدة واحدة بسيطة والعامة تسمى المعد  
المذكورة باسماء مختلفة فيقال للمعدة الاولى اصابع العروس وهناك  
تميل كتلة الاكل . واعلم ان داخل هذه المعدة مقسوم الى اقسام  
بسدادات حتى ان الاكل ينسكب فيها كما في قالب ثم يدخل الى  
المعدة الثانية المسماة قبوطة ام ناصر الدين غير انه لا يهضم هناك  
بل يذخر ويسترجع الى الفم كتلة فكتلة ويمضغ ثانية ثم يتزل الى



المعدة الثالثة المسماة الكرش وهي المعدة الحقيقية وهناك يتندى

هيئة معدة الحيوانات المجتررة من وجهها الايمن والاعلى

شكل ١



فعل الهضم وينتهي في المعدة الرابعة المعروفة بالقباوة وهذه العملية  
تميز حيوانات هذه الرتبة عن سواها

١١ المعدة الاولى المسماة اصابع العروس • المعدة الثانية المسماة قبوة  
ام ناصر الدين ب ب المعدة الثالثة المسماة الكرش وهي المعدة الحقيقية  
والمعدة الرابعة المسماة القباوة ج منتهى المريء اي البلعوم

## الفصل الاول

### في البقر

اسم الجنس من الحيوانات الثديية المجترة ذوات الظلف والقرون وهو حيوان شديد القوة كثير المنفعة . وانواع البقر كثيرة يختلف بعضها عن بعض باوصاف محفوظة في نسل كل منها وهي مما يصعب تحديده . والبقر مثل في كثرة الاكل والنهم وصوت الانثى منه اقوى من صوت الذكر خلافاً لسائر الحيوانات وليس للبقر ثنايا عليا فهي تقضم الحشيش بالسفلى . ومن اوصافها انها كبيرة الجثة عريضة الفم قوية القوائم وقرونها ملساء لا تجعد فيها تنبت الى جانبي الراس وتجه على شكل نصف هلال الى الامام والخلف او الاعلى او الاسفل بحسب الاصناف . وجبهة الثور المألوف مسطحة مستطيلة وقروناه مستديران نابthan في طرفي خط افي بارز يفصل الجبهة عن موخر الراس غير انها يختلفان كثيراً في انواعه . وشفتاه ضخمتان وعنته غليظة قصيرة اقية وسوقه قصيرة لها في اسفلها كشة من وبر ووركة كبيرة نانثتان وما بضاه كبيرة مجوفان وركبته ضخمتان وظهره افي تقريباً من العنق الى الذنب وشعره قصير على الجلد غير ان له عرفاً صغيراً في الجزء

العلوي للعنق وبين القرنين ولونه يختلف باختلاف انواعه فتكاد كل الالوان توجد فيه وله ثلاث عشرة ضلعاً من كل جهة وست فقرات قطنية كالكثير الحيوانات المجترة وتحت عنقه لبس ابي ثنية جلدية عظيمة تستطيل الى ما بين الفأتمتين الاماميتين. وللون الثور عند الافرنج دخل في تمييز لنوعه

وبقر سورية في الجبال صغيرة الجثة غالباً وفي السواحل والسهول كبيرتها وهي اهم الحيوانات الاهلية عند الفلاحين فانهم يستخدمونها لحرق الاراضي ودرس الحبوب وتدوير النواعير وجر الاثقال واجودها ما يعرف بالخيبي وهو طويل العنق وكثير اللبن ولعله منسوب الى خيس وهو موضع بالخوف الغربي من مصر. واشهر البقر بقر انكلترا فانها قد وصلت الى درجة من الكمال لم تصل اليها غيرها فمن ذلك بقر درهام وهي تدر لبناً مشهوراً بدمه ومقداره مما يذهل العقل لانه يبلغ يومياً في بعض الاحوال من ثلاثين الى خمس وثلاثين اقة ويستمر على ذلك عدة اسابيع مع ان غذاء البقر لا يكون الا حشيشاً ويتحصل منها في الاسبوع من ثلاث اقات ونصف الى خمس اقات ونصف سمناً. وهي تمن كثيراً وتاكل بنهمة شديدة. وقد ذبح بعضها فكان وزن لحمه دون العظم من ٢٢٧ الى ٢٦٠ رطلاً واذ ذبح بعض ثيرانها الكاملة النمو فبلغ وزن

لحمه أكثر من أربع مائة وخمسين رطلاً. ولحم هذا البقر دسم  
مكثر لا يماثله في لذة طعمه لحم غيره من البقر

وما كتب لتحديد أنواع البقر لم يزل غير كافٍ لإظهار  
هيئة كل نوع على حدة وقد قسم بعضهم البقر إلى جنسين يتناولان  
جميع أنواعها وهما بقر السهل وبقر الجبل وقد ظهر بالتجارب أن ليس في  
البقر جنس ردي تماماً ولا جنس جيد تماماً فإن الردي قابل للإصلاح  
والجيد عرضة للفساد وخير الأجناس ما كان صافي نتيجته في أحوال  
مقررة محدودة أعظم من صافي نتيجته غيره في الأحوال نفسها.  
ولذلك كان على أهل الزراعة عند انتخابهم البقر التي يريدون  
تربيته أن يختاروا ما كان منها مختصاً طبعاً بالمكان الذي يريدون  
تربيته فيه وإن يكون تفضيلهم للجنس على آخر مبنياً على أحوال  
العناصر الزراعية في ذلك المكان فإن كل الذين لم يراعوا هذا  
الامر صادفوا فشلاً في ما حاولوه من إصلاح البقر وأكثرهم تكبدوا  
خسائر جسيمة

والبقر في الغالب بطيئة الحركة سهلة الانقياد ولكن قوتها  
عظيمة وإذا اغضبت هاجت وربما نطحت بقرونها القوية. والانات  
تميل إلى السكون وتأنس أحياناً بمن يهتمون بخدمتها وقد تستعمل  
في أشغال الزراعة وغيرها كالثور إلا أنها لا تستعمل في الأكثر إلا

للدر والنسل . والاهلية منها قد يكبر ضرعها جداً ويستمر درها الى  
قرب زمن الولادة ومقدار اللبن الذي يحصل منها يختلف باختلاف  
السن والصنف وكثرة التغذية ويكون درها اوفر اذا كانت في  
السنة الخامسة او السادسة من عمرها وكذا في الاشهر الاولى بعد  
الولادة

وقد تعري البقر امراض وبائية فتهلك كثيراً منها لكن  
ليس في الحيوانات جنس اقل امراضاً منها اذا عولمت معاملة  
حسنة وللحفاظة على صحتها وتحسين احوالها ينبغي ان يكون  
مرعاها جيداً وتجعل في مرايض يتجدد هواؤها وتمرن في الاعمال  
تربيتاً كافياً ولا بد ايضاً من تنوع غذائها وعلفها باصول النبات  
في فصل الشتاء ومن الزراعين من يحفظها صيفاً في مرايض باردة  
نظيفة وعلفها بحشيش اخضر من الشوفان والقصصة وهي  
طريقة مستحسنة نافعة اذا احسن استعمالها

واحسن الثيران للضراب ما كان معتدل الجسم لاسميناً ثقيلاً  
ولا ضعيفاً هزيلاً مجتمع الراس قصيره طويل الاذان اشعرها  
ذاقرون قوية لامعة متوسطة الكبر واسع الجبهة اسود العينين  
كبيرها ضخم الفم قصيره واسع المناخر اسود الشفاه لمحم العنق  
عريض المناكب والصدر ذا لبس متدل واسع الخواصرها بط

البطن كبيرة بارز الاوراك ثقيل الكفل عصبي السوق غليظها  
مستقيم الظهر طويل الذنب من الجلد سمكة بارز العضل قصير  
الظلف عريضة

وقد تحمل البقرة تسعة اشهر وتلد في اوائل العاشر فتوضع  
قرب ايام ولادتها في مريض منفرد ناشف دفي ويفرش تحنها  
زبل ناشف وتعلف عشرة ايام بعد ولادتها بجريش الفول او الشعير  
او الحنطة منقوعا بماء ملح ولا تحرم الحشيش الاخضر لانه ينشطها  
ويعوض ما فقدته بالمولادة. والاحسن ان لا تحلب في الشهرين  
الاولين بل يترك حليبها الرضيعها فينمو ويتج بسرعة وعلى الاخص  
لان حليبها تلك المدة غير جيد ويجعل العجل مع امه الخمسة الايام الاولى  
ليرضع ما يكفي ثم يفصل عنها ولا يسمح له بالرضاعة منها غير مرتين  
او ثلاث يوميا

وتعرف اعمار البقر من اسنانها فانها تبديل ثناياها الامامية  
في الشهر العاشر والجديدة تكون اعرض واقل بياضا وفي السادس  
عشر تبديل المجاورة للوسطى فاذا بلغت ثلاث سنوات تجدد قواطعها  
فتكون طويلة بيضاء متساوية تكل رووسها وتغني تحلباتها كلها  
تقدم الحيوان في العمر وتصير سوداء غير متساوية

## الفصل الثاني

### في الجاموس

الجاموس حيوان مجتر ثديي من جنس البقر يمتاز بقرنين مخروطيين يميلان أولاً الى الخارج ثم الى الاسفل ثم الى الوراء ثم الى الاعلى ثم الى الامام واصلاهما في سطح واقع فوق راس الجبهة . واما الجبهة فمحدبة طويلة والعظام الواقعة بين الخدين مستطيلة منعكفة الى الوراء ولذلك كان عظم الالف ناتياً . وفي منظر الجاموس ما يوهن بالتحوش والبلادة واخلاقه شرسة فلا يكاد يذل واطواره جافية وهو يعيش قطعاناً في المروج الغيلية ويحب التفرغ في الوحل . وصوته خوار مخيف وهو اشد من خوار الثور وطباعه الغليظة ليست على نسق واحد فان له شواذ كثيرة تسود فيها شراسة ولذلك تخشى صوته واذا اريد استخدامه لعل جعل في انفه حلقة من حديد يعلق فيها سباقة فيربط به ويقاد كما تقاد الحيوانات الاخرى . ونحل الجاموسة اثني عشر شهراً فتلد في الربيع وتضع كل مرة عجلاً واحداً وربما وضعت عجولين وتضع صغيرها مجنواً وتذب عنه بشجاعة وهي تلد مرتين في سنتين وتراج دائماً في

الثالثة . وزعم بعضهم انها لا تحمل في هذه السنة ولو نزا عليها  
الفحل فاذا صح ذلك كان من الغرائب الفيسيولوجية التي يصعب  
تصديقها . ونهيج الجاموسة متى اراد حلبها فلا ييسر ذلك الا  
بقليقها والترنم باسمها بحضور ولدتها . ولبنها صاف ابيض حلو  
طيب جداً غزير عطري او مسكي . الرثمة قليلا غير انه دون لبن  
البقر وان كان اكثر مئة زبدا وجبنا . وحاد الحاموس اقوى وامتن  
من جلد البقر وله اهمية في التجارة

وعجل الجاموس لا يرضع كعجاء البتر فانه يقف وراء امه ويمد  
رأسه بين فخذيها فيتناول ضرعها ولا ينطحها ولكنه يرفع الضرع  
ويخفضه بتوازن تام . ولا ينحني قبل ان يبلغ السنة الرابعة من عمره  
وخصية لا يكون بنق خصيتيه را : ١٠ عها . ثم يجعل في غصروف  
انفه شبه هلال من حديد يدخل راسه في منخرينه لينقاد الى  
الحركات التي ترسم له بخيط طويل من قنب



## الفصل الثالث

في الغنم

جنس من الحيوانات المجترة الند : الرنية الظلفية يمتاز عن المعز



باتجاه القرون الى الخلف وهيئتها اللولبية وفقد اللحية. والغنم انواع كثيرة يختلف بعضها عن بعض باوصاف محفوظة في نسل كل منها. ومن خواص الغنم ان صوفها متلبد اي متداخل بعضه في بعض ومشتبك بواسطة اجزاء مسننة تثبته متماسكا. ولا يتلبد على ظهر الشاة لامتناع ذلك بهيئة وضع الالياف وبواسطة دهن طبيعي يخرج من جلد الحيوان يمنع تماسكه فانه يلزم للتليد تنظيف الصوف من الدهن لكي يلحقة الماء. والغنم في الادجان يربي في قطعان عظيمة وفي بعض الاماكن تترك القطعان مدة الشتاء وتعني بذاتها وحيث لا توجد فيها ذكور قوية تمارس وظيفة حراس فعند قدوم الخطر يجتمع القطيع كله في مربع والنعاچ في الوسط والذكور مواجهة الخطر وتدافع هجمة الثعالب بل الذئاب. قيل ان ثورا هجم على قطيع في كذا ظروف فنطحه الخروف قائد القطيع وطرحه على الارض. وقد تفرق الغنم في الاقاليم الباردة في مناسف الثلج لانها تخاف من تنسيف الثلج واذا احست ببداية نوع مع هوا قوي تركض كالجائنين مع الهواء

والغنم ينوع اكثر من سائر الحيوانات الاهلية ما عدا الكلب ومن اشهر اصنافه الغنم الانكليزي المشهور بجودة اللحم والروسي المعروف بطول الالية والهندي الطويل الالية والاذنين والعجمي

والتنري والصيني والسوري والمغربي المماز بضمخامة الالية . لكن  
 اظرف جميعها المارينوس الاسباني الذي يحجز منه الصوف الثمين  
 الناعم . ويوجد ايضاً من الغنم مائة اربعة قرون . وبنية الغنم  
 نحيفة فلا تقوى على السير المستطيل ولا تضعف وتوهن قواها وهي  
 تثار من الحر والبرد والرطوبة والثلج . واشعة الشمس تسبب لها  
 احياناً دواراً مميئاً وهي عرضة لامراض كثيرة اغلبها وافدة ابي معدي  
 وكثرة سمها تمنعها وتمنع علوقها والغنم تتج بصعوبة وغالباً تسقط .  
 وقد يلزم لهذا الحيوان ملاذاة وحسن سياسة أكثر مما لسواه من  
 الحيوانات الاهلية . ومن الضرورة فضل الشاة عن القطيع اوان  
 ولادتها لتسهل اذ ذاك مساعدتها فان الحمل يشج مستعرضاً او  
 مقلوباً عند ولادته ويكون خطر الام شديداً اذا لم تشارك  
 وتساعد ثم يوخذ الحمل ويركز على قوائمه في محل دفي وتخلب اخلاف  
 امولان اللباغير جيد لتغذيته بل مضر . وتزرب الام ورضيعها ثلاثة  
 او اربعة ايام في محل منفرد ليعتاد عليها ويتعرف بها ويكون غذاؤها  
 اذ ذاك الحشيش الجيد والشعير المجروش او الخنالة الملحمة بلج العادة  
 وشربها ماء فاتراً ممزوجاً بقليل من دقيق الخنطة او الفول او  
 الدخن ولا تسرح بعد ذلك مسافة طويلة الا عندما ينشط الحمل  
 ويقوى على اتباعها . وقد لوحظ ان بكر النعجة دون اخوتها من

حيث البنية وجودة التركيب. ولا يقطم الرضيع إلا بعد شهر ونصف أو شهرين من ولادته. ويقال إن النعاج الهزيلة أكثر نتاجاً من السمينة وأنه يلزم نزول الذكر على الأنثى ثلاث أو أربع مرات ثم فصلها عنه ويجترس من تعريض النعاج وقت الضراب للشتاء والنوء لأن ذلك يمنع علوقها وصوت البرعد يسبب اسقاطها والاحسن أن تررب يومين أو ثلاثة بعد الضراب ثم تعطى حريتها. والنجعة تحمل خمسة أشهر وتضع في أوائل السادس. وقد يصير الكبش اهلاً للضراب إذا اتم الثانية عشر شهراً ولكن لتحسين النوع يفضل ما كان عمره ثلاث سنوات أو غل الواحد كاف لخمس وعشرين أو ثلاثين أنثى. وقد يعرف عمر الكبش من قرويه لأن القرن يزيد حلقة واحدة كل سنة. وتعرف أعمار الغنم والمعز من أسنانها فإنها تبدل السنين الأماميتين من الفك السفلي وهي بنت سنة وعندما تبلغ ثمانية عشر شهراً تبدل السنين المجاورتين لتلك وفي السنة الثالثة تجدد كل أسنانها فتكون إذا ذاك بيضاء متساوية وكلما تقدم الحيوان في السن نكل أسنانه وتطول وتسود. وخصي الكباش يتم بطريقتين إما بشق الكيس وتسليب الخصيتين أو برفعها وربط الكيس ربطاً محكمًا لتضمر الأوعية الدموية وتنتلش ومن الصواب أن يعلف الكبش بعد خصيه ثلاثة أو أربعة أيام نخالة لتلاين وتليين.

## الفصل الرابع

### في المعز

المعز حيوان من المجترة الثديية يعرف باتجاه القرون الى فوق وخلف. ولهجة على الذقن ومنه المعز الوحشي الذي وطنه جبال الفرس وهو اصل جميع اصناف المعز الاهلي وهي كثيرة كالمعز اصري الذي اذناه صغيرتان ولونه كسنتاني ملطخ بياض ومعز سورية المعروف بطول الاذنين. ثم معز انقره وهو اجمل الجنس ولونه ابيض ناصع وارجله سود وقرونه ملتوية كاللؤلؤ وشعره دقيق جدًا يطيب المنسوجات المينة ومعزى كثير الذي تصنع منه السالات الشهيرة وقرونه تقرب للاستقامة ولونه يختلف فقد يكون اصفر او اسود

والمعز احلق من الغنم والرعاة في بعض البلدان يتنعمون بذلك في سياسة قطعان الغنم فيختارون عدة رؤوس من المعز لتقدم الطبع وهي لشجاعتها لاتخاف ان تقطع الانهار فيتبعها الغنم والاذك لكان يتاخر عن دخول الماء وانباتها لاتشرد عن نود القطيع

ويوجد نوع آخر من المعز ياوي جبال اوروبا المتوسطة

كالشاموى وهو تيس الجبل او التيتل وقرونه طويلة جداً مقوسة  
منحنية فوق ظهره على هيئة غريبة واذا تضايق فرما الى نفسه من  
الشفير الى الوهدة وكل ما يذكر عن الغنم من حيث الضراب  
ومداواة الحملان والعلف وخصي الذكور يصح في المعز ايضاً فنقتصر  
على ما هنالك غير انه يقال لذكر المعز تيس ولصغيرها جدي  
وبلغة العامة ساعور



## الفصل الخامس

### في الجمال

الجمل جنس من الحيوانات المجترة وهو ذو خف ولا قرون له  
وهو حلقة موصلة بين رتبته والحيوانات الصفيقة الجلد ومن اقدم  
الحيوانات الداجنة. وهو منتشر في بلاد العرب والفرس وبلاد التتر  
الجنوبية وجهات من الصين والهند وشمال افريقية والقسم الشمالي  
الغربي منها. وينقسم الجمل في علم الحيوانات الى نوعين كلاهما كريم  
الطبع عظيم النفع لسكان البلاد التي يالها فالاول هو البختي  
ويسمى عند الافرنج بامعناه الجمل البقطرياني وله سنامان والثاني  
الجمل المعروف ويسميه الافرنج بالجمال العربي وله سنام واحد.

والهجين ضرب كريم منه نسبتة اليه نسبة الفرس الكريم الى الفرس  
 العام واسنان المجل اربع وثلاثون وهي قاطعتان علويتان وست  
 قواطع سفلية ونابان في كل فك واثننا عشرة طاحنة في الفك  
 الفوقي وعشر في الفك التحتي . وعنقه طويلة دقيقة مقوسة ورأسه  
 صغير وشفته العليا مشقوقة من وسطها فكل قسم منها يتحرك على  
 حدة ومنخرأه بعيدان عن فيه وسوقه طويلة دقيقة وله شبه اصبعين  
 منضمين بمنخف غير مشقوق يغشى الفرس كله ورجلاه الخلفيتان  
 اطول من الاماميتين وعجزه ضعيف ولذلك كان منظره قبيحا  
 غير ان عيوبه الظاهرة هي التي تجعله من انفع الحيوانات ولولا ذلك  
 لاستحال سلوك الصحاري الشاسعة على من يسكنها . فان ضخامة  
 خنقه وانبساطه يمنعان غوره في الرمل وهو صلب بحيث لا يجرح  
 اذا وقع على الحجارة الحادة وشق شفته العليا يمكنه من تناول الشوك  
 بدون ان يجرحها وعلو راسه يقيه من الرمال التي تطاير في القفار  
 ومنخرأه ينفتحان وينطبقان عند ارادته كي لا يدخلها شي من خارج  
 وتوات أرجله وصدره عبارة عن وسائد تقيه من النواثيرات  
 الخارجية عندما يترك على الأرض . وقد يستغني عن الماء اياما  
 كثيرة ويلزم له من العلف ما يكفي حصانين فان عشرة ارطال  
 من الحشيش والعوسج لاتكاد تكفيه يوميا ولدى الحاجة يكفي بشيء

قليل كقطع صغيرة من معجون الدقيق ويقوى بها على حمل حمل من  
عشر ساعات الى خمس عشرة يوماً بدون ان يتخلل السفر ايام  
راحة ويبدأ الجمل بالضراب في السنة الرابعة من عمره وتحمل  
الناقة اثني عشر شهراً ومدة النز وشهران وهي في الربيع للفحول التي  
عمرها من اربع الى خمس سنين وفي الشتاء لما كان منها في السنة  
السادسة فما فوق. وقد تهيج الجمل في هذه المدة هياجاً شديداً  
لا يخلو من الخطر ولا تلد الناقة الا ولداً واحداً يقف على قوائم  
حال ولادته ويمشي في اليوم السابع. والذكور من اولاد الناقة اقل  
من الاناث ومعد لها واحد لكل اربع. والظاهر ان عمر الجمل لا يتجاوز  
الثلاثين

## الفصل السادس

### في المختبر

حيوان من الثديية ذوات الظلف غير مجتر. والمختار  
الداجنة والاوبد ثالف وتتراوح وشكاثر باخلاط بعضها ببعض  
فانها كلهم من نوع واحد. ويمتاز المختبر البري بقوة انبائه المعوجة

فمنها نابان في الفك الفوقي ونابان اقوى منها وامتن في الفك السفلي فيقدران يجرح بها جراحاً عميقة بالطعن الى ما فوق وفي الغالب يضرب بها عند الهجوم عليه الاماكن الرخوة كبطن الفرس او الكلب او الانسان او خواصرها او اريات الفخاذا وقيل انه يتغلب احياناً على الاسد بانيابه . وهلب الخنازير البرية اشحن كثيراً من هلب الداجنة وهي اقوى منها واضخم واشرس وحيث تمكن الداجنة منها من التجول في الاجام واكل البلوط والكستنا وما اشبهها يكون لحمها افخر من لحم التي لا تحصل على ذلك ومن الغريب ان لحم الذكر الابد اطيب من لحم الانثى الابد ولحم الذكور الداجنة اذا لم تكن مخصصة لاتصلح للاكل . وكنية الخنزير ابو جهم وابوزرعة وابودلف وابوعقبة وابوعلية وابوقادم . وهو يشترك بين البهيمة والسبعية ففيه من السبع الناب واكل الجيف ومن البهيمة الظلف واكل العشب والعلف وهو يوصف بالشبق والذكر يطرد الذكور عن الاناث وربما قتل احدها صاحبه وربما هلكا جميعاً . واذا حان زمان هيئتها طاطات رووسها وحركت اذناها وتغيرت اصواتها وتحمل الخنزيرة من نزوة واحدة والذكر ينزوا اذا تمت له ثمانية اشهر والانثى تحمل جراحها وتربيتها اذا تمت لها ستة اشهر او سبعة وتضع اذا مضى لها ستة اشهر . واذا



بلغت خمس عشرة سنة لا تلد . وهذا الجنس انسل الحيوان والذكر  
 اقوى الفحول على السفاد واطولها مكثاً فيه . ويقال انه ليس لشي  
 من ذوات الانياب والاذناب ما للختير من القوة في نابيه حتى  
 انه يضرب به صاحب السيف والرح فيقطع كل ما لاقى في جسده  
 من عظم وعصب وربما طال نابه فيلتيان فيموت عند ذلك  
 جوعاً لانها يمنعانه من الاكل . وياكل الحيات اكلاً ذريعاً ولا  
 تؤثر فيه سمومها وهواروغ من الثعلب . واذا جاع ثلثة ايام ثم اكل  
 سمن في يومين وهكذا يفعل بالخنازير يجمعونها ثلثة ايام ثم يطعمونها  
 يومين لسمن . وكانون الاول هو وقت نزو الخنازير وبعد  
 ذلك لا يوكل لحمه . ويولد جرو الختير كامل الاسنان وتكبر  
 بتقدم سنك ولا سيما النابان التحتيان . واما النابان الفوقيان فهما  
 لشخذ سائر الاسنان والختير ستة او سبعة اضراس على كل جانب  
 فوقية وتحنية والامامية منها تشابه اضراس اكلة اللحوم والخلفية  
 اضراس الانسان وهذا يدل على انه ياكل النبات واللحم وله ست  
 قواطع في كل فك وتلد الانثى احياناً عشرين خنوصاً مرة واحدة .  
 ولحمه اوفق اللحوم للتقديد وهو نافع في المحلات الباردة وعند  
 الذين يتعبون . وشحمه انفع الشحوم لصنع المراهم وهو لذيد اذا قلي  
 وتصنع من هلبه برشآت لتنظيف الثياب والاسنان والخيول

وغير ذلك . ومن جلوده اغطية للسروج الا فرنجية . وياكل  
جميع انواع الاغذية كالحلم والحبوب والاعشاب واقذار البشر  
ويشرب الماء القذر وغير ذلك فانه لا يتجنب اكل شيء لو سخره  
واقذاره فيسهل جداً حتى ان المملوف منه يبلغ ٤٠٠ اقة



## الباب الثالث

في اكلة اللحوم

## الفصل الاول

في الكلاب

لحيوانات هذا الجنس ثلاثة اضراس قاطعة من فوق  
واربعة من تحت وخلفها ضرسان طاحنان مناسبان لاكل  
النباتات واللسان فيها ناعم ولكل من اليدين خمس اصابع ولكل  
من الرجلين اربع . والكلب حميد الاخلاق شديد الامانة كثير  
الحبة لمولاه وهو وحده يقدر ان يساكن الانسان في كل الاقاليم  
وكامل الظروف ولذلك هو انفع الجميع واكثر خضوعاً من سائر  
الحوانات وليس ذلك غصباً بل محبة وامانة لسيدته والكلب  
انواع كثيرة . منها كلب الصيد ويقال له الدليل ووطئته اسبانيا

وانكثرا ويخذ لصيد الطير كالحبال والسماقي ومن دابه ان  
يتبع الصيد حتى يقرب من الطائر المقصود ثم يتوقف جامداً في  
محلّه ويشير بانفه الى نحوه الى ان يقرب مولاه ثم يشب عليه فيثبته  
لكي يرميه بالرصاص ثم يجلبه بلطف الى سيده . وهو ضخ البنية  
وراسه قصير واذناه طويلتان وشفتاه متديلتان

ومنها الكلب الجالس . وهو قريب من المذكور لكن شعره  
طويل جعد ويختلف عن الدليل بجلوسه عند رؤية الصيد  
وقد توجد اصناف اكبر من المذكورة ذات سرعة وقوة عظيمة  
تستعمل لصيد الغزلان والارانب والثعالب والذئاب وغيرها . ومنها  
السلوقي . وهو ضامر الجسم سريع الركض شجاع الطبع حاد النظر  
واحسن انواعه المعروف بالاشهب ويميز عما سواه بضمور جسمه  
وطول انفه وسرعته التي تزيد على سرعة جباد الخيل وهو يصيد  
بالنظر لا بالشم والمفضل منه للصيد ما كان فيه طويلاً وصدره  
عريضاً وخصره دقيقاً وسوقه غليظة عصبية

والكلب الجعاري وهو كلب الرعاة وهو شرس المنظر شبيه  
بالذئب وقيل انه اصل منه وهو نافع جداً للراعي وشديد الامانة كما  
يظهر من القصة الاتية . كان كلب لراع فذهب الراعي الى الجبل مع  
ابنه الذي عمره ثلاث سنين واذلزم الامر ان يصعد الى قمة جبل

عال ترك ابنة عند سمح الجبل واوصاه بان لا يخرج من مكانه  
 حتى يتزل كلبه لم يصل الى الثمة حتى اكتنفه ضباب كثيف  
 لا يمكن المشي فيه فارتد راجعاً نحو ولده لكن لسبب الظلمة  
 واضطراب قلبه شرد وتاه وعبثاً فتش عليه بين غابات وشلالات  
 ذاك الجبل واخيراً غابت الشمس فتاه الى ان نجما من الضباب  
 ووصل الى بيته بضو القمر فدخل وحده لان كلبه كان قد ضاع  
 ايضاً وثاني يوم توجه مع جيرانه يفتشون على الولد لكنهم لم يجدوه  
 غير انه لما رجع الى بيته وجد ان كلبه قد رجع في النهار واخذ  
 كعكة ورجع مسرعاً نحو الجبل وبقي كذلك عدة ايام واخيراً عزم  
 الراعي على اتباع الكلب ليرى ما هو سبب هذا العمل الغريب  
 فقاده الكلب الى شلال متداني الحافات لكن عمقه هائل فنزل  
 في طريق عسرة الى اسفل الشلال وهناك دخل في مغارة فتبعه  
 الراعي بصعوبة كلية واذا بولده جالس هناك وقد اكل الكعكة  
 التي اتاه بها الكلب. وبان اخيراً ان الولد قد تاه من الجبل  
 الذي تركه ابوه فيه الى حافة هذه الحفرة او وقع فيها او نزل  
 دأباً والتجأ الى المغارة خوفاً من الضباب والظلام وتبعه الكلب  
 الى هناك وحرسه ليلاً ونهاراً ولم يفارقه الا لكي يجلب له الكعكة  
 كل يوم كما تقدم

## القسم الثاني

### في الامراض

#### تمهيد

لا يخفى ما في تشخيص مرض الحيوان الألبم من الصعوبة وما يلزم من الانتباه والتروي للوقوف على مركز الداء وحقيقته وخصوصاً للذين ليس عندهم الملم بفن الطب والتشريح ولذلك قد اجهدت النفس بوصف الاعراض اية العلامات التي يتميز بها مرض عن اخر مع مراعاة الاختصار. على ان الاعراض احياناً لا تظهر كلها بل البعض منها وهي كما شرحناها الاول فالثاني وهلمّ جراً على ترتيب ظهورها فعلى اللبيب ان يلاحظ ذلك ولسهولة المطالعة قد قسمت الامراض الى عامة وهي التي بسميتها اعم الجسم فتغير نظام وظائفه والى موضعية وهي التي لا تصيب غير عضو او جهاز كما مرض الراس والجلد والصدر والامعاء والقوائم والرحم الى اخره. وقد رايت من المناسب ان لا اضع للامراض والاعضاء غير الاسماء المألوفة عند اهل الفن مخافة

الالتباس لان العامة في كل مقاطعة تسمى المرض واحياناً العضو  
باسم لا يعرفه ساكن المقاطعة الاخرى وعلى كل حال من مجرد  
وصف المرض يهندي الفاري الفطن الى معرفته والحكم على ما  
يناسبه من العلاج



## علامات دالة على الصحة

على اصحاب الماشية ان يلاحظوها بحال صحتها لتسهل  
عليهم معرفة التغيرات التي تطرأ عليها لاعتنال ما. وبدون ذلك  
تعرس احياناً معرفة ما يحصل من التشويش لحيوان ابيكم يعيش  
للتعب ويموت من الاهمال

فالحيوان السليم هو الذي يتم كل وظائفه الطبيعية على  
نسق معروف وهيئة اذ ذاك لا تخفى على احد. وسأشرح لك عن  
بعض علامات خصوصية ذات اهمية كبرى لا يستغني عن معرفتها  
من اراد اتقان هذا الفن والنفع او الانتفاع به

ان هيئة الحيوان الصحيح الجسم في مربوطه خاصة بكل  
من اجناسه فالبقراو بالحري اكثر الحيوانات المجترة كالغنم والمعرز  
مثلاً تريض ولا تنقف الا وقت الاكل او لسبب خارجي فتظهر اذ

ذاك امارات التيقظ والانتباه لما يجاورها وعند ما تنفث تغطى اي  
تمدد سلسلتها الفقرية ثم تقوسها بحركة تختلف عن الاولى ثم تمد  
احدى رجليها الى الوراء بانقباض عصبي وعند ما ترفض ثني  
قوائمها تحت صدرها وبطنها وترقد عليها

والفرس قلما يرقد وقبل ان بعض انواعه لا يرقد البتة. وانما  
تكفي بالقاء راسها الى ما يجاوره ومن خصائص الخيل والحمير  
والبيغال ان تريح كلاً من قوائمها بالتعاقب مستقرة على ثلاث  
وان ربضت فبخلاف البقر تستقر على جنبها مادة قليلاً قوائمها  
وراسها. ولا تلبث الخيل رافدة مدة طويلة لان ثقل اجسامها يسبب  
انضغاط صدوره فيعسر تنفسها

ومن لاحظ الحيوان السليم يرى جلده ليناً كثير المرونة اذا  
جذب بالاصابع يتمدد بسهولة ويكون شعره لامعاً صليلاً دهني  
الملمس اذا حاولت نتفه لا ينثف بسهولة

وقد تشتكي الحيوانات الجوع بامارات تختلف كاختلاف  
اجناسها فالفرس يحجم ويضرب الارض بجافره ويجاول الدنو من  
السائس الحامل عليقة مظهر امارات التضجر من العاقبة التي  
يفتضيه الحال احياناً لتوزيع العلف والثور يخور مظهر امارات  
التهمج مكثراً من مد لسانه ولحس انفه. والغنم والمعز تشغو وتوجه

نحو الراعي الذي يدخل حظيرهما مادة اعتناقها متسابقة للمعالف حيث علما. وفي هذه الحيوانات يكون بحالة الصحة ظريفاً وطبياً وغشاوة المخاطي وردي اللون وأنوف بعضها مرطبة بسبب لزوج مخاطي. وكلها تاكل عليها بنهمة ولا تترك منه شيئاً. وبعد ما تنقطع المجتره عليها ترقد لتجتر اي لتمضغ ثانية ما ابتلعته أولاً وهذه من اثبت العلامات الدالة على صحتها. وكذلك القراقر التي تسمع من اجوافها من جرى دورة الغازات التي تولد في امعائها بعد الاكل بملء وجيزة. وروث الحيوان من حيث الهيئة والقوام يدل ايضاً على صحته او اعتلاله ومن الادلة القاطعة ايضاً انتظام او اختلال الحركة المرافقة الفعل الفسيولوجي للتنفس اي ارتفاع وهبوط خواصر الحيوانات. ففي حالة الصحة ثم كل من هذه الحركات يبطئ وترتيب بحيث لا تدرك جيداً الا اذا كان الحيوان بحال السكون التام ويرافقها تمدد وانقباض المخترين. وبالملاحظة توصلوا الى معرفة عدد تنفسات كل جنس من الحيوانات وهذه الاعداد تختلف بحسب تفاوت العمر. وهي ابداً اكثر عدداً كلما كان الحيوان اصغر سناً. فالفرس البالغ يتنفس ٦ او ١٠ تنفسات في الدقيقة ولذلك ترى خواصره ترتفع وتنخفض ٦ او ١٠ مرات بهذه البرهة والمهر يتنفس ١٤ او ١٥ مرة وهم الخيل لا يتنفس غير



٨ او ٩ مرات بالمدة ذاتها

والبالغ من البقر يتنفس من ١٥ الى ١٨ مرة والعجل من ١٨ الى ٢١ والهرم من ١٢ الى ١٥ مرة بكل دقيقة وتنفس الغنم والماعز من ١٢ الى ١٥ مرة والكلب من ١٦ الى ١٨ بالمدة عينها. ولاحظوا ان الهباء المطرود بالتصعيد من الصدر أكثر سخونة من الجسم وهذا الفرق لا يدرك ما لم يكن الحيوان مريضاً

### الاستدلال بالنبض

جس نبض الحيوان ضروري جداً لان من نظام اندفاع الدم داخل الاوردة وعدمه تعرف الامراض الحادة ومن الطبيعي ان توافق ضربات القلب نبضات الوريد والافالحيوان مريض فعلى من اراد اتقان الفن ان يتعلم جس النبض ويعرف في اي عضو تكون الاوردة بارزة سطحية. وهاك الاوردة التي اصطالحوا على الاستدلال بها في كل من الحيوان: ففي الخيل وتنوعاته يحس الوريد البلعومي الوجهي وموقع هذا الوريد بمساواة حافة الفك السفلي في النقطة التي يخرج فيها من الثام ليصعد نحو الخد لان هذا الوريد

واقع تماماً على سطح العظم فلذلك يسهل جسه وعد نبضاته . وكيفية  
جسه انك تقف امام راس الحيوان وتسندها بايديك اليمنى على  
خده اليسرى في الجهة السفلى وتقبض الحافة الحادة لفكه بالسبابة  
والوسطى بحيث تضغط اناملك الوريد المقصود وتشعر بنبضاته  
وقد فضلوا جس الاوردة للعصبة في البقر وموقع هذه  
الوجه السفلي لقاعدة الذنب . وطريقة جسها انك تقبض اصل  
الذنب بكتليتيديك الابهام الى فوق وتضغط برووس اناملك  
الاوردة الواقعة هناك فتشعر بنبضاتها

وفي الحيوانات الصغيرة كالكلب والغنم والماعز يجس الوريد  
العضدي الواقع في الثلم فوق الركبة للوجه الانسي من يد الحيوان  
بين العضلات وعظام العضد

وكما عدوا تنفسات كل من الحيوان عدوا نبضات قلبه ايضاً  
وما ذلك الا زيادة للتاكيد وللوقوف على حقيقة راهنة من حيث  
الصحة واعتلاها

فعدوا للفرس من ٢٦ الى ٤٠ نبضة في الدقيقة للحمار والبغل  
من ٤٦ الى ٥٠

وللثور من ٤٥ الى ٥٠ وللغنم والماعز والخنزير من ٧٠ الى ٨٠  
وللكلب من ٦٠ الى ١٠٠ وللهر من ١٢٠ الى ١٤٠

والنبضات كالتنفسات تزداد عدداً كلما كان الحيوان  
اصفر سناً لكن لا يعتد بالفرق ما هنا لعدم اهميته  
فكل ما شرحناه لك علامات تدل على حالة الحيوان الصحية  
فعليك حفظها والاعتماد عليها فيسهل عليك ادراك الاعراض  
المرضية عند ظهورها الان المرض. مهما كان طفيفاً يسبب خللاً في  
اتمام سير الوظائف الحيوانية المنتظم فاعلم واستند



## علامات دالة على مرض

من الأدلة على اعتلال الحيوان قلة قابليته للأكل. والأمراض  
الالتهابية الحادة مهما كانت خفيفة تؤثر في المعدة وقد يمتد هذا  
التأثير إلى أعضاء ثانوية فتظهر إذ ذاك على الحيوان إمارات  
الكآبة والانحطاط ويقل أكله أو ينقطع عنه تماماً. وهذه الأعراض  
لا تحصل فقط عن علة معدية بل عن أفة مرضية أو آلية في الفم  
ولذلك عند انقطاع الحيوان عن أكل علفه يجب أن يفحص الفم  
أولاً. واعلم أن عدم انتظام وضع الأسنان وبروز بعضها يخرج  
أحياناً غشاء الفم أو يهيئ فيحدث فيه ورم وهذا كثيراً ما يصيب

الحيوانات الفتية. وفي بعض الاحيان يفجرح اللسان او ينشب جسم غريب في قسم من البلعوم او اصل اللسان فيتسبب عن ذلك احمرار وورم مولم يمنع الحيوان عن اكل علفه

وعلم اجتزار الحيوانات للمجرة كالبقرة والغنم والمعز دلالة على تشوشها فليلاحظ هذا الامر وينتبه اليه

واعلم ان بين درجة حرارة الجسم ودورة الدم علاقة مستمرة ترتفع كلما كانت الدورة اسرع وبالعكس . وزيادة الحرارة في الاطراف او في منتهى الانف او في الاذن او في قاعدة القرن دليل على علة النهاية تعادل شدتها درجة الحرارة المحسوس بها اي كلما كانت درجة الحرارة اعلى كانت العلة اشد

وانخفاض درجة الحرارة في الاجزاء المذكورة دليل على عدم انتظام الدورة الدموية وهذا غالباً ينبيء عن علة اشد من التي يستدل عليها من الحرارة . ومن الواجب ان تلاحظ الاغشية المخاطية للعين والانف والفم فانها تكون حمراء مخففة اذا كانت درجة الحرارة مرتفعة وتضرب الى الصفرة اذا كانت الحرارة منخفضة عن حالتها الطبيعية وهذه الملاحظة الاخيرة تقتضي سرعة مساعدة الحيوان . وفي كلتا الحالتين يكون النبض سريعاً ولكن في الحالة الثانية يكون اسرع على انه يكون دقيقاً غائراً لا يكاد يشعر به

بعكس ما يكون في الحالة الاولى فانه يكون ممتلئاً متوتراً ففي  
 هذه الحالة يسقى الحيوان المشروبات الحامضة المرطبة ويلزم القصد  
 غالباً وإما في الاولى فيسقى المنبهات ويفرك بها وقد يعرف الحيوان  
 المريض من مجرد النظر اليه اذ تلوح عليه اذذاك امارات الحزن  
 والكآبة ويفقد هيئة البطور ورونق البصر فتراه منكس الرأس ثقيل  
 الجسم بطي الحركة يأكل بالتكلف وقد يكره الاقتراب من  
 العلف. وإذا كان من المجتره يربض ويستصعب النهوض ولواضطراباً  
 وإذا وقف لا ينمط كما لو كان في تمام الصحة وإذا ضغطت يده على  
 سلسلته الفقرية وخصوصاً على ما يحاذي الوركين يحدب ظهره  
 ويشني قوائمه وأحياناً يسقط رايضاً في مكانه. وإذا رايت المجتره  
 تربض كذوات الحافراي على خواصرها مادة قوائمها وراشها فاعلم  
 انها متوعكة المزاج فلا تكون بصحتها الطبيعية

## الباب الرابع

### الامراض العامة

### الفصل الاول

الامراض الخبيثة اني التلقيحية (١)

المجدري

حدها : علة وافدة ناتجة عن سم خصوصي يدخل الجسم  
ويمكن فيه مدة ويزداد مع الوقت وهذه المدة سميت مدة الحضانة ثم  
يحدث حمى يعقبها نفاط على الجلد وبعض الاحيان على سطح  
الاعشية المخاطية ولهذا النفاط اربع درجات فيكون في الاولى  
ذُبابة ثم حويصلة ثم بثرة ثم جُلبة ابي قشرة يبقى في موضعها اثر لا يزول  
وهذا المرض لا يعاود الحيوان مرة ثانية

(١) جدري ذوات الحافر

النخيل والبغال والحمير

اسبابها : العدوى

اعراضها : قشعريرة الشعر . سخونة الجلد . قلة الاكل . كآبة .

(١) هي التي تولد عن سم دخلت الجسم من الخارج او تولدت فيو فانفسدت

الدم وغيرت وظائف البنية

ثم باللس يشعر تحت الجلد بنفاط صلب قليل التواء يظهر داخل  
 المناخر وعلى ظاهرها وعلى غشاء الفم والشفاه والدبر ورمانات الأيدي  
 والأرجل وعلى جفون العين وملتحمتها وهذا النفاط يكون على الغالب  
 متفرقاً تلتهم من جراه الأوعية الليمفاوية ويتواصل ظهوره من  
 أربعة أيام إلى خمسة أفواجاً ثم يكبر ويعلو عن سطح الجلد وبعد  
 أسبوع يصير حو بصلات مملوءة مصلاً يتفجر بعضها من الاحتكاك  
 وما بقي يجف وتعلو قشرة تستط في اليوم الثامن عشر والعشرين  
 من ظهور النفاط. وقد يتسبب عن النفاط الذي في الفم والمناخر  
 سيلان لعاب لزج مخاطي

علاجها: المشروبات الحامضة المرطبة والمشروبات المدرة  
 البول. ويلزم أن تغلف الحيوانات المصابة الحشيش الطري أو  
 الشعير المنقوع بالماء لكي يسهل لوكة وإن فحج عن الهواء والشمس



## (٢) جدري البقر

اسبابها: العدوى

اعراضها: اقشعرار الشعر. سخونة الجلد. قلة الأكل. اسر  
 البول. قلة الدّر. وبعد ثلاثة أيام أو أربعة من ظهور هذه الاعراض  
 يظهر على الضرع وأحياناً على الفم والاجفان نفاط نائي مستدير

كالح اللون منخفض القمة متفرق فلما يجتمع لا يكثر اربعة ايام  
 فتعلوه حويصلات مملوءة مادة مصلية صفراء لزجة دائرها صلبة  
 احمر حساس يبقى نحوها متواصلاً الى اليوم الحادي عشر ومن  
 تاخذ البثور في الجفاف فتجد المادة الصديدية وتسقط قشوراً في  
 اليوم الخامس عشر .

علاجها: لا علاج سوى النظافة والتدفئة اي عدم تعريض  
 الحيوان للهواء فيربط في محل دفي بعيد عما يمكنه الاحتكاك به



## (٣) جدري الغنم والمعز

(ويقال لها حصبة ذوات الصوف)

اسبابها: العدوى

اعراضها: تكثر سخونة الجلد ويسرع النبض والتنفس . تدمع  
 الاعين ويسيل من المناخر مخاط لزج وتنتن رائحة الفم . ثم يظهر  
 في الاعين والانف والصدر وعلى العضد وعلى الاغشية المخاطية  
 للنفم والخياشيم نفاطات حمراء صغيرة جداً ثم تكبر وتكون بقعاً متقاربة  
 نائفة قدرها من حبة العدس الى الفولة وبعد ثلاثة ايام او اربعة



تكون نصف كروية صلبة منخفضة الراس وظهرها يكون افواجا  
 لأدفة واحدة (وعندما تسير التي ظهرت اولاً سيرها الاعنيادي  
 اي عندما تاخذ البثرات في الجفاف والتقشر لا يعود يظهر غيرها)  
 ثم تملأ النفاط حويصلات مملوءة مصلاً تنمو الى قرب اليوم  
 السادس ويكثر اذ ذاك سيلان الخاط من الانف ويتعسر البلع  
 لالتهاب مؤخر النعم والبلعوم وفي اليوم التاسع ياخذ الصديد يحف  
 مكوناً قشرة تسقط في اليوم الخامس عشر او السادس عشر من  
 ظهور النفاط وتترك مكانها ندبة. وقد تشد الحمى على الحيوان في  
 بعض الاحوال خصوصاً اذا تعسر انتشار النفاط على الجلد لسبب  
 خارجي كالبرد مثلاً فيلتهب الجلد كله ويحدث الزكام في اغشية  
 الانف المخاطية والمسالك التنفسية حتي يتعسر على الحيوان  
 التنفس وقد تحنن الامعاء فيحدث نزف دموي وذرب لتهتك  
 نسيج الامعاء المحتقنة

علاجها: تنظيف المراض وتهويتها من وقت الى اخر  
 وتعديل حرارتها. العلف الجيد الطري وضع درهمين او ثلاثة من  
 ملح البارود لكل رطل ماء في الاحواض التي تشرب منها وذلك  
 لادرار البول. والتلقيح اشهر الوسائط المانعة

## التلقيح ( التطعيم )

الجدرى الحيوانى والبشري مرض واحد فيحدث في الحيوان بواسطة تلقيحه بالمادة الجدرية المأخوذة من البشر وبالعكس. ومن ملاحظات عديدة تبين ان معدل الموت بهذه العلة المعدية اذا فشت في قطيع يكون عشرين في المئة وانها تصيب ثلثي القطيع واحياناً كله او باستثناء قليل وقد لوحظ ان معدل الموت في القطعان الملقحة بمادة الجدرى لا يتجاوز اثنين في المئة ولذلك قد اعتادوا في البلاد الاوربية على تلقيح مواشهم عند انتشار هذه العلة في القطيع او ما يجاور مكانه وطريقة التلقيح ان يؤخذ صديد او بالحري مصل الحويصلة الجدرية الصافي اللون وذلك من اليوم التاسع الى الحادي عشر من ظهور النفاط على حيوان قوي البنية ويحفظ في انبوب من زجاج اويين لوجي زجاج يملط دايرها بشمع الختم الاحمر وقاية له عن ماسة الهواه ( كلما كان حديثاً كان اجود واذا طالت مدته فقد خواصة ) ويؤخذ وقت الحاجة على ريشة كريشة الفصادة مصنوعة لهذه الغاية لها قرب راسها ثلم اي حز غائر يملاؤه بالصديد ( ان كان الصديد داخل الانبوب جافاً يحل بنقطة حليب ) ثم يدخل راس الريشة تحت الجلد حيث الشعر قليل كما في الفخذ من الجهة الانسية

او في البطن تحت السرة او في الاذن او الذنب ومتى اردت ان تخرج  
 الريشة فاخضع باصبعك قليلا على الجلد فوقها لكي يمسح عنها الصديد  
 ويبقى تحت الجلد وعند تعذر وجود ريشة ذات ثلم توخذ ريشة  
 النصد الاعيادية ويجرح بها الجلد ثلاثة جروح او اربعة خفيفة  
 بحيث يسيل دم قليل ثم يؤخذ الصديد من الانبوب على راس  
 الريشة ويوضع على الجروح مكررا مسح الريشة فوق الجرح عدة  
 مرات حتى يمتزج الصديد بالدم ثم تمسح الريشة بقطنة تضعها  
 على الجرح وتثبتها برباط الى ثاني يوم . فان كانت المادة الجدرية  
 جيدة يلهب الجرح في اليوم الثاني او الثالث وتحيطه هالة حمراء  
 وفي اليوم الخامس تكون حويصلة بيضاء مستديرة او بيضبة الشكل  
 مرتفعة الدائر منخفضة المركز وقد يشتد حولها الاحمرار في اليوم  
 السابع او الثامن وتمتلئ مادة مصلية رائقة لؤلؤية وفي اليوم العاشر  
 يظهر الورم على محيط الحويصلة ويتصلب وفي الحادي عشر ياخذ  
 الالتهاب في الانخفاض فيجف الورم والاحمرار ويكمد راس البثرة  
 ويجف الصديد ويكون قشرة تسقط في اليوم الثاني والعشرين او  
 الخامس والعشرين من بعد التلقيح ويبقى مكان البثرة اثر ثابت مدة  
 الحياة

## (٤) الحى القلاعية

حدها: علة واحدة معدية تصيب البقر وسائر المجتررة والخنازير وقد تنتقل بالعدوى الى الخيل والانسان . ولها اربع درجات الحضانة ثم مدة هجوم النفاط ثم مبدء التقيح ثم مدة الجفاف والتفشر

اعراضها: افشعرار الجلد ثم سخونة . كابة . قلة الاكل . نقص الحليب . عدم انتظام الاجترار . تلبك وارتعاش في الحركة والمشى . وتكون المناخر والغم سخنة ناشفة تظهر فيها في اليوم الثاني والثالث فقائيع مملوءة سائلاً وتصل الى غير الغم والمناخر كالشفاه والضرع وبين الاظلاف وعلى اكليها . وقد تلتهب اغشية الغم والاغشية التحامية وتصبح حمراء موهلة يسيل منها لعاب غزير لزج وقد يشتد التهاب على مندغم الاظلاف وما بينها فيتالم الحيوان كثيراً افتراه جامعاً قوائم الاربع وقد يتعذر عليه الوقوف فيمكث رايضاً . وعند تكامل ظهور النفاط اى بعد يومين او ثلاثة تهبط درجة الحرارة وتخف الاعراض المذكورة وتاخذ تلك الحويصلات بالانفجار ويحدث مكان النقي في الغم لطح فرجة تكون اولاً رمادية اللون ثم تبيض . وقد تشرج ايضاً فيما بين الاظلاف وتنتفخ . وفي

اليوم العاشر من ظهور النفاط يبتدىء الالتحام وترجع قابلية الأكل  
وبصير الاجترار أكثر انتظاماً. وفي بعض الظروف قد تشتد  
الأعراض المقدم ذكرها فتتفصل الأظلاف وتسقط وتشكون  
خراجات نقالة وتسقط الأنثى من الضعف ويتصلب الضرع  
ويتشقق ويتفرح اذا حصل اهمال في مداركة الحيوان

علاجها: ينظر قبل كل شيء الى ابعاد السليمة عن المصابة  
مخافة العدوى ثم النظافة التامة في المربض والعلف بحشيش  
اخضر وان لم يكن فاليابس منقوعاً ومس قروح الفم بحلول محض  
بروح الملح او محلول الشب. او بمغلى ورق العليق او ورق الجوز. او  
محلول ملح الرصاص. ويبدل على قروح الأظلاف بمزج الشب  
الازرق او الابيض وان كان الورم كثيراً توضع اللزق المرخية  
كلزقة بزر الكتان او ورق الخبازى او النخالة. واذا كان عدد  
الحيوانات المصابة كثيراً يكتفى بتحييض او بتسلج الماء المعد لشربها  
ولاتمس الآلاتي تكون أكثر ضعفاً والنفاطات التي خارج الفم  
والانف. فلنا ان الضرع يلتهب اذا كان النفاط المتفرح عليه كثيراً  
فيجنفن فيه الحليب ففي هكذا حالة تحلب الأنثى جيداً في بادىء  
الامر ويغسل الضرع بماء فاتر ويهبل بخار الماء وتوضع عليه اللزق  
المليئة المسككة كلزقة ورق الخبازى او النخالة مضافاً عليها بعض

روؤس الخشخاش فذه الاحنياطات توقف الالتهاب وتسرع الشفاء. ولا ضرر من شرب حليب المصابة بهذا الداء



### (٥) الحصبة

حدها : سم خاص يدخل الجسم وبعد مدة الحضانة يظهر على الجلد نفاط فرمزي اللون على شكل لطح حمراء ناشئة قليلاً غير منتظمة . ومدة المرض بين ١٥ و ١٨ يوماً وهي قلما تصيب غير الخنازير

اسبابها : العدوى

اعراضها : فشريرة . سخونة الجلد . قلة الأكل . القيء وفي ثاني يوم تحقن الاغشية المخاطية فيسيل من المناخر مخاط غزير وبصير السعال خشناً . ونحو اليوم الرابع تظهر لطح حمراء ناشئة قليلاً عن سطح الجلد تخفي تحت الضغط وتعود بعد رفعه . ومحل ظهورها الراس والفتيصة والعنق والفخذ من جهته الداخلية . وأحياناً يظهر ورم في الراس والعنق حتى يخشى اختناق الحيوان . وعند تكامل ظهور النفاط تستكن الحي على ان الاغشية تبقى مزكومة مخنقنة . وقد يبتدىء التقشر نحو اليوم الثاني عشر

وقد يصحب هذه العلة التهاب الشعب والحجيرة والامعاء ومع ذلك فعاقبتها سلبية

علاجها: تلطيف العلف. النصد في ابي محل كان من الجسم. المشروبات العطرية كمنقوع ورق القصعين او النعنع او البابونج وان كان السعال شخيراً يعطى ١٠ فمحات طرطير منبى. في مائة درهم ماء. تشريط العنق اذا كانت السخونة شديدة والورم زائداً

### (٦) الشرى

حدها: علة نفاطية خاصة بالخيول والبقر. ومدتها يومان او ثلاثة على الاكثر

اسبابها: كثرة العلف وردائه وبرد الجلد وهو في حالة

العرق

اعراضها: نفاط يظهر على سطح الجلد في كل انحاء الجسم. وهذا النفاط يكون مستديراً متفاوت الحجم من مثل البندقة الى مقدار الجوزة وقد يكون متجهماً او متفرقاً مفلطح الرأس او لطحاً غير منتظمة الدوائر تفصل بينها ثلوم مختلفة الطول والعرض. وقد

يسبق ظهور النفاط حى خفيفة تزول غالباً قبل ان يشعر بها .  
وعلى هذا النفاط الذي يكون قليل التوقيف الشعر ويحمر الجلد  
علاجها : تقليل العلف . الفصد فى اى عضو كان . وغسل  
النفاط بماء محض بالخل . والمشروبات المسهلة اللينة والمدرّة  
للبول . وتدقئة الحيوان وترويضه .



## (٧) الحى التيفويدية

حدها : علة وافدة تصيب ذوات الحافر اى الخيل والبغال  
والحمير . وقد تظهر على هيئات مختلفة فتكون معوية سليمة وخبيثة .  
ورثوية . ودماعية . وشللية . ومدتها كثيرة الاختلاف فتكون اثنى  
عشر يوماً او عشرين او ثلاثين واحياناً اربعين  
اسبابها : العدوى والازدحام فى مواضع ضيقة رطبة وقذرة  
والانتقال السريع من مناخ الى اخر يختلف عنه كثيراً  
اعراض السليمة : كآبة . استرخاء . تدميع . ارتجاف فى السير .  
اصفرار المتخمة واحتقانها وارتشاحها . سخونة الفم وجفافه وكثافة  
قوام اللعاب . سخونة الجلد . قصر التنفس وسرعته . ضمور



الخواصر وارتعاشها . سعال خفيف . تالم البطن عند الضغط عليه . قوة النبض اولا ثم ضعفة حتى يكاد لا يشعر به وتكون المبرزات ناشفة يابسة فاقدة لونها الطبيعي تعلوها مادة مخاطية . والبول متغير اللون ايضاً . وبعد ثمانية او عشرة ايام من ظهور هذه الاعراض تاخذ في التناقص وتخس الحال

وان كانت العلة خبيثة تشد الاعراض المذكورة عوض ان تسكن ويرافقها في بعض الاحيان مغص قد يشتد فيرى الحيوان ويقرغ . ويكون اللسان مغطى بفرور وسخة والظاء شديداً في بعض الاحوال وفي اخرى لا يشرب المريض شيئاً ولو غصب على شربه . وتكون اللثة مخففة حمراء او سمرء والبطن منتفخاً والامعاء قابضة احياناً واخرى مستطلقة فتخرج المواد ثنية خروجاً غير ارادي لان الدبر يبقى مفتوحاً . والبول يكون زبني القوام اسمر اللون يرسب منه احياناً راسب مبيض . والفوائم وغلاف الذكر مخففة . والهزال كثير

وان كانت العلة في الرئة ففضلاً عن الاعراض المذكورة في الحصى السليمة تكون الخواصر مرتجفة والنبض سريعاً غير منتظم ودرجة الحرارة متغيرة اي تهبط صباحاً وترتفع مساءً حسب سير المرض . ويسمع بالتنفس كالشخير . والسعال يخشن ويعقبه نفث

مادة صديدية لونها يكون القرميد وتنتهي هذه العلة بالانحلال أو التكدب والغغرينا

فاذا كان الانحلال يظهر التحسين بسرعة عجيبه فمن يوم الى الثاني تخف الاعراض كثيراً وتحسن حالة المريض رويداً رويداً. وإذا كانت الغغرينا يعرف محلها من الصدر بالقرع الاصم ومن رائحة المادة الصديدية النتنه المنفوثة عقب نوبة السعال وإذا كانت شللية. يرافق الاعراض المذكورة في النوع السليم عرج باحدى الارجل واضطراب وعرق وبول لونها مسود ويتزايد ضنى الحيوان ويشل نصفه الخلفي فيسقط الى الارض غير قادر على النهوض. وشفاء هذا النوع نادر جداً

واعراض الحصى الدماغية دوار. ابي دوخة. وسبات لا يستفيق منه المصاب الا ليعاوده ثانية. وتشنج عصبي. وهذا النوع من العلل التيفوئيدية سريع السير رديء العاقبة لانه ينتهي دائماً بالموت خصائص: قد يرافق احياناً الاعراض التيفوئيدية نفث دم غالباً غزير وبقع حمراء في الجلد لا يتغير لونها بالضغط. وفي اواخر المرض اي في ابتداء النفث يظهر على بعض اجزاء الجلد اكثيها شبيهة بمحبوب الصراجه

العلاج: أولاً العلاج المانع اي الذي تحفظ به صحة الحيوانات

السليمة: هو ان تخفف عنها الشغل وتواظب على تنظيمها وتهوية  
مرابطها وجودة علمها وإبعادها عن المصابة  
ثانياً العلاج الشافي: قلما يلجأ الى الفصد ما لم يكن المصاب  
قوي البنية والأعراض احتقانية. وبعضهم لا يجوزه أصلاً فستعمل  
اللزق المحمرة كالخردل على الصدر والبطن حسب مركز العلة  
وتركها ثلاث او اربع ساعات والمخلال كذلك على شرط ان  
لا يشغل مدة طويلة لئلا يزيد ضعف المصاب. وتخرج البطن او  
الصدر بزيت التربنتيناً ممزوجاً بمقداره من زيت الزيتون وان  
لم يوجد فبزيت الحجر ابي الكاز المستعمل للضوء والحقن بمحلول  
الحامض الفنيك ابي الكربوليك فهو مانع للفساد ويسقي الحيوان  
سالي سيالات الصودا والمقويات من الداخل كمعجون جذور  
الجنطيانا ومستحلب زيت التربنتيناً وقد يفيد سكب الماء على  
الرأس والبدن خصوصاً اذا كانت الاعراض دماغية. هذا مع  
ملاحظة تغذية المريض لئلا يموت جوعاً فيسقى الحليب او البيض  
مخفوقاً بماء بارد. والأفغلي الحشيش اليابس

—xox—

## (٨) الكلب

حدة: داء مخصص بذوات الخلب كالكلب والهر فاذا تلقح

حيوان اخر او انسان بسمه يحدث المرض . اما المادّة السامة فهي في اللعاب او المخاط الذي يسيل من فم الحيوان المصاب ويتم التلقيح بالعض او باصابة هذه المادّة موضعاً من الجلد معرّى من البشرة او بشرته رقيقة . ومدة المحاضنة هي من ٤ اسابيع الى ١٢ اوقيل ٤ اشهرًا اسبابه : لا يعلم لهُ سبب مطلقاً الا التلقيح كما ذكر اعلاه

اعراضه : اعراض هذا المرض في الكلب هي اولاً تغير عاداته في امر من الامور كما لو تناول قطع قش او ورق وبلعها واكل مبرزاته او غيرها من الاقذار ولحس سطوحاً باردة كالبلالط والحديد وطلب الانفراد وهرّ على الذين كان يألفهم وتغير صوته ولم يلتفت الى الطعام واسترخت اذناه وانخفض ذنبه واحمرت عيناه ودمعت ثم سال لعابه . واما الخوف من الماء فكثيراً ما لا يظهر في الكلب المصاب بهذا المرض فيبلغ في الماء كعادته وقد لا يهيج اكثر ما ذكر وقد يصل به الهياج الى درجة شديدة فيعض كل من اقترب اليه او اعترضه وفي اكثر الحوادث يتهمج حالاً من روية كلب آخر او استماع صوته وكثيراً ما يطلب الاخفاء في اماكن مظلمة . واخيراً تنبأه تشنجات شديدة ثم ينفلج نصفه الخلفي واحياناً يسترخي الفك السفلي ثم يشل او ينفلج دفعة واحدة فيندلع لسانه ويكون داخل الفم محتقناً ازرق فيتلاشى ويموت

واعراض الكلب في سائر الحيوانات هي نفس الاعراض  
 المذكورة غير انها تختلف شيئاً بمقتضى قوة كل منها وطبائعها. فالهرس  
 يكون هياجه اشد نظراً لقوته وخصوصاً اذا راي كلباً فيضرب  
 الارض بقوائمه ويهشم جسمه ويستمر على ذلك الى ان يشل نصفه  
 الخلفي ويموت. واذا كلب الثور فضلاً عن الاعراض المذكورة  
 بصيئه مفس وشبق فيهم على اشباح وهية وبشتد هياجه عند  
 رؤية الكلب ويبقى كذلك الى ان يشل فلا ينفذه من آلامه الا  
 الموت

والكلب في التخزير يزيد على ما تقدم كثرة التبايع اي الصراخ  
 وحساسة الجلد (وكذلك الانسان). والحاصل ان الاعراض  
 الرئيسة لهذا الداء الخفيف واحدة في كل انواع الحيوانات والنهاية  
 ايضاً واحدة هي الموت

العلاج: لا داعي لذكر طرق العلاج لانها لا تنفذ شيئاً لكن اذا  
 دورك المعضوض حالاً بعد حدوث الجرح الملقح يجب ان يوسع  
 ويغسل ويعصر بعنف حتى يدمي ثم يربط العضو فوق الجرح ويكوى  
 حالاً بجديد محمي فربما افاد ذلك. والا فالا لوفق قتل الحيوان. اذ  
 ليس المخاطر محموداً ولو سلمها

## (٩) ذئبة الخيل (الخنان)

جدها: حى خبيثة ناتجة عن سم خاص تصيب ذوات  
الحفاري الخيل والبغال والحمير وقد تحدث بالتلقيح في غير  
حيوانات وفي الانسان ويرافقها التهاب الغشاء المخاطي الانفي  
فيسيل منه سيال مائي او غروي او صديدي وتولد فيه بشور  
تشبه بشور الداء الزهري اي الحب الاقربجي في البشر وقد يمتد  
الالتهاب الى الاغشية المخاطية المجاورة فيحدث ورم في الغدد وقد  
يعم الالتهاب الاوعية الليمفاوية وغدها فيحدث الورم وتقرح  
وتولد سما خاصاً

اسبابها: علة هذا المرض غير معروفة، غير انه يظهر غالباً  
بين الخيل اذا تجمعت في مواضع ضيقة رطبة وقذرة لاسباب اذا  
انتقلت في السفن مسافة طويلة وايضاً في زمان الحرب اذا قاست  
مشقات زائدة وكان العلف قليلاً او ردياً . وهي تنتشر بين الخيل  
بالعدوى وبالتلقيح ومدة الحاضنة ثلاثة ايام الى اثنين وثلاثين وفي  
الانسان من يومين الى ثمانية والمادة السامة تحفظ ايضاً في حاملات  
وتنقل بها الى بعيد و ذكرت حوادث انتقلت بها العدوى الى الخيل

بشرهما من دلي او من حوض شرب منه حيوان مصاب او بوضعها  
في اصطبل كان فيه حيوان مصاب

وتقسم هذه العلة الى حادة ومزمنة. فاذا ظهرت على هيئة  
ورم في الغدد الليمفاوية وتقرحها فهي المعروفة بحبب الصراجة  
وهاك اعراض كل من القسطين

اعراض الذئبة الحادة: تبندى بجحى ومع الحمى الم وورم  
في الاطراف وبحمر الغشاء المخاطي الانفي وتظهر عليه لطخ ناتئة  
رمادية اللون ويسيل من احد المنخرين سائل اصفر لزج غالباً دام.  
ثم تتقرح اللطخ ويظهر ورم على جناح الانف والغدد التي تحت  
الفك. وكثيراً ما يرافق هذه العلة سعال خشن ويسرع التنفس  
وتتعاظم الحمى وتندرن الرئة

وسير الذئبة الحادة سريع وفي الغالب تنتهي بالموت قبل اليوم  
السابع عشر. ففي هذه المدة الوجيزة تحنقن الاطراف وتظهر على  
الجلد حبوب الصراجة. وهذا الاختلاط يعجل الموت

اعراض الذئبة المزمنة. ينتشر الغشاء المخاطي الانفي وتسيل  
من احد المنخرين مادة صافية اولاً ثم تتكدر وتصبح لزجة قريشية  
وتلتصق بجوانب الانف ثم تحنقن الغدد التي تحت الفك وتورم  
وتتصلب لكن لا تؤلم غالباً ولا تحرك. ويحدث رعاف كثير او قليل

او متكرر

ثم تظهر بثرات على سطح الغشاء الانفي المنتشر وتكون قروح غير منتظمة من حيث السعة والغور وتكون حادة الاشفاً متصلبة الدوائر ويكون الغشاء السليم فيما بينها منتفخاً مختلف الالوان وان كان الحيوان المصاب بالغائخنفن نخصيناه وغالباً قوائمته ويعرج وقد تبقى في الحيوان لوائح الصحة في هذا الداء الى ان يئسدى التفريح فتقل حيثئذ شهوة الاكل ويقف الشعر ويحدث سعال سببه معاناة نفث مادة مخاطية او صديدية. وتفرق الذئبة المزمنة عن الحادة بان نصاب فيها الغدد المجاورة للحمل المجروح العلاج: امتحنوا في هذه العلة جميع انواع العلاج فكانت عبثاً والشفاء الذي حصل للحيوانات من العلة المزمنة سببه انحصار المرض وحسن البنية لاموافقة العلاج

تنبيه: خذ كل الاحياطات عند ما تفحص حيواناً يفرز من انفه مادة صديدية لعل المرض يكون نفس الذئبة واعتن بغسل يديك جيداً بعد الفحص والاحسن ان تدهنها بزيت او شحم قبل ان تبشر الفحص وليكن وقوفك منعزلاً امام الحيوان بحيث لا يلحق وجهك شي من المفرزات الانفية اذا شخر الحيوان. وعلى من كان يملك جرح او خدش مهما كان صغيراً ان لا يقرب حيواناً مصاباً



بهذا الداء. وذكرت حوادث كثيرة سرت بها العدوى الى بياطرة  
وماتوا لاغفالم الاحتراس



### (١٠) الصراجه

حدها: نفاظ بثري سبب التلويح بمادة من فرس مصاب بها  
ولها درجتان حادة ومزمنة  
اسبابها: العدوى وضنك الحيوان بالاشغال الشاقة فوق  
طاقته مع قلة العلف .

اعراضها: حى والتهاب الغدد الجلدية الدهنية في الارجل  
فتتورم وتصلب وبعد مدة تسترخي وتنفرح وتفرز مادة صديدية  
دامية كسربة الرائحة ثم تصير القروح شقوقاً عميقة دامية تارة  
تنبت منها نتوات لحمية فتشبه عنقود العنب وغالباً يرافقها ورم  
الطرف المصاب. وقد يكثر البول وتنفذ شهوة الاكل وتختط  
القوى وهزل الجسم ثم تنعظم الظواهر الجلدية اى تكثر البثور  
وتتسع اسطح القروح فتظهر اعراض الذئبة المزمنة فيفرز الانف  
مادة زكامية حريفة جداً اذا اصابته ايدي السائس نقلت اليه  
المرض

وسير هذا المرض بطيء وقد تحسن حالة المصاب فنوهم  
 الشفاء لكن تجدد الظواهر الجلدية فتميت الحيوان ضئيلاً ووهناً  
 العلاج: لا علاج للصراجه غير كي البثرة بالنار اذا كان  
 المرض محصوراً في حبوب قليلة او ان تشق وتحشى بقطعة من  
 نترات الفضة المعروف بحجر جهنم وتكرر هذه العملية كل يوم الى  
 ان ينشف جوف البثرة ويعطى في اثناء ذلك من حبوب الكالومل  
 (الزئبق المحلول) المركبة ومن مسحوق القلقونة المركب. لكن اذا  
 تعاظم المرض وغم مسافة كبيرة من الجسم فخير العلاج قتل الحيوان  
 وتطهير المربط وسائر ما فيه من سروج ولحم وما شاكل

### حبوب الكالومل المركبة

درهم

١٠

٤٠

١٠

٢٠

كالومل

حليث

مسحوق الوج

مرهم الزئبق

نعجن الاجزاء جيداً وتعمل ستة بلوعات يعطى منها واحد كل

صباح

## مسحوق القلفونة المركب

درهم

١٢٠

قلفونة

٧٠

أكسيد الحديد

٥٠

مسحوق جذر السوس

٣٣

ملح البارود

٥٠

تراب ارمني

تسحق الاجزاء وتمزج جيداً وتقسّم الى ستة اقسام يعطى منها قسم  
كل مساء



## (١١) التيّفوس

ويقال له الطاعون البقري

حده: علة وافدة ناتجة عن سم خصوصي نصيب البقر  
وغيرها من المجترّة وهي لا تعود ثانية لكنها شديدة الخطر والشفاء  
منها نادر فلا ينبغي من المئة أكثر من ٥ فاذا فشت في مقاطعة لم ينق  
ولم تدر فان لم تؤخذ الاحتياطات الواقية انتشرت بالعدوى بسرعة  
غريبة. ومدتها لا تتجاوز الاسبوع

الاعراض: خمول وانحطاط . ومد الرأس وتنكيسه واسترخاء  
الاذان واحديا بالظهر واجتماع القوائم ووقوف الشعر وحمودته ولا  
سيما عرف السلسلة الفقرية . وارتعاش الجسم وتناوب الحرارة والبرودة  
في اصول الفروع والاذان . ويحدث للبعض دوار ومغص وقد  
ينشف الدر ( الحليب ) ويقل الاجترار . ويكثر التثاؤب وصرير  
الاسنان . وتكون الاغشية المخاطية اولا حمراء ثم تصير داكنة ملطخة  
والعيون دامعة غائرة . وبين اليوم الثاني والرابع يجمع على غشاء  
الانف ندف صغيرة جنية يجرها سائل مصلي رائق اولا ثم يصير  
مخاطيا صديكا تننا مخططا بدم . ويزرق غشا الفم وتظهر فيه  
نتوات رمادية اللون تاول الى التقرح . ويكون اللعاب زبديا او  
مخاطيا لزجا . والمناخر سخنة ناشفة وفي بعض الاحوال يظهر على  
بعض انحاء الجسم نفاط خصوصا على الضرع والفم والمناخر والحجا  
والخصي . ويكون النبض سريعا فيضرب من ٨٠ الى ١١٢ في  
الدقيقة وهو مع ذلك صغير غائر لا يكاد يشعر به . والتنفس سريعا  
والتصعيد تنهديا . والرأس مرتعشا مع سعال خفيف جاف . وفي  
اليوم الثالث يصير انفسيما اي تجمع هوا تحت الجلد على ناحيتي  
السلسلة الفقرية ويكون العطش شديدا والمبرزات مائعة مصلية  
او رغووية رمادية او سمراء تنتنه بخاطها دم ويسبق خروجها زحير

موثماً جداً. وتبقى الاست مفتوحة والبطن ضامراً والاختلاف ذابلة  
ناشئة

ثم يزداد الضعف والانحطاط فيمرض الحيوان ويمد عنقه  
ويسند شفته السفلى الى الارض ويبرد البدن ويكثر الذرير ويغير  
النفس وتسود الاغشية ويسمع للحيوان تنهدات تسبق الموت بمدة  
وجيزة

العلاج: لا علاج لهذا الداء الخبيث غير قتل الحيوانات  
المصابة ودفنها عميقاً. وفصل الحيوانات التي خالطتها وتغييرها  
بدخان الكبريت وتغيير التبن والسروج واللحم والسياس  
والادوات الموجودة في المربض والتي مست جسم المصاب وتطهيرها  
بماء الحامض الكربوليك. والحاصل نخذ كل الاحتياطات لحصر  
المرض في بقعة ومنع انتشاره في كل البلاد



### (١٢) الجبهة

(ويقال لها الحمى الطحالية)

حدها: علة ناتجة عن سم خصوصي يصيب سائر انواع  
الحيوانات تنصل الى الانسان وقد تكون افرادية ووافدة فيكون  
سيرها سريعاً جداً فتقتل في بضع ساعات وقبل ظهور الاعراض

الخصوصية . وهي تنقسم الى نوعين ذاتية ومشتركة او خيثة وسليمة  
اسبابها : العدوى والتلقيح

اعراض الجحمة الذاتية ويقال لها دم الطحال : اذا كان  
المصاب ثوراً . بطلان الاجترار . قشعريرة اي تعاقب برد وسخونة  
البدن . وقوف الشعر . ازدياد الحس على خط السلسلة الفقرية  
والخواصر . انقباض عضلي مؤلم خصوصاً في العنق . انطلاق  
الامعاء وتبرز مواد دامية نتنه يرافق خروجها مغص . وتكون  
العيون ذابلة وضربات القلب شديدة جداً والنفض صغيراً  
وسريعاً والاعشية مسودة والتنفس متناوذاً والتم بارداً واللسان  
مندلهاً ثم تخط درجة الحرارة الى ان يبرد الجسم فيشل الموخر  
 ويموت المصاب بعد بضعة ساعات

واذا كان فرساً : تظهر عليه امارات الحزن وتثبط قواه وتعجزه  
نوب مغص يكون الراس في فتراته منكساً فتره كانه مستغرق  
في السبات . ويكون سيره مترنحاً وجلده قاحلاً جافاً وشعره واقفاً  
تتعاقب عليه نوب عرق سخن وبارد خصوصاً على الاكتاف  
والخواصر والاذان . وتنفسه يكون مضطرباً غير منظم وضربات  
قلبه شديدة جداً . وقد يشل موخره وتعاظم الاعراض قبل  
الموت ببرهة . ومدة المرض من ١٢ الى ٣٦ ساعة

وإذا كان كبشاً: يمتنع عن الأكل وينقل بوله وتظهر عليه إمارات العيا والاختطاط وتكون الأغشية مخنقنة مائلة إلى الزرقه وضربات القلب شديدة والجسم بارداً مرتعشاً. والعيون دامعة ومجدث نزف من فتحات الجسم الطبيعية. وقد يصاب معظم القطيع في بضعة أيام وكل حيوان أصيب يموت سريعاً

وإذا كان خنزيراً: يفقد قابلية الأكل. وتختلط قواه. وتكون آذانه مسترخية رصاصية اللون وفنطيسه كذلك. ويكثر من القبايع بتنهد. ويتلخ بعض أنحاء الجسم يقع حمراء مائلة إلى الزرقه ويكون تنفسه سريعاً مزعجاً ثم تنحط درجة حرارته الطبيعية فيبرد بدنه ويبرز بدون إرادة ثم يموت. ومدة المرض من ٢٤ إلى ٤٨ ساعة

وإذا كان طيراً: ظهرت عليه هيئة حزن. ووقوف الريش وصعوبة المشي وارتعاش الجسم وزرقه العرف وقاعدة المنقار ودوائر العيون. ثم انطلق الأمعاء والموت

العلاج: إذا انتشر هذا الداء واتخذ هيئة وبائية فلا يرجى الشفاء لأن سرعة سير الأعراض لا تعطي فرصة للمعالجة فالأوفق إذا ذاك اتخاذ الوسائط الوقائية للحيوانات السليمة. وقد لاحظوا أن هذه العلة تكثر في المواشي التي تسكن في سهول ناشئة كلسية

التربة لا اشجار فيها والتي تشرب ماء محلًا تنبتًا وتررب في محلات واطلة  
رطبة فاللوقاية تبعد السليمة عن المصابة وعن المراعي التي فشا  
فيها المرض الى مراعي مشجرة قليلة الرطوبة وتلقيحها بالسم الخفيفة  
قوته حسب طريقة الشهير باستور او به ماخوذًا من ورم حيوان  
مصاب بالجمرة السليمة .

واذا تشخص المرض في اوله يربط المصاب في محل نظيف دفي .  
ويسقى من مغلى ورق الحماض مضافًا اليه ملح بارود وقد مدحوا  
الحماض الكربوليك شربًا (٨ دراهم منه في رطل ماء) حسب الجنس  
والسن والقوة تزداد او تنخفض كميته ومنهم من مدح الكافور من ٥  
الى ١٠ ادراهم مذابة في نصف افنة سيراوتو تسقى بمدة النهار تدريجيًا  
ويساعد فعل هذه المشروبات بالمحولات الجلدية القوية كلقوق  
المخردل على الصدر والبطن وفركها بزيت التريتينيا .  
وكذلك التهايل العطرية كمغلى القصعين او المحصالبان او  
الصعتر او النعنع

اما الجمرة المشتركة او السليمة ويقال لها جمرة الصدر لوجمرة  
اللسان او جمرة الفخذ حسب القسم الذي تظهر فيه فاعراضها اولًا  
حي ثم فقد قابلية وانحطاط قوى وبرودة الجسم وسرعة التنفس .  
وشدة ضربان القلب وصغر النبض وسرعته وتشنجات عصبية



ويقع النهاية محبرة على الصدر او الفخذ او على الاذان او البطن او في الفم بزاد احمرارها وتصبح حالاً وربما حجمة من البندقة الى الرمانة وحياتاً اكبر كثيراً ثم يعلو سطحه حويصلات تنفجر ويكون مكانها قروح مزرقه او مسودة. وان ابتدأت العلة من الفم ورم اللسان فيلتهب داخل الفم ويظهر فيه حويصلات مختلفة الحجم مملوءة سائلاً حريقاً اكالاً يكون لونها اولاً مصفراً ثم يزرق وبعد ما تنفجر يبقى مكانها جلف تتسع مساحته من فعل السبال الحريف المهبج

العلاج: سقي المصاب ماء الحامض الكر بوليك او ملح البارود او الكافور بالسيرتو وشق الورم وكيه بالحديد المحمي والاحسن بالحامض الكر بوليك الخفف بما على شرط تكرار العملية عدة مرات بالنهار ويختبر من ماسة المادة السامة خصوصاً اذا كان في اليد خدش ولو خفيفاً لان يياطرة كثيرين سرت اليهم العدوى وماتوا لا غفالم الاحتراس

ولا يلزم القول بابعاد السليمة وتنظيف المزارب وتغييرها بالكبريت ورشها بماء الحامض الكر بوليك. ودفن الحيوانات الميتة عميقاً مغطاها لكس ائلاً يمتص منها الذباب ثم يع على بشرة الانسان فيجرحها بخرطوميه وهكذا يدخل الى الجسد شي من المادة السامة

وقد يحصل التلقيح بواسطة الشغل في جلود الحيوانات المصابة  
او عظامها او قرونها او شعرها او دهنها وياكل الحومها او لبنها  
او سمها



### (١٣) هيضة الدجاج

حدها: علة وافدة ناتجة عن سم فطري خصوصي. وهي  
تصيب انواع الطيور الداجنة. وتنتشر بالعدوى  
اعراضها: غالباً يموت الطير فجأة وقد يمرض بضع ساعات  
فترأه حزينا مضطرب المشية واقف الريش مسترخي الجناح  
عرفة اصفر او ازرق. يجني في احدى الزوايا مخافة الهواء والشمس  
وقد يقل اكله او يمتنع عنه تماماً. ويكون عطشاً شديداً ويسيل من  
منخرية ومنقاره مادة مخاطية لزجة مع ذرب فيه اثر دم الى ان  
يبرد الجسم فيقع في سبات ثم يموت. وسير هذه العلة سريع وشفائها  
نادر. على ان وجود ديدان في جوف الطيور يسبب احياناً مثل  
هذه الاعراض فلينتبه الى ذلك  
العلاج: نظافة الفن ورشة بماء الحامض الكربوليك وتغذية

الطيور بمواد نباتية طرية وسقيها محللول الحامض الكربوليك جزء  
منه الى ٢٠٠ جزء ماء وفصل المصابة عن السليمة ودفن الميتة  
غيباً



## (١٤) ذات الرئة التيفويدية

ويقال لما طاعون البقر

حدها: علة وافدة تنج عن سم خصوصي يكمن في الجسم مدة  
طويلة وقد ينتشر الداء أحياناً الى مسافة بعيدة قبل ان ينتبه الى  
وجوده وانتشاره يكون بالعدوى

اعراضها: تنحدر هذه العلة في بادى الامر لان منظر الحيوان  
لا يدل على اعتلال مع ان السم كامن في دمه. لكن اذا روقب  
يرى متوانياً وان حركة خواصره متزايدة وتنفسه خريبي يسعل  
سعالاً خفيفاً متواتراً جافاً. وبعد ثلاثة ايام من ظهور هذه  
الاعراض تفقد القابلية ويبطل الاجترار ويشند حس السلسلة  
الفقرية خصوصاً خلف الاكتاف ويتفاقم السعال ويرافقه نفث  
مادة بيضاء لزجة ويكون الجلد جافاً والشعر كدرًا مغطى بشبه

غبرة وتبقى الاعراض هكذا من اسبوعين الى ثلاثة ثم تتعاضل  
فتشتد نوب السعال وتصبح مؤلمة متكررة ويتهدد الحيوان تنهداً  
عميقاً ويقلل الربوض او لا يربض مطلقاً وتكون عيونه دامعة  
وانفه ناشفاً وتتعاقب السخونة والبرودة في اصل القرون والاذان  
واحياناً يسيل من الانف مادة مخاطية مختلفة المقدار. ويكون  
النبض سريعاً والدّر قليلًا والبدن محبوساً ومدة هذا  
المرض من بضعة ايام الى عدة اسابيع وعدد الوفيات فيه من  
العشرة الى ٧٥ بالمئة وهو كثيراً ما يلتبس بالسل الرئوي

العلاج: اذا مضى على هذا المرض ١٠ ايام تعذر الشفاء.  
لكن اذا تشخص المرض في اوله فيفيد فيه القصد في اي محل  
كان من الجسم والمحولات كلزق الخردل على الصدر والفرك  
بزيت التربينينا ويسقى المصاب مشروباً منوعاً اي درهمين من  
الطرطير المنبيء مذابة في اقة ماء يسقى بالتدريج في النهار ويسعط  
بالخل المعطس بقصد ان يشخر فيقذف المواد المخاطية المتجمعة  
في صدره

ولوقاية الحيوانات السليمة يجب تلقحها بمخاط اودم ماخوذ  
من رئة حيوان مات بالعلة او من مصل ورم حيوان اجريت فيه  
عملية التلقح من بضعة ايام وقد اعتادوا جرح الذنب من وجهه

السفلي جرحاً خفيفاً والقاء المادة السامة على الجرح ومزجها بالدم حتى يتشربها فيحدث للحيوان بعد ذلك حى وفقد قابلية تدوم من ٨ ايام الى ٢٥ تقريباً ثم يشفى . ولا يعاوده المرض

ولتركيب الخل المعطى يؤخذ شب ابيض . ملح التوتيا . فلفل مدقوق . زيت تربنتين . من كل شكل ١٠ دراهم . كافور درهمان خل بكر ٢٠٠ درهم ضع الكل في قنينة الى وقت الحاجة . والاستعمال ان تضع ملعقة صغيرة في منخار الحيوان المصاب فتدفع عيناه ويشخر فتخلص خياشيمه مما تجمع فيها من المواد المخاطية التي تعوق تنفسه

—xxx—

### (١٥) السقاوة

حدها : علة مزاجية معدية خاصة بذوات الحافر خصوصاً بالفتية منها

اسبابها : العدوى والانتقال السريع من التغذية بالكلاء الى الحشيش الاخضر الرطب الى مواد يابسة حامية

اعراضها: قزز . سخونة الجلد . سرعة التنفس وعدم انتظامه  
احمرار الغشاء المخاطي للأنف وسيلان مادة تكون مصلية بيضاء  
اولاً ثم تصبح خائرة صفراء تخالطها ندف . سعال ناشف خفيف  
وقد لا تشد الاعراض بزيادة بل تضعف رويداً رويداً ويشفى  
المصاب . وقد تزايد وخصوصاً اذ لم يعتنَ بالمرضى على ان  
سيلان الأنف يكون قليلاً وتحتقن الغدد التي تحت الفك وغدد  
العنق ويمتد الالتهاب الى الحنجرة فيعوق التنفس . ثم يتعاضد الورم  
تحت الفك ويتكون خراج ضخيم ويصير المفرز الانفي صديدياً  
تتأ وتستطلق الامعاء فتخط القوى ويتغنى داخل الثم وقد يظهر  
في المناخر وعلى الثم حويصلات يظنها من لم يجنب الصنعة بثرات  
الذئبة او الصراحة فليتنبه الى ذلك

العلاج: الراحة . تقليل العلف . تعديل حرارة المربط  
وتغطية العنق والجسم بالصوف واستعمال التهايل اللطيفة كغلى  
ورق الخبازى . وبسقى ماء فاتراً مزوجاً بطحين ومجلى بالعلس مع  
قليل من ملح البارود وان كانت الامعاء قابضة يعطى مسهلاً  
من كبريتات الصودا ٥٠ درهماً دفعة واحدة وان كان السعال  
شديداً والعنق ملتهب تعطى البلاسم وافضلها مسحوق الكبابية  
الصينية يعطى منه اربعة دراهم مع خمس قمحات افيون كل اربع

ساعات مزوجة بماء ومحلاة بالعسل . وان تكون الخراج تحت  
 الفك يدهن بمرهم الزئبق القوي الى ان يخلل او يتفحج ويرتخي فيشق  
 ويلاحظ من حيث النظافة فقط فيغسل ثلاث مرات بالماء  
 بماء فاتر وهكذا الى ان يلتم الجرح . وان ازمى المرض ولم تجع فيه  
 الوسائط المقدم ذكرها يُخَلَّ الحيوان من صدره وبشغل الخلال  
 الى ان يخف السعال وينقطع المفرز . وبروز الحيوان يومياً  
 بالشمس مع الاحتراس بان لا يعرق ويعرض للهواء لئلا يعاوده  
 المرض

ومن الضرورة تنظيف المربط ونظيفة ونظيفة بالحمض  
 الكربوليك خصوصاً المعالف مخافة العدوى

### (١٦) مرض الكلاب

حدة : مرض معدي يصيب الكلاب الفتية اي من سن  
 ٥ اشهر الى ١٥ شهراً ولا يصيب الا مرة واحدة  
 اعراضه : هيئة حزن . ثوان في الحركة . قلة قابلية الاكل .  
 نشوة الفم . زكام المناخر . كثرة التقيؤ . سرعة النبض . سخونة

الجسم . قبض الامعاء في بادى الامر وبعد بضعة ايام من هذه الاعراض الابتدائية يسعل الحيوان وينفث مادة مخاطية واحيانا يقيء . ويكثر العطاس وتكون عيونه عمماء يعلوها احبانا لقطة . او ضبابية وسيرة مضطربا كمن دارت به الخمرة . ثم تنطلق الامعاء ويكون البرز اصفر فاتحا بخلاطة مخاط وتخط قوى الحيوان ويهزل جسمه فلا يستطيع الوقوف فتغور العينان وتصبح المبرزات دائمة تننة ويموت بجالة خمول تام او عقب نوبة تشنج

العلاج : قبل اذا دورك الحيوان من البداية وسقي كل يوم صباحا ومساء ملعقة صغيرة من صبغة خشب الكينا في ربع كوبه خمر حمرا متوقف الداء . ويبقى المصاب من الآفات الصدرية والمعوية التي تؤدي به دائما الى الموت فهذه المعالجة تزول الاعراض حالا خصوصا اذا استعملت عند ظهورها . ومن الموافق نقل المصاب الى محل نظيف حسن الهواء معتدل الحرارة وتغذيته باللحم النيء او كرش غنم مسلوق والحليب واذا تقدم المرض وظهرت الاعراض الصدرية كالسعال والنفث يسقى مقيئا والافضل ١٠ او ٥٠ درهما من شراب عرق الذهب وان كانت الامعاء قابضة فمسهلا وافضاه زيت الخروع او الكالومل اي الزئبق المحلو من ٢٠ الى ثلاثين فحمة حسب السن والقوة . وان كان الصدر في تضايق والتنفس كالشخير توضع اللزق



الخردلية وتقطع الذرب بماء الارز المضاف اليه كل مرة ١٠  
نقط من اللودنم اي خمر الافيون المركبة . ولازالة الضبابية او  
اللقطة عن العين يكل بالكالومل مرتين في اليوم

حبوب

درهم

١

تربل معدني

٦

حليث

١٠

صبر

صابون ما يكفي لجبل هذه المواد

ثم يقسم المزيج الى ٦٠ حبة ويعطى من حبة الى ثلاث في  
اليوم حسب مقتضى السن والقوة . وذلك لوقاية الكلاب من  
المرض ولشفاء المصابة به

مغوف لتقطع الذرب

درهم

٢

راوند

١

عرق الذهب

١

افيون

تخلط الاجزاء جيداً وتقسم عشرة اقسام . يعطى من واحد الى

ثلاثة في اليوم

مسحوق آخر

درهم

٣٠

٠٤

من كل

{ ملح بارود  
كبريت

فحم

امزج الاجزاء واقسمها ١٠٠ قسم . يعطى منها ثلاثة كل يوم  
وهذا السفوف يقي الكلاب السليمة وينفع المصابة  
اذا انتقطع الكلب عن الطعام ولم يقبل منه ما يكفي للقيام  
بحياته فقد يستفيد كثيراً بمناولة ملعنة كبيرة من زيت السمك  
مرتين او ثلاث مرات كل يوم فانه يسند قواه ويثايسر المرض  
سيره

## (١٧) الحمدار أو التشيك

قد تصعب معرفة هذا الداء في الحيوانات ما لم يتحقق في  
عضو ظاهر . واسبابه غامضة على انه غالباً يحصل من برودة  
الجسم وهو في حالة العرق . وهو نوعان . منفلي . وعضلي  
الاعراض العامة للحمدار المنفلي : اولاً فشعريرة وحى . ثم  
تظهر الاعراض الموضعية كالتيبس احياناً في منفلي واحد  
واخرى في اكثر من ذلك مع الم حاد . واذا كان المصاب كلياً

يحمر جلد العضو المصاب ويتالم فيكثر من العواء ويكون سيره متعسراً أو متعذراً ويتورم المفصل لارتشاج مصل فيه ويسخن . وأما الألم فتارة شديدة وأخرى خفيفة وقد ينتقل من مفصل الى آخر وتارة يتقطع ودائماً يزداد بالضغط

العلاج: المحمرات كاللرزق المخردلية والحارريق وفرك المفصل بهرم الزئبق والبلادونا ثلاث مرات كل يوم . ويسقى من الداخل ملح البارود من ١٠ الى ١٥ درهماً يومياً او كربونات الصودا من ٢٠ الى ٣٠ درهماً او سالي سيلات الصودا من ٢ الى ٤ دراهم في اليوم للفرس ودرهماً للكلب حسب مقتضى القوة . واخيراً اذا ازمنا الداء وبقي المفصل متورماً فخير العلاج الكي الموضعي بالحديد المحمى

واعراض الحذار العضلي : تيبس والم خفي لا يظهر الا عندما تحرك العضلة المصابة . والحجوان يبقى واقفاً لا يستطيع الربوض وان ربح يتعسر عليه الوقوف فيبقى رابضاً مدة طويلة وقلم يحصل ورم واعراض عمومية . ومدة هذا المرض قصيرة او انه يشفى او ينتقل الى الحالة المزمنة فيعطل الحيوان لانه يبقى متيبساً

العلاج: الراحة وفرك المحل المصاب بزيت الكافور والبلادونا وباللرزق المليئة كلرزق بزر الكتان او النخالة وان كان المصاب من

الحوانات الصغيرة يغطس في الماء الفاتر ولا يصب الماء فاتر آمن  
عليه على الحبل المصاب. وقد مدحوا استعمال سالي سيالات الصودا  
من ٢ الى ٤ دراهم يوميا حسب مقتضى النوع والقوة

### (١٨) الداء الخنازيري

حدة: علة خصوصية فلما تصيب غير الخنازير والكلاب  
اسبابها: الارث وشو العلف  
اعراضها: تورم الغدد الليمفاوية في العنق. ويكون الورم على  
هيئة مسجحة متحركا غير مؤلم. وقد تورم احيانا غدد الصدر والحالب  
ويكون الجلد فوق الورم ازرق. ينفججا. ثم يرتخي الورم ويتفجج ويصير  
خراجا ينفجر عن صديد مائل وقد يستمر منفذ التفجج مفتوحا  
فتنحط من جراه قوة الحيوان ويموت ضئ

العلاج: الملاحظات الصحية من حيث النظافة والترويض  
والغذية بمواد مقوية فللكلب اللحم والقوة وللخنزير جنرالجنطيانا  
وحشيشة الدينار وحب الكوكلان. ويعالج المصاب بنفصات  
الكلس من ثلاثة الى ٦ دراهم يوميا. وبصبغة اليود من الداخل

من درهم الى ٢ حسب السن والقوة وبمرهم اليود من الخارج ويمغلى  
ورق الجوز المحلى بالعسل  
مرهم اليود

درهم

٣٠

يود

٢

يود ورا البوتاس

٦٥

زبد او شحم او مرهم بسيط

اخلط اليود واليودور في هاون مع ماء قليل واضف المرهم  
واخفق جيداً الى ان يتم الامتزاج

يستعمل دهناً لتدوين الاورام الخنازيرية الغير المتفتحة ولترخينها  
ولدهن فتيل يوضع في الاورام المفتوحة هذا مع غسلها يومياً بمغلى  
ورق الجوز فاتراً

—xox—

## (١٩) الكساح

حده: علة خصوصية في العظام يحل به نموها فلا يتصلب ما  
يجدد من موادها. وهذه العلة خاصة بالحيوانات الفتية  
اسبابه: سوء المتيشة والتغذية. وفقد الاملاح من الاغذية

اعراضه: تآان وتلبك في الحركة . هزال . وفوف الشعر .  
 ضرب متواتر . واسب ملحمة من البول . ثم تتفخ العظام خصوصا  
 الطويلة كعظام القوائم ويتوقف نموها وتلتوي . وتلتوي الاضلاع  
 والسلسلة الفقرية بحيث يعاق البلع والتنفس . ثم تترق الاغشية  
 ويمتنع المصاب عن الاكل ويموت .

العلاج: تلاحظ امور التغذية في ابتداء ظهور العلة وارسال  
 المصاب الى محل صحح الهواء ولا علاج عندما تاخذ العظام في  
 اللين والالتواء



### (٢٠) السل الرئوي في البقر

حدة: علة معدية تصيب البقر خصوصا وسائر المجترات الكبيرة  
 والخزير والخيول

اسبابها: العدوى واستعداد وراثي . وحلب الحلابات  
 مدة طويلة او اطالة الرضاع بحيث توهن قواها وهزل  
 اعراضه: قشعريرة . سخونة . تفرز . ثم يصل الحليب ويسنولي

سعال ناشف خصوصاً بعد العاف ويسرع التنفس وبضيق  
ويسمع له داخل الصدر لفظ خشن غير منتظم كصوت المزمار مع  
خراخر. ويكون الجلد ناشفاً لاصقاً والشعر واقفاً وهذا العرض  
الاخير يزداد كلما تقدم المرض ويزاد الهزال. وتحتفن الغدد الليمفاوية  
في الصدر والحالب فيعرج الحيوان وتبقى الاعراض المذكورة  
أخذة بالازدياد فيقل الحليب ويشند السعال ويعتبه نفث مادة  
مخاطية صديدية محبة عديمة الرائحة ثم تستطلق الامعاء ويموت  
المصاب

العلاج: لاعلاج للسل في الحيوانات ولا فائدة الا  
بالاحتياطات لمنع سريان العدوى. فتفصل المريضة ويظهر  
الاصطبل بتغييره بالكبريت ورشه بالحامض الكربوليك. ولا  
تؤكل لحوم المصابة بهذا الداء. ولا باس من شرب حليبها اذا  
اغلي اولاً غير انه يحترس من اعطائه للاولاد الخفاء واصحاب  
الاستعداد الوراثي الى السل لانه قد يكون سبباً لهجوم المرض  
عليهم

واذا تشخص المرض في اوله فليجرب اعطاء مزيج مركب  
من كبريت وعرق الجناح من كل ٢٠ درهماً ومن العسل ٥٠  
درهماً ومن الماء رطل. يمتلى ربعة صباحاً وربعة مساءً. ويغفر

المصاب بمواد راسيخية كصمغ الصنوبر او الفلفونة اشعالاً بالمجهر  
لكن لا فائدة من الادوية غير توقيف سريان العلة مدة  
وجيزة فالأوفق قتل الحيوانات المريضة ائلاً يصري الداء الى  
سائر المواشي القريبة



### (٢١) الدم الاسود

اسم لورم يصيب الكلاب والخيول البيضاء او الرقطاء في  
الثامنة او العاشرة من سنهما ومحل ظهور هذه الاورام غالباً ما  
يحاور الاعضاء التناسلية فتسميها العامة باصور الخيل وقد تكبر  
احياناً حتى انهم شاهدوا ورمًا من هذا النوع وزنه ٥ او ٦ ارطال  
وقد تكون متفرقة او متجمعة كروية او مستطيلة واحياناً تشبه  
عقود العنب . وعندما تتوصل الى حدها ترتخي وتنشق عن مادة  
سوداء داكنة تسج في مصل اصفر محمر

ولا تكون هذه الاورام السوداء في مجاورة الاعضاء التناسلية  
فقط بل تظهر في اي عضو كان من الجسم فتكون في الكبد والطحال  
والكلي والبنكرياس والبريثون والامعاء والرئة والغدد الليمفاوية



وعلى الاضلاع والمعقوف قد تختلف اعراضها الموضعية حسب مركز وجوها ويقال انها علة موروثه

العلاج: لا علاج لهذا الداء غير الوسائط الجراحية وذلك عندما يكون الورم ظاهراً الى الخارج ومحدوداً فيستأصل لكن يندر ان يكون هذا الورم خارجياً ما لم تكن الاحشاء مصابة به ايضاً فمما الفائدة اذا



### (٢٢) انيميا فقر الدم

حدها: هي حالة مرضية فيها يقل مقدار الدم وتنقص الكريات الحمر التي فيه بالنسبة الى البيض . وهذه الحالة تصيب جميع الحيوانات

اسبابها: نزف دم وافردفعة واحدة او نزف قليل متكرر . والاشغال الشاقة مع قلة العلف

اعراضها: اصفرار الاغشية المخاطية . الهزال . انحطاط القوى ضعف ضربات القلب وسرعتها . صغر النبض . اخفائه الاوردة . هبوط حرارة البدن . اختلال الهضم . التعب السريع

ولو بعد شغل خفيف فيسرع التنفس مع تورم إحدى القوائم  
أحياناً

علاجها: إبعاد المصاب عن الأسباب المسببة للعلّة وتقليل  
الشغل وزيادة العلف وتحسينه وتليجه وسقي المقويات الحديدية  
والمرة

بلوع مرّ حديدي

دروم	من كل	{	مسحوق جذر الجنطيانا
٣٠			مسحوق خشب الكينا

٥ كبريتات الحديد (زاج اخضر)

١٦ كربونات الصودا

عسل ما يكفي لعجن المواد جيداً

ثم تقسم حبوباً بقدر البندق يعطى منها من ٥ الى ٤٠ كل يوم  
حسب مقتضى السن والنوع والقوة

### (٢٢) القرمزية

اسم لبقع حمراء بنفسجية تظهر على الجلد وعلى الأغشية المخاطية

وهي عرض لعلة عمومية تصيب الخيل والكلاب يتسكب بسببها  
الدم من الاوعية الشعرية تحت الجلد فيثلاً لونه من تحته  
خصوصاً حيث الجلد ابيض رقيق خال من الشعر

اسبابها: غير معروفة. ولعلها ارتخاء في الاوعية الدموية  
اعراضها: تبندى مجبى ثم تظهر البقع حمراء بنفسجية على انحاء  
مختلفة من الجسم ولونها لا يزول تحت الضغط. وقد تبقى البقع  
من ٤ الى ٨ ايام واحياناً يكون ظهورها متعاقباً فتبقى اكثر من  
ذلك. وقد يحدث احياناً نزف من السطوح المخاطية وانسكاب  
دم في غلاف الاحشاء. وقد تخالط هذه الاعراض العلل  
التيفويدية التي تصيب الغنم المجزوز صوفها حديثاً

علاجها: التغطيس بالماء البارد. تفريغ الامعاء بمسهل خفيف  
كذئوب. ادرام الى ٢٠ من كبريتات الصودا حسب القوة والسن  
وغسل البقع بمغلي مواد قابضة كقشر السنديان وورق العليق او  
ورق الصفصاف او الجوز او الحور. ويسقى المريض مشروباً  
مراً حديدياً لانهاض قواه اذا كان ضعيفاً

مشروب مر حديدي

جذر الجنطيانا ١٠ دراهم اغلها في افة ماء واضف اليها ٤  
دراهم من صبغة الحديد. تسقى على يومين. كل مرة الربع

## (٢٤) الدم الايض

حدة: علة مزاجية فيها تكثر كريات الدم البيض وتقل  
الحمر. نصيب كل انواع الحيوان. سيرها بطي \* وانتهاءها اليه  
اسبابها غير معلومة .

اعراضه: انحطاط القوى. التعب السريع من شغل قليل  
وسرعة التنفس. عدم انتظام في قابلية الاكل. عطش شديد.  
هزال وايضاض الاغذية المخاطية فيكون لونها كلون الخرف  
الصيني. وقد تزداد هذه الاعراض فيوهن المصاب ويضيق نفسه  
فيكثر شخيرته ويتفخ بطنه. وتكون الامعاء قابضة او مستطلقة مع  
تورم احد الاطراف وقد تنتفخ الغدد الليمفاوية في العنق والابط  
والحالب

العلاج لم ينجح في هذا المرض دواء. واذا كشف باكرا فربما  
توقف سيره بالمقويات المرة الحديدية وقد افاد يودور الحديد  
حبوب يودور الحديد

درهم

١٠

٢٠

يودور الحديد

مسحوق الجبطينا

تُجَنُّ بالعسل وتقسَّم ١٠٠ حبة يعطى منها من ١ الى ٢  
للحيوانات الصغيرة ومن ٤ الى ٨ للتوسطة ومن ١٠ الى ١٥  
للأكيرة



### (٢٥) اسر البول. احتباس البول

حدة: بطلان وظيفة الكليتين كلاً أو شيئاً فينقطع افراز  
البول تماماً أو يجري نزراً  
اسبابه: التهاب الكليتين واحتقانها أو ضمورها. أو وجود  
حصاة فيها أو في المثانة  
اعراضه: برودة البدن. سبات وخمول. عسر تنفس. تنهد.  
خرب. قيء. تشنج  
العلاج. ان كان افراز البول مقطوعاً تماماً فلما يفيد العلاج  
وان كان بعض القطع فتفيد مدرات البول مثل ملح البارود  
وكربونات الصودا وان كان عن وجود حصي في الكلية أو  
في المثانة فلا شفاء

## (٣٦) سلس البول

حده: علة مزاجية تصيب خصوصاً الخيل والغنم والكلاب  
وفي النادر البقر

اسبابه: ضعف البنية العام. والاكثار من مدرات البول.  
وعلف الحيوان بمواد متعفنة

اعراضه: تبويل غزير متكرر لا يرافقه الم. عطش وقابلية  
للاكل زائدة. هزال. ضعف قوى. وقوف الشعر. تورم القوائم.  
هبوط درجة حرارة البدن. ضعف بصر. وسير هذه العلة بطي  
وقد تسبق احياناً ظهور مرض الخنثان

علاجه: العلف المقوي المغذي الناشف. وتقليل سقي  
الحيوان واعطاء كبريتات الحديد او ركلورور الحديد من  
درهم الى ٢ يومياً. على انهم مدحوا كثيراً الطباشير المستحضرة  
يعطى منه ثلاثة او ٦ دراهم يومياً في ماء قراح. وبرومور البوتاسيوم  
من درهم الى ٥ يومياً

## (٢٧) سوء القنية المائية

حدها: هزال ناتج عن فساد دم مسبب عن وجود دود  
ذي فمين في أكباد الغنم خصوصاً

اسبابها: ابتلاع زيزن او بززر هذه الديدان مع المياه حيث  
يمتص او مع عشب علق به الدود من مبرزات حيوانات مصابة به  
اعراضها: انحطاط القوى. كآبة. سخونة المناخر واصفرار  
الاعشبة داخل الفم والانف. وباشتداد هذه الاعراض  
يهزل المصاب هزالاً زائداً ويتنفخ البطن ويزداد اصفرار الاعشبة  
ويكون النبض ضعيفاً وضربات القلب شديدة. ويقسو الصوف  
ويقع متناثراً بسهولة. ويكره الاكل ويبطل الاجترار. وكل يوم  
المساء يظهر ورم تحت الفك ويخفي في الليل. وتورم القوائم  
والصدر. ثم تستطلق الامعاء ويموت المصاب

العلاج: اوفق ما يكون ذبح المصابة واتخاذ الاحتياطات  
لوقاية السليمة فتبعد عن المراعي المألوفة لئلا تبتلع مع الحشيش  
بزور الديدان المقدوفة مع البراز. ويعنى بعائنها فيحسن ويحلج لان  
الديدان تنمو في اجواف الحيوانات الهزيلة أكثر مما في السمينه

ويوضع في الاحواض التي تشرب منها حديد قد علاه الصدأ او  
قليلاً من الزاج الاخضر اي ثلث درهم في الكمية التي بشر بها الراس  
يوميًا

وقد تصيب هذه العلة البقر والاعراض والعلاج نفس ما  
ذكرنا



### (٢٨) الحب الافرنجي. او الداء الزهري

ويقال له مرض الفقيز

حده: عاقبة سم خصوصي يلحق به السليم اذا نزاع الى انثى مصابة  
وسير هذا المرض خداعٌ بطيء وانتهائه خطر. ويصيب الخيل  
والحمير خصوصاً وليس هذا المرض نفس الداء الزهري البشري  
اي السفيلس الحقيقي ولا يولد احدهما الآخر

اعراضه: احنتان غلاف الذكر وظهور حويصلات عليه من  
الخارج وفي الداخل. فيكثر الحصان او الحمار الفج اي التباعد بين  
الارجل وان بال يتالم فهذه هي الاعراض الابتدائية ثم تصيبه حكة  
وتشترج الحويصلات وتصبح الخواصر مؤلمة وحركة الحيوان عسرة  
ويعرج من احدى رجليه وقد يهزل ويشل رويداً رويداً فيربض



ويبقى رايضاً فتعقر جوانبه ويموت ضئى . وإن كان المصاب انثى  
 يحقن المهبلى واشغار الحجا وتسيل منه مادة مخاطية ثم تكون  
 حويصلات تشقرح وتكون هيئتها ردية وقد تمتد الفروح الى  
 الافخاذ وتشغل سطوحاً واسعة منها . وتحقن الغدد وتشكون  
 خراجات ثم يئدى الشلل كما ذكر عن الحصان . وتهزل المصابة  
 كثيراً وتموت ضئى

العلاج : تلاحظ الفروح من حيث النظافة وتكوى بحجر  
 جهنم او بالشب الازرق . وتدهن بمرهم او بغسل معمول منه اى  
 من الشب الازرق درهم لكل ٢٠ درهم مرهم بسيط او ماء . ويسقى  
 المصاب من الداخل ماء القطران او ماء الحامض الكربولىك  
 مخففاً . ومن ١٠ الى ٢٠ درهماً تربنتين . ويعتنى بعلفه جيداً ويسقى  
 المقويات الحديدية كحلولى كبريتات الحديد اى الزاج الاخضر  
 يضاف منه الى مشروبه درهم كل يوم او الحامض الزرنيخوس (طعم  
 الفار الايض ) مسحوقاً عشر فحات الى ٢٠ فى اليوم ويغسل  
 الحيوان يومياً بماء بارد

— ١٠٠١ —

### (٢٩) الكرازا والتيتنوس او التمدد

حدة : هو تشنج العضلات تشنجاً غير ارادى وإذا اصاب

عضلات العنق والفكين فهو الكزاز وإذا اصاب عضلات الجذع والاطراف الباسطة والمقابلة فهو التمدد او التهنوس لانه يشنج العضلات المضادة بعضها بعضاً فيمدد الجسم او بعضه تمدداً شديداً مثل خشبة يابسة

اسبابه: التعرض للبرد والرطوبة ويقال انه يحدث من قبل جرح ولو خفيفاً

اعراضه: يبتدي يبوسة بعض اقسام الجسم كالاذن او الذنب او الفك. وبعد ظهور احدهذه الاعراض بمدة وجيزة تتعطل عضلات الفك فينطبق الفم وعضلات العين فتشخص الى الاعلى وتصبح الهيئة خصوصية. وان كان الداء مسيباً عن جرح لا تظهر الاعراض دائماً في مجاورته. وإذا انحصرت العلة في عضلات الفك يمدد الانقباض الى عضلات العنق فتتصلب مثل الخشب ويسيل من بين الشفاه لعاب غزير وتكون المناخر مفتوحة والتنفس سريعاً والذنب متيبساً ويسبب كزاز الاسنان واعتقال عضلات البلعوم لا يمكن مناولة العلف ولا مضغته ولا بلعه حتى ولا ازدراد السوائل. وإذا عمت العلة الجسم يتيبس الجذع والتوائم مثل خشبة فاذا انهض الحيوان من تحت راسه لا تلتوي الرقبة ولا السلسلة ولا الاطراف بل ينهض الجسم كله

معامثل انماض لوح من طرفه والطرف الاخر مستند على الارض وتكون الامعاء قابضة والبول ماسورا لا اعتقال غواصر الشرج والمثانة . وقد تمتلئ بالشعب والنم مخاطا لا يمكن الحيوان قذفه الى الخارج . ويكون النبض صلبا صغيرا بطيئا والاغشية المخاطية مخنقنة بنفسجية اللون حسب شدة اعتقال عضلات التنفس . وقد تبقى درجة حرارة الجسم على ما هي عليه اعتياديا ثم ترتفع فجأة عند قرب الموت

ومدة هذا المرض قصيرة ويموت الحيوان مخنوقا من جرى انقباض واعتقال عضلات التنفس

العلاج: قلما يفيد العلاج في هذه العلة . على انهم اوصوا بالسكون التام حول المصاب وان يسقى سوائل مغذية كالحليب او مغلى الارز والشعير وبان يعطى المستحضرات الافيونية اى ٢ دراهم من اللودنم كل ثلاث ساعات حسب شدة المرض او هيدرات الكلورال ٥ دراهم كل ثلاث ساعات وان لم يمكن اعطاؤه من النعم يعمل حثنا وبان ينشق الكلورفورم والاثير كبريتيك او يسقى الكافور مذابا بالسبيرتو ٢ دراهم كل ساعتين او زيت التريبتينا ٨ دراهم كل ساعة . وان لم يتيسر سقى المريض دواء بسبب الكزاز واعتقال عضلات البلع يحفن تحت جلد عنقه على الجانبيين

بجمل من كبرينات او خلاصا و هيدروكلورات المورفين  
 مذابة في ٢٠ نقطة ماء ومنهم من يوصي بتهيل المصاب بخار الماء ثم  
 يعقبه بسكب الماء البارد المتكرر على الرأس . ويوضع المصاب  
 في محل دفيء وقد نجحوا أحيانا بغمره الأراسه بالزهل الناشف  
 السخن وما يفيد أحيانا كثيرة أكثر من المستحضرات الأفيونية  
 برومو البوتاسيوم او الصوديوم بمجرات كبيرة اما وحده او مع  
 هيدرات الكلورال



### (٢٠) الخوريا . رقص ماري انطاونيوس

علة اسبابها مجهولة فلما نصيب الخيل والبقر . غير انها  
 كثيرة الحدوث للكلاب عقب مرضها وهي عبارة عن اعتقال بعض  
 العضلات اعتقالا متقطعا لا ضابط له  
 اعراضها : حركات في بعض العضلات تشنجية . متواترة .  
 متقطعة . غير ارادية . ومشي متلبك . وتبقى صحة الحيوان جيدة  
 وضربات النبض طبيعية مدة طويلة بعد ظهور هذه الاعراض  
 ثم ياخذ الحيوان بالضعف وتظهر اعراض الانيميا اي فقر الدم

وفي بعض الأحيان يُشلُّ المصاب . ومدة هذا المرض من بضعة أشهر الى بضعة سنين

علاجها : على الغالب لا تنيد المعالجة . وإنما اذا لوحظ الحيوان عند ابتداء المرض فربما يشفى فيسقى المشروبات المضادة للتشنج او مسحوق جوز النقي من درهم الى درهين اذا كان المصاب فرساً او ثوراً ومن فحمة الى خمس فحات في اليوم اذا كان كلباً ويفطس في الماء البارد . هذا مع الملاحظات الصحية من حيث التغذية والنظافة . وتفرغ الأمعاء بواسطة مسهل اذا كانت قابضة

### مشروب مضاد للتشنج

حليث وكافور من كل ٥ دراهم . ماء ٢٠٠ درهم تنجز سوية وتعطى دفعة واحدة للحيوانات الكبيرة وعلى اربع مرات في اليوم للكلاب

### (٣١) الصرع . داء النقطة

حده : علة نصيب كل انواع الحيوان ينقطع فيها الشعور فجأة في اوقات غير معينة مع تشنجات عضلية عامة او موضعية

اسبابة: الارث والضربات على الراس وكثرة الاكل مع قلة الحركة

اعراضه: نوبة تحصل فجأة فيرتجف الحيوان ويترنح ويسهو برهة ثم يسقط الى الارض فاقد الشعور ويخبط متشنجاً وتعتقل عضلات العنق فتلتوي وعضلات الفك فتمسح للاسنان صرير وتنقلب المقلة داخل الحجاج وتزداد الحدة ويسيل لعاب الفم وتزبد الاشدق. ويكون التنفس سريعاً مضطرباً والتبول والتبرز غير اراديين والنفض صغيراً غير منتظم. ومدة النوبة تدوم من دقيقتين الى خمس. فتأخذ التشنجات بالسكون رويداً رويداً الى ان تسكن تماماً. فينهض الحيوان وعليه امارات العياء والانحطاط على انه بعد برهة يعود الى عمله الاعيادي كأن لا مرض فيه. وقد تختلف شدة النوبة من ترنح بسيط فقط الى الاعراض التي ذكرت والسقوط الى الارض. وقد يتكرر حدوثها كلما تقدم المصاب بالسن. والنهاية دائماً خطيرة

العلاج: يعطى مغلي حشيشة الفالاريانا ١٥ درهما الى ٤٠٠ ماء في النهار وخصوصاً برومور البوتاسيوم من درهم الى ثلاثة يومياً

وقد يلتبس الصرع بنوب تشنج تحدث عن وجود ديدان في

الامه بها تحدث من اختلال دماغي وعن السهم بجوار التي  
وبالدوار البسيط. فلينتبه الى ذلك

—•••—

### (٣٢) الدوار البسيط

حدة: نوب دورية لاضابط لتكرارها كثيرة الحدوث للخيال  
خصوصاً

اسبابه: غامضة

الاعراض: يحدث بغثه للفرس في اثناء ركضه او جره عجلة  
او نحو ذلك ان ينفض براسه ويحول الى جهة كما لو كان في اذنه  
حصاة او نحوها ويفرج قوائمه وينسند الى ما يجاوره او يسقط  
الى الارض فاذا اوقفوه فجأة تزول النوبة بعد ان يكون قد عرق  
فليلاً ووقف برهة وجيزة كالحامل على انه اذا لم ينتبه راكبه او  
سائقة الى توقيفه يرجع الحيوان الى الوراء ويقف على رجليه ويدور  
على نفسه ويسقط اخيراً الى الارض مغشياً عليه. ثم يقوم بعد بضع  
دقائق ويتنفض ولا يبقى اثر لما حدث له

العلاج: توسيع الفلادة على مذبحه. وايقاف الحيوان برهة

عند ظهور الاعراض الاولى القى ذكرناها وإما راسه الى جهة  
معاكسة للشمس ويمنع قبض الامعاء



### (٣٣) الخلة

حدما: علة خاصة بالخيول سيرها بطي ومركزها غير محدود  
وانتهاؤها خطر

اسبابها: استسقا الدماغ. وافات اغشيتيه وانضغاط  
فصيصاته بارتشاج او تمجيدات. وزيادة الحر. وضغط الفلائد  
على الراس والعنق

اعراضها: هيئة بله. سبات. نظر شاخص لا يتحول الى  
جهة. وتكون الاجفان نصف مطبقة والرأس مسنوداً الى ما  
يحاور وان وضعت فوائم الحيوان وضعا مقصودا ولو كان وضعا  
متعبا تبقى كما وضعت. ويكثر اجفائه ويعسر عليه الرجوع الى  
الورا ونراه ياكل بسرعة ثم ينقطع فجأة ويبقى التبن او العشب في  
فيه. وتقل الحساسية او تزداد كثيرا. ويخف التنفس وضربات  
النبض. وتكون اذانه واقفة موجهة الى الامام وغير متحركة. وان  
قدم له دلو ماء يغطس راسه فيه الى فعره




العلاج: في أول ظهور الاعراض يفصد الحيوان ويعطى مسهلاً كل يومين ويخل في عنقه قرب كتفه. او نوضع حراريق على جانبي العنق. ويفرك على عرف السلسلة الفقرية بزيت التربينينا مذاباً فيه كافور او يكوى الحبل المذكور بالنار وفي كل الاحوال الامل بالشفاء ضعيف

### (٣٤) رعشة الغنم. ويقال لها حكة الصلب

حدها: علة غير وافدة خاصة بالغنم سيرها بطيء وسببها مجهول لكن نسبوا حدوثها الى استعداد ارثي وإلى تأثير الاقليم وقد تلتبس بالصرع وبالدوار الدودي

اعراضها: هيئة حزن. رعدة. ارتعاش البدن. ويكون الراس مرفوعاً والصلب متقوساً حساساً. والسير مرتبكاً والوثوب متعذراً. وأحياناً يتشنج المصاب وتفايل البتة وتصيبه حكة شديدة على الصلب وما دونه وقد تمتد الى الانفخاذيل الى سائر الجسم فيكثر من حك الحبل باسنانه وقرونه وبما يجاوره حتى ينسلخ جلده وتشكون قروح او خراجات صغيرة فيفقد الراحة ويهزل وبعد شهرين او ثلاثة من ظهور الاعراض الاولى يشل موخره

ويمنع او يقل اكله وتستطلق امعاؤه ثم يشل تماماً ويموت  
 العلاج: يغسل المصاب بمغلى الخربق ويسقى منقوع حشيشية  
 القالريانا ٤ دراهم منها في ٢٠٠ ماء يومياً والاحسن ان يضاف الى  
 المنقوع درهم من الحامض الكربوليك وان لم يوجد فن الكافور .  
 على ان هذا الداء عسر الشفا وربما كلف العلاج فوق قيمة المصاب



## الفصل الثاني

في علل الصدر

### (٣٥) زكام القصبه والشعب

حده: التهاب الغشاء المخاطي للقصبه وشعب الرئة التهاباً  
 حاداً او مزمناً وهو يصيب انواع الحيوان خصوصاً الفرس والكلب .  
 وهو من جملة اعراض السقاوة ومرض الكلاب  
 اسبابه: التعرض لهواء بارد جاف ثم الانتقال فجأة الى هواء  
 كثير السخونة او استنشاق غبار او غازات مهيجة او سلوك المشروب  
 غير طريقه الاصلية . او شرب ماء كثير البرودة والجسم عرقان

الاعراض : عسر تنفس . عتم انتظلم الرجاج الخفاصر .  
تشوفا الاغشية المخاطية واحمرارها في بادى الامر . سعال جاف  
مزعج موم . سخونة البطن . تسرع العينين واحمرارها . قلة اكل . وقوف  
الاجترار . عطش . ثم ياخذ السعال في الاشتداد ويعقبه شخير  
وقذف مفرز شفاف عن طريق المناخر يصير فيما بعد لزجا مخاطيا  
ندف ثم صديديا وان كان المصاب كلبا يكون المفرز الانفي نجيعا  
ويسمع من صدر المصاب عند الاستقصاء خراخر مخاطية . وقد  
تتلطف الاعراض فتعود القابلية او الاجترار ويقل المفرز ويصفو  
لونه وتبتعد نوب السعال ويشفى المصاب لكن اذا انتقل الالتهاب  
الزكامي الى درجة الازمان يزداد عسر التنفس وبصير السعال  
رخوا والمفرز غزيرا وشهوة الاكل غير منتظمة فيهزل المصاب  
ويقل جلده ويكد لون شعره

العلاج : يوضع المصاب في محل دفي . معتدل الحرارة حائد  
عن مجرى الهواء ويفرش تحته الزبل او القش اليابس . ويحفظ  
اكلة فلا يطعم سوى طحين الشعير ممدودا بما . ويعطى في بادى  
الامر مسهلا من كبريتات الصودا ٥٠ درهما ويسقى يوميا من  
مغلى جذور السوس مع ٥ رووس خشخاش محلى بالعسل ويهبل  
بمغلى الحشائش المليئة كالخبازى والخطمي مع المحمرات على الصدر

كالحرايق والزرق الخردلية وإذا لم تعد الحمايراث فالخلال . وإن  
انتهى إلى الحالة للزئمة فيمهل بماء غلر صب فيه قطران ويعطى  
٥ دراهم من القرمز المعدني مجبولة بالعسل نصفها الصبح والثاني  
المساء أو ٦ دراهم من أكسيد الزنك أي مكلس الخارصين بالعسل  
مرتين بالنهار . وإن كان المصاب كلباً يسقى من مسحوق عرق  
الذهب . ٢٠ فمحة مقسومة ثلاثة أقسام تؤخذ بمدة النهار

وقد تلتهم أحياناً النسيبة والشعب لوجود ديدان فيها وهذا  
يحدث غالباً للحيوانات الفئحة وأسبابه ابتلاع بزور هذه الديدان  
مع الماء أو مع العشب الرطب لأن هذه الديدان تنمو وتعيش في  
البلدان التي تكثر فيها المستنقعات وقد تنمو وتكثر في النسيبة  
والشعب الدقيقة ويتسبب عن وجودها هناك نوب سعال  
تختلف شدتها حتى ينجش أحياناً اختناق الحيوان خصوصاً إذا  
أصابته نوبة السعال وهو ماش . وحكة في طرف المناخر . وقحولة  
جلد ووقوف شعر وهزال . والعرض المميز هو وجود قطع  
من الدود المسبب للداء في المفرز الذي يتدفق المصاب من أنفه  
وقت نوبة السعال

علاج هذه العلة : فصل السليبة عن المصابة وإبعادها  
عن المراعي التي تسرح فيها لئلا تبتلع ما تنفذه المصابة عن طريق

الناخراو الأمعاء. وتهيل المصابة بينار الحليث وحن مناخرها  
بالخل او بزيت الترتينا الخنف بالماء. وذلك لتخريص السعال  
وقذف الديدان الى الخارج. وعلفها جيداً لئلا تمزل وتموت  
ضنى

— ١٠٠ —

### (٢٦) امفيسيا رثوية

حدها: هي تجمع هواء بزيادة في خلايا النسيج الرثوي  
فيهددها وهي كثيرة الحدوث لذوات الحافر  
اعراضها قد تظهر هذه العلة فجأة عقب حركة عنيفة كالوثوب  
او جرشي ثقيل او ركض شديد وقد تظهر بالتدريج وفي كلا  
الحالين يخلل انتظام التنفس اي تطول مدة الزفير وتقصر مدة الشهيق  
وتضعف وهذا يعرف في الحيوانات من حركة خواصرها فان  
الخاصرة تهبط في وقتين يفصلهما فترة سكون بدون ارتفاع ظاهر اما  
عسر التنفس وقصره فيشعر به في اول الامر عند الركض والشغل  
ولو خفيفاً وبعد حين يضيق نفس الحيوان وهو ماش في ارض  
سهلة خصوصاً بعد العليق. وقد تشند الاعراض شيئاً فشيئاً الى  
ان يصير عسر التنفس مستمراً. وقد تزيد رنة الصدر تحت القرع

على انه لا يسمع فيه اللغظ الطبيعي بل لغظ مزماري متفرقع يابس  
 اورخو اذا كان هناك مخاطٌ. هذا مع سعال احيانا متكرر يختلف  
 شدته لكن يكون جافا يسمع عن حدوثه صوت افلات غاز من  
 الاسث. وقد تفرز المناخر مادة كزلال البيض اذا خلط بماء  
 وعواقب هذه العلة عافة دورة الدم واحتقانات دموية  
 وارشاحات مصلية في الاحشاء الصدرية والبطنية

علاجها: تلطيف العلف وتقليل التبن ولا يشغل الحيوان  
 الا بعد تمام الهضم. وينبغي اجتناب سرعة العدو وحمل الاثقال  
 وكل شغل عنيف. ويسقى ماء نفع فيه قطران او اغلي فيه البخور او  
 اذيب في كل ١٠٠ درهم منه درهم من الحامض الكربوليك وقد  
 افاد استعمال حشيشة النج درهم من مسحوق ورقها ثلاث مرات في  
 اليوم. وانما النجج علاج في هذه العلة هو الحامض الزرنيخوس اي الرنج  
 (طعم الفار الابيض) يعطى منه ١ قسحاة مرتين في اليوم مذكورة  
 على نخالة مبلولة وذلك على مدة طويلة بشرط ترك استعماله يومين  
 او ثلاثة كل اسبوعين وذلك لكي تنفذ الطبيعة كمية من الزرنيخ  
 المتجمع في البنية حذرا من سميتها

## (٢٧) التهات

حدة، علة ليست الأعراض من أعراض آفات القلب  
وعلى الصدر كالامفيسيا الرئوية وزكام الشعب وفتق الحجاب  
الحاجز. وهي خاصة بذات الحافر ومن العلل العضالة  
اعراضة: نفس اعراض الامفيسيا المقدم ذكرها اى عدم  
انتظام حركة الخواصر وقت التنفس مع سعال جاف ريان ومفرز  
انفي مختلف القوام لا يلتصق ابداً على فتحات المناخر. يقذف كتلاً  
او ندفاً عندما يمد الحيوان فمه ليشرب  
العلاج: اذا دورك الحيوان عند ابتداء العلة فاطلقت حرته  
ليرتعي العشب الأخضر ويعنى من الشغل فر بما توقف المرض نوعاً  
على انه يعاوده اذا شغل فلافائدة اذا من الكلفة والتعب

## (٢٨) نفث الدم

نزف دموي يحصل من الاغشية المخاطية للمسا لك التنفسية  
وهو اما عرض مؤقت مسبب عن اجتهاد عفيف تحنن من

جره الاغشية وتتلف دماً او يسبب عن علة في الرئة او خلطة دم تعوق الدورة في الاوعية الدموية . او عن ابتلاع علة تشبث في مسالك الازدراد

العلاج : يفصد الحبولان اذا كان سميتا دمويًا وظن ان الترف عن احتقان دموي . ويريج وينهل بنهايل قابضة كخيار الخل المغلى وان كانت العلة من وجود علة يسقى ماء ملحاً بلع الطعام او ماء فيه قليل من الحامض الكربوليك او الفطران وان كان من آفة في الرئة تستعمل اللزق الخردلية والحارريق على الاضلاع والصدر وتعالج العلة المسببة له



### (٣٩) احتقان الرئة

حده : توارد الدم بزيادة في الاوعية الرئوية من اشتداد الحراو الازدحام كما في مراكب النقل او المركبة الحديدية . او العدو السريع في زمان حار او من ربوض مستطيل يعوق الدورة الدموية او من سقطة او علة فلية

اعراضه : سرعة التنفس وتعسرة . انفتاح المناحر . مفرز انفي نجيعي احياناً . شدة ضربات القلب . عرق . ازرقاق الاغشية . برودة



البدن لغط قليل صم وحجم بعد القرع على الاضلاع في القسم الخشن  
 مع صم تحت القرع في القسم المقابل  
 العلاج: يبدأ بفصد المصاب. ويسقى من ١٠ الى ١٥ درهما  
 من الايثرنترك في اليوم. ويفرك جسمه بماء خلط بدقيق  
 الخردل خصوصاً على عرف السلسلة الفقرية. وإن كان ضيق  
 النفس شديداً ينفس الهواء اصطناعياً اي بمنفاخ يدخل في فيه  
 وينفخ به

— ١٠٠ —

### (٤٠) ذات الرئة

حدها: هي التهاب قسم من الرئة وهذا الالتهاب اصلي او  
 ثانوي وقد يخلط بالتهاب البلبورا اي غلاف الرئة وبالتهاب  
 الشعب وله درجتان حاد ومزمن  
 اسبابها: التغيرات الجوية السريعة اي انتقالها من حرارة الى  
 برودة بغتة. دخول المشروب في البلعوم في غير مجراه الحقيقي.  
 الجروح. وقد ترافق احياناً الحمى التيفويدية وجدري الغنم وحمرة  
 الخنزير. وقد تنتج عن انسداد شرايين صغيرة بجلاط فبرينية  
 اعراض ذات الرئة الحادة: فقد شهوة الاكل. اعياء. مخونة

البدن والغم . احمرار العين . امتلاء النبض وصلابة ( ينبض من ٥٠ الى ٧٠ نبضة بالدقيقة ) ارتفاع الخواصر . سرعة وضيق تنفس تودي الى الاختناق احياناً . ومن ابتداء العلة سعال مختلف التواتر عسر مولى يعقبه قذف مادة مخاطية قرميدية اللون من احد المناخر ويكون اللغط التنفسي ضعيفاً . وتظهر خراخر فرعية ثم يخفي اللغط التنفسي وتظهر خراخر صغيرة . وصوت القرع فوق القسم الملتهب اصم وزنان فوق الاقسام السليمة . وارتفاع درجة حرارة البدن تدوم من ٥ الى ٦ ايام . وقرب اليوم التاسع او العاشر يموت المصاب من انحطاط القوى لو عسر التنفس او تاخذ الاعراض في الزوال فتعود الخراخر الفرعية والصمم تحت القرع يزول هذا اذا كان المرض متجهاً الى الانحلال والشفاء . وقد تنتهي ذات الرئة بالموت في الدرجة الحادة او بخراج رئوي او بغنغرينا او ذات الرئة المزمنة

فاذا انتهت بغنغرينا ( يحدث ذلك من اليوم الرابع الى الثامن ) تصير رائحة المادة المنفوثة كريهة ولونها رمادياً او مخضراً والهوا الخارج من الصدر تنناً . ثم تخط القوى ويصغر النبض ويموت المصاب

واما خراج الرئة فنادر الحدوث وان حدث يكون النفت

غزيراً صديدياً ويهزل المصاب هزالاً كلياً ويموت

. اعراض ذات الرئة المزمنة: تتميز هذه العلة عسر. فاذا طالت مدة ذات الرئة الحادة فبعد مرور عدة اسابيع تصلب الرئة فتتخف سخونة البطن غير ان للمصاب يبقى ضعيفاً فاقد قابلية الاكل ويكون جلده جافاً وشعره واقفاً مع نوب سعال مختلفة تواتر وعدم انتظام في صعود وهبوط الخواصر كما في الالتهات ويزداد الهزال يوماً فيوماً الى ان يموت العليل

العلاج: اذا كان المصاب قوي البنية دموياً يستخرج له ما لنصد من افة الى رطل ان كان فرساً او ثوراً ومن ٢٠ الى ٥٠ درهماً ان كان كلباً والافلا ينصد لئلا يضعف. ويسقى من درهم الى اثنين من الطرطير المقيء اربع او ٥ مرات في اليوم وذلك لمضادة التهييج وتقليل عدد التنفسات. ولا لباس من اضافة ٤ او ٥ دراهم من ملح البارود الى المشروب المذكور. ويعتني بان تبقى الامعاء منطرفة ولذلك يسقى المريض ٢٠ او ٥٠ او ٦٥ درهماً من كبريتات الصودا النوال الغاية المطلوبة. وتوضع اللزق المحردة تحت الصدر (افة خردل تجبل بماه توضع في محل الحزام وتترك ٤ او ٥ ساعات) وفرك الصدر والاضلاع بمنقوع دقيق الخردل بماه بارد وان لم يحسن الحال فالخلال في الصدر او على الاضلاع وان

كان المصاب من الحيوانات الصغيرة يدهن صدره وخواصره  
 بالزهر المنقط بان يمزج درهمان من الطرطير المقيى بعشرة دراهم مرها  
 بسيطاً. ويعطى معجون القرمز المعدني عشرة دراهم منه و٢٠ من  
 مسحوق الجنطيانا او جذور السوس مجبولة بالعسل ثلاث مرات  
 في اليوم للحيوانات الكبيرة ومن درهم الى درهين للصغيرة ومسحوق  
 حشيشة الديجنال من نصف درهم الى درهين في ايوم للحيوانات  
 الكبيرة و٥ فحات الى ١٠ للصغيرة

وان انتهت العلة بالغنغرينا: تهبل مناخر الحيوان بخار الماء  
 المضاف اليه كمية من الحامض الكربوليك ويسقى من زيت  
 التربنتين ١٠ دراهم ممزوجة بثلاثين درهماً من الكحول محلاة بالعسل  
 هذا للحيوانات الكبيرة وربع المقدار للصغيرة. وكيفية المعالجة التي  
 ذكرناها كثيرة الموافقة لذات الرئة التي فوبدية المعروفة بطاعون البقر  
 وعندما يتوصل الحيوان الى درجة النفه. يوقى من البرد ولا  
 يطعم كمية وافرة في آن واحد بل عدة مرات في النهار وكل مرة  
 قليلاً. ويعنى من الشغل الى ان يشفى تماماً ولا يعاوده الا تدريجاً  
 وان كان هزياً ضعيف القوى يعطى درهماً من مسحوق جوز النقي  
 وعشرين قمحة من الزرنخ الابيض ممزوجة نصفها الصبح والاخر  
 المساء مذكورة على شعير مبلول او نخالة مبلولة

واحد على ان التنفس واللغظ القلبي قلما يتغيران . وهذه الاعراض لا تستمر الا بضع ساعات ثم تبطل في النبضات وتبقى مدة ثم تعود فتشدد وتواتر

العلاج : الراحة . وتقليل العلف . والمساهل المحيية ككبريتات الصودا او كبريتات المغنيسيا اي الملح الانكليزي من ١٠ دراهم الى ٨٠ حسب جنس الحيوان واذا لم يشف بعد مدة يعطى مسحوق اللديمينال من ٢ فحبات الى ٤٠ فحمة حسب الجنس او الكافور من ٥ فحبات الى ٥ دراهم ولا باس من مزجه بالافيون فحمة الى ٥ اذا كان الحيوان صغيرا والى درهم واكثر ان كان من الحيوانات الكبيرة



### (٤٣) التهاب التامور اي غلاف القلب

التامور كيس غشائي مصلى محيط بالقلب والتهابه يحدث لكل انواع الحيوان . وهذا الالتهاب اما ان يكون عن رضة او جرح او عن عرض موضعي لعلة اخرى كذاة الرئة او ذات الصدر او لعلة عامة كالجدري وما اشبه

اعراضه : حتى . وعسر تنفس . سرعة نبض مع صغره وتوتره

وعندما تكون اغشية كاذبة يسمع لغط احتكاكي أكثر وضوحاً من ضربات القلب. ويكون المصاب حزيناً وأهن القوى وهزل شيئاً فشيئاً الى أن يأتي الموت وهو الغاية الغالبة في هذه العلة

العلاج: تقليل العلف. الراحة. الطرطير المقيء. مثلاً بالماء من ٥ فمحات الى اربعة دراهم حسب جنس الحيوان او الخربق الابيض من درهم الى ٥ دراهم او خلاصة الخربق من ٥ فمحة الى ١٥ يومياً. واذا لم تحصل نتيجة يعطى الديجيتال من ٥ فمحات الى ٤ فمحة مع ٥ دراهم ملح بارود مثابة بماه وتوضع الحرايق على القسم القلبي الواقع تحت الحزام للجهة اليسرى



### (٤٤) التهاب بطانة القلب

حده: التهاب الغشاء المبطن لاجد تجايف القلب. وهو يحدث لكل انواع الحيوان ويكون اما ذاتياً او مرافقاً لعلل اخرى وشفائه نادر وان حدث فموقت واسبابه مجهولة على انه يحدث غالباً مع الحدا راي داء المفاصل

الاعراض: انحطاط. هيئة حزن. ضنك. تقزز. تنفس قصير وسريع. نبضان قلب سريع غير منتظم. وقد يعقب درجة

التهيج هذه خمول وشلل خفيف يعوق الحيوان عن الحركة مع ضيقة نفس متعب مضنك . ويكون للقلب صوت كالصير ورنة معدنية . وتظهر على الحيوان اعراض مغص ويصير بولة زلاليًا اي بخالطة زلال . وتكون خواصره كثيرة الارتجاج كما في اللهاث ويتعاضم هزاله ويموت

العلاج : ربما توقف المرض عند ظهوره اذا دورك بالفصد وبالحرايق على القسم القلبي او بالخلال في الجهة المذكورة وباعطائه ثلاث مرات الى اربعة في اليوم مسحوقاً مركباً من مسحوق الديجنال درهم . ونترات البوتاس ابي ملح البارود ويكربونات الصودا من كل ثلاثة دراهم



### (٤٥) التهاب نسيج القلب العضلي

حده : التهاب نسيج القلب العضلي به ترتجي الالياف العضلية وتلين وهو يحدث لكل الحيوانات وقد يلتبس بالتهاب التامور اي غلاف القلب وبالتهاب بطانته لان اعراضها تقريباً واحدة وعلاجها كذلك راجع ما ذكرناه هنا لك

## الفصل الثالث

### في علل الكبد والطحال

#### (٤٦) في اليرقان

حدهُ: هو عرض من اعراض عدة علل شاغلة الكبد او  
الاقنية الصفراوية. يحدث خصوصاً للكلب والخنزير  
اسبابه: اسباب اليرقان في الحيوانات غامضة . ويكثر  
حدوثه للكلاب التي يتبعونها دفعة واحدة وهي غير مستعدة  
لذلك. ولتي تنقبض امعاؤها كثيراً لفلة رياضتها او لوجود ديدان  
او حصى في اكبادها

اعراضه: العرض الاوضح هو اصفرار بياض العين والاعشية  
المخاطية والجلد. وقلة شهوة الطعام وترخ السيفران لم يكن اليرقان  
عرضاً لعلة اخرى يشفى بعد ١٢ او ١٥ يوماً بدون ان تظهر اعراض  
اخرى فاذا لم يشف بهذه المدة يظهر على المصاب الهزال ونصبية  
قشعريات واحياناً اعراض عصبية تشبه اعراض اليرقان في  
البشر وقد يشند هذا الداء خصوصاً على الكلب فترة حزيناً دائماً



لا ينتقل من مكانه إلا اضطراراً وقد يتقيأ مواد صفراوية وتكون  
امعاء شديدة القبض وبرازة أصفر صلباً. وقد يحدث أحياناً  
استطلاق الأمعاء فتكون البرزات نجسية وتكون شهوة الأكل مفقودة  
والبطن متورماً صلباً كثير الحس في القسم الكبدي. وتهبط درجة  
حرارة البدن. ويكون البول أحمر أو أسوداً كثافاً

وسير هذه العلة أن اخذت الهيئة الخبيثة سريع جداً وانتهأؤها  
وخيم أن لم تعالج بشتات وفطنة

العلاج : يبدأ بمسهل خفيف من ملح الطرطير أو من  
كبريتات الصودا واحسن منه الصبر من نصف درهم إلى درهم  
ثم الكالومل أي الزئبق المحلوي يعطى منوعاً من ٥ إلى ١٠ قححات  
تعطى دفعتين أو ثلاثاً في النهار. والمغاطس الخردلية السخنة  
والمشاريب المرة القلوية خصوصاً منفع الجنطيانا المضاف إليه  
من كربونات الصودا من ٢ إلى ٣ دراهم يومياً. وإن كان المصاب  
خزيراً كرر له اعطاء المقيئات فانها انفع شيء له

### (٤٧) احتقان الكبد

حدة: هو امتلاء أوعية الكبد امتلاء زائداً. من زيادة دخول

الدم إليها فتحتمل وترم

اسبابه: زيادة علف الحيوان وتشغيلة في الحر الشديد او وجود عائق يعوق دورة الدم في الكبد وقد يحدث عن جرح الاعراض: هيئة حزن. فقد شهوة الاكل. نطلب الشرب. امارات مغص خفي دائم. قبض الامعاء وانتفاخ البطن قليلاً وزيادة حسه خصوصاً على المرق الايمن وسخونة البدن وينبض النبض من ٥٠ الى ٦٠ نبضة في الدقيقة في الخيل. والاعشبة المخاطية تكون صفراء واحياناً يكون البول نجيعاً

اذا انتهت هذه العلة بالانحلال تشفى بعد مرور ١٢ لو ١٥ يوماً من ظهورها. على انه في بعض الاحوال يتعاضم الاحتقان فتفتجر الكبد او تسبب عنه السكنة الكبدية

العلاج: الفصد المتكرر من اي محل كان من البدن واستخراج كثير من الدم والمحولات الجلدية كاللرق الخردلية والمروخ النشادري والحراريق على المرق الايمن. مع المشايب الحامضة والمسهلات اللحية الخفيفة مثل كبريتات الصودا او المغنيسيا من ١٥ الى ٥٠ درهماً. او الصبر من نصف درهم الى ٤ دراهم حسب جنس الحيوان المصاب. هذا مع تقليل العلف والاعتصار على الحشيش الاخضر او الطحين المدوف بالماء. والراحة التامة

## (٤٨) ذات الكبد

حدة: التهاب نسيج الكبد الخاص وكثيراً ما يلتبس بالاحتقان الكبدي

اسبابه: نفس اسباب احتقان الكبد والسكتة الكبدية. رض اولطبة او سقطة عنيفة. نفوذ اجسام غريبة الى الكبد عن طريق المعدة. وجود حصي في الكبد. او انه يصعب عللاً آخر اعراضه: هيشة حزن. عسر في الحركة. تنفس سريع. سخونة جلد. مغص خفيف. تعسر تداد الحيوان اذ اريض او تظهر منه تنهدات. قبض الامعاء. مبرزات صلبة مغطاة بمادة مخاطية. واحياناً اعراض تشنجية. دوار. اصفرار الاغشية المخاطية

وانتهاء هذه العلة بالانحلال نادر. وعلى الغالب يظهر على سطح الاغشية نقط حمراء شبه بقرص البراغيث وتختنق القوائم ويأتي الموت

العلاج: فصد الحيوانات الكبيرة. ووضع العلق للحيوانات الصغيرة على المرق الامين. والمحدرات من بزر الخردل. والمحاريق ومن الداخل المسهلات كملح الطرطير الذواب او كبريتات

الصودا او الكالومل ٥ دراهم للحيوانات الكبيرة كالفرس و افمحات  
الى ٢٠ للصغيرة

### (٤٩) سكتة الكبد وتمزقها

حدها : تمزق نسج الكبد لزيادة احتقانها . وهذه العلة عسرة  
التشخيص لانها تلتبس بالاحتقان الكبدي الشديد او امراض  
اخر معوية

الاعراض : تظهر على الحيوان فجأة وبسرعة غريبة امارات  
الحزن والضئك والانحطاط . مع قشعريرة وارتجاف الجسم  
ويكون جلد الوجه متجمداً والنبض صغيراً خيطياً وضربات القلب  
شديدة والاذان والفوائم باردة والامعاء قابضة وشهوة الاكل  
مفقودة . ويكثر المصاب من الالتهابات الى خاصرته ويفحص  
الارض يديه . وقلم يربض وان ربض لا يقوم الا اضطراراً

وجملة هذه الاعراض تتابع بمدة وجيزة ثم يستط الحيوان  
ويموت حالاً . وفي بعض الاحوال تبقى العلة يومين او ثلاثة وفي  
كلا الحالين متمها الموت والشفاء نادر

العلاج : يسارع الى استفراغ الدم بالفصد ما لم يحدث نزف

دموي . ويفرك البدن فركا قويا ناشفا بمواد منبهة كالكحول او الخل .  
ويدفأ الحيوان ويغطي بجرام من الصوف . ويسقي المشاريب  
المحمضة بالخل او بجامض الطرطير او الحامض الكبير نيك . ويعطى  
حقنة مسهلة بزيت الخروع او بالملح الانكليزي . ويترك في راحة  
تامة . ولا يطعم الا كميات قليلة من طحين الشعير المدوف بالماء

— ١٠٠١ —

### (٥٠) حصى الكبد

حدها : هي تجمع اجسام مختلفة الحجم مثل الحصى في المرارة او  
في القناة الصفراوية او في اقنية الكبد فتسدها ويحدث من جرى  
ذلك قولنج اي مغص شديد يقتل المصاب به احيانا . ولا يعرف  
لها اسباب خصوصية

العلاج : يسكن المغص بسقي الحيوان من ٥ الى ١٠ دراهم  
من ثاني كربونات الصودا مذابة بماء . والعلاج الشافي يقوم باعطائه  
من زيت التريبنيتيا ٢ او ٥ دراهم يوميا ويطعم حب الكوكلان  
والخشيش الاخضر

— ١٠٠٢ —

## (٥١) احتقان الطحال

مثل احتقان الكبد يحدث من زيادة دخول الدم اليه  
فيجتمعت ويرم وقد ذكروا حوادث وجعلوا بها زنة الطحال ١٢  
رطلاً

اعراضه: خي . عسر تنفس . احتقان الاغشية المخاطية .  
تورم المرق الايسر والم في ذلك القسم . ومدة هذا المرض من بضع  
ساعات الى بضعة اسابيع

العلاج: الفصد . والمشروبات المسهلة الخفيفة كملح الطرطير  
من ٢٠ الى ٥٠ درهماً . حرقاة على المرق الايسر . المنوعات مثل  
يودور البوتاسيوم من درهم الى ٥ دراهم يومياً حسب نوعية  
الحيوان مع المشاريب المقوية كمغلي جذر الجنطيانا او خشب الكينا



## الفصل الرابع

في علل البريتون والكلى والحجاب الحاجز

### (٥٢) التهاب البريتون

حدة: التهاب الغشاء المصلي الكاسي الأمعاء والاحشاء  
البطنية والمبطن جدران البطن. وهو اما جزئي يشغل قسماً من  
الغشاء المشار اليه او عام يشغل كل الغشاء. وهو نوعان حاد  
ومزمن

الاسباب: قلما يحدث التهاب البريتون الحاد من دون  
سبب يهيئ ميكانيزم مثل ضرب او رض او جرح. او ثقب الأمعاء  
وخروج ما فيها الى جوف البريتون او انفجار في البطن او عن  
تكون خراج او ورم او وجود ديدان فيه وقد يكون الفتق المعدي  
وعملية الخصي سبباً لالتهابه وهو يحدث ايضاً عقب الولادة

اعراض التهاب البريتون الحاد: فشريرة الم شديد في البطن  
ويظهر كأنه متقلص. منكمش مع خمول تام وعسر تنفس ويبقى المصاب  
واقفاً مجمع القوائم محدب الظهر وان ربض يفضل الاستلقاء على

ظهوره. ويكون جلد وجهه منقبضاً متجمداً وعيونه غائرة ونظره  
شاخصاً وإن كان كلباً او خنزيراً يتقيا ويفقد شهوة الأكل ويكون  
العطش شديداً والأمعاء قابضة والمبرزات يابسة مغشاة بمادة  
مخاطية لا تخرج إلا بعسر ويرافقها تهيدات . وأحياناً يكون البطن  
منتفخاً والنابض سريعاً صغيراً متواتراً وقد يكثر المريض من  
الالتفات الى خاصرته

وإن كان الالتهاب مزمناً تكون الاعراض المذكورة اقل  
وضوحاً. فتكون حساسة البطن خفيفة والبطن متورماً منتفخاً  
والجسم هزيلاً والثدي وغلاف الثدي والنفث والنفث الخلفية متورمة  
والاغشية المخاطية مصفرة. والعطش شديداً والوفى كثيراً او قلما تنهي  
هذه العلة بالانحلال وانتهائها عادة تجمع مرشح داخل التجويف  
وتكون اغشية كاذبة وعاقبتها حطرة خصوصاً اذا عم الالتهاب  
البرصون كله وهذه العاقبة هي الأكثر حدوثاً

العلاج: الاستفراغ الدموي الغزير والمتكرر بالنصد او  
بالعلق على البطن. واللق الملية من بزر الكتان . او اللزق  
المحمرة من الخردل . والحراريق على البطن. وتعطى مدرات البول  
من الداخل كملح البارود او خلات النشادر ويعنى بان الامعاء  
تبقى ليثة. وإن كان المصاب كلباً يمرخ بطنه بالمرهم الزيتي ولتوقيف



## (٥٤) التزف الكلوي . بول الدم الكلوي

وجود الدم في البول لا يكون دائماً اصله من الكلية بل قد يكون من الحالب او المثانة او المجرى والآن نتكلم عن بول الدم الكلوي اسبابه: من اسباب بول الدم الكلوي الاذنه الميكانيكي مثل جرح ارض او جرح من قبل حصاة في الكلية تجرح جوفها او من قبل وجود ديدان في حوضها . او غيب عال اخر مثل الجهرة والجدرى . وفي بعض الاحوال يتسبب عن برودة الجسم بغثة بعد جز صوف الغنم

اعراضه: زيادة الحس في القسم الكلوي اي الصلب . مغص خفيف . عسر البول وتاليمة ونجيعةته ويرسب منه راسب مختلف الكمية حاوي كريات دم فاسدة . واذا كان مقدار الدم وافراً تكون خثرة في اسفل الوعاء وكثيراً ما يتخثر الدم في احد الحالبين او في المثانة فيتعذب المصاب اشد العذاب في اخراجه . وقد ينقطع التزف ويعود في اوقات غير معينة او عقيب حركة عنيفة العلاج: الحفن بماء بارد . والوضعيات الباردة على الصلب مع الراحة التامة . ويسقى من الداخل سيال اعلى كلورور الحديد

من درهمين الى اربعة ممزوجة بماء للحيوانات الكبيرة ومن ربع الى نصف درهم للصغيرة. هذا مع المشروبات المحبضة

— ١٢٥ —

## (٥٥) التهاب الكلية

حدة: مرض يحدث لكل انواع الحيوان ويكون أكثر خطراً على الكلب والفرس على ان حدوثه نادر وهو اما حاد او مزمن

اسبابه: من اسباب هذه العلة الافات الميكانيكية مثل ضرب او رض او جرح وحصاة الكلية او تجمع بول في حوضها بسبب ضيق مجرى البول. ووجود ديدان في حوض الكلية وقد يكون من اعراض علل اخرى كالطاعون البقري والمجهره والشلل الشقي

اعراضه: قشعريرة والم شديد في الصلب يمتد الى الافخاذ والخصي فيبقى المصاب واقفاً منفرج اليدين احذب الظهر متناقل المشي فيمشي كأنه يحرق قائمة وقد تصيبه نوب مغص كلوي تختلف شدتها. واما البول فقد ينقطع او يقل ويكون نحيباً يمازجه زلال واحياناً دم وترسب منه ندف فيبرينية

وإذا تعددت الفشعيرات ولم تخف الاعراض بحولها لم تكن  
في الكلية ويظهر في البول على هيئة كريات متفرقة او صلبة. ويغلب  
شهوة الأكل ويكون العطش مفرطاً والامعاء قابضة مع في وقد  
تصحب هذه الاعراض اعراض التهاب البريتون  
وسير هذه العلة سريع وقد تنتهي بالانحلال او الأزمان  
او الغغرينا

فان كان الاول تاخذ الاعراض في الزوال من اليوم  
الخامس الى الثامن. او الثاني يخف الام الصلي على ان الهزال  
والضنى يزيدان تدريجاً وتكون محاولة التبول متكررة والبول  
كدراً. او الثالث يضعف النبض ويكون منقطعاً. وعرق الجملنة  
غزيراً وقد يزول الام ويكون البول اسود تنناً

العلاج: اذا تشخص المرض في اوله يومر بالفصد العام  
المكرر وبالوضعيات الباردة على الصلب وان كان احتقان الكلية  
شديداً يومر بالتشريط على القسم الكلوي. ثم يغدس المريض المرض  
قليلاً توضع الترق المحمرة كالمخردلي ويستقى من الداخيل البشار وحب  
اللجاجة كينقوع بزير الكتان او لعاب السفرجل او الصمغ العربي  
مضافاً اليه من كزبونايا السوداء من درهم الى ٥ في اليوم جسمه  
نوعية الحيوان وتعطى الحقن اليوساية والجسمه للجسمه في البشاش

المهضية بدون ان تؤثر في الجهاز البولي كالصبر او زيت الخروع  
هذامع تقايل العلف والراحة التامة وحسن السياسة

### (٥٦) البول الزلالي

وجود الزلال في بول الحيوانات عرض لأمراض سببها مجهول  
ويصحب العلل التيفوئيدية والداء الزهري والجبل  
اعراضه: زيادة حس الصلب. احتقان الاغشية. تلبك في  
المشي بول متكرر ونزر محمر احياناً نجسي ويصير بعد بضعة ايام اصفر  
وغالباً عكر ابخالطة ندف تستجبل خثرة فيبرينية  
فان طالت هذه العلة تزداد كمية الزلال في البول وتختنق  
القوائم وتثورم وقد يحدث ذرب مفرط  
ولمعرفة وجود الزلال في البول تؤخذ منه كمية وتحمى او  
يضاف عليها قليل من الحامض النريك فتتخثر اذا كان فيه زلال  
والأفلا

العلاج: المحمرات على القسم الكلوي اي الصلب كالبزق  
الخردل او الحماض. والمشروبات اللعابية كما بزر الكتان او  
لعاب السفرجل والصمغ العربي مع ٤ دراهم كربونات الصودا

يوميًا. العلف الجيد المضاف عليه قليل من حب الكوكلان وقد يفيد اسقاء زيت التريتينا من ٤ الى ١٠ ادرام يوميًا ممزوجا بماء لعابي. ويغطي ظهر المصاب بالصوف ويربط في محل دفي. محجوب عن الهواء والبرد

—\*—

## (٥٧) بول الدم

حده: سيلان دم صرف او ممزوج بالبول. كثير الحدوث للبقرة ونادر للخيل والغنم. وهو من العلل التي تعم مقاطعة بكاملها واصل الدم قد يمكن ان يكون من الكلية او الحالب او المثانة او المهبل وهو اما ان يكون ذاتيًا او عرضيًا وحدوثه للاناث والحجوانات الفتية اكثر مما سواها

اسبابه: استعداد خصوصي في البقرة. والعلف نباتات راتنجية او قابضة وبعض انواع الشقيق وحليب البوم والوزال وبراعم السنديان والشربين. او نوع من الفطرين هو على الحشيش المبيس الفاسد والتبن المتعفن. وشرب الماء الشديد البرودة من ثلج ذائب. او عن آفة في الجهاز البولي من الكلية الى مجرى البول

اعراضه : يظهر فجأة الدم في البول ويكون لونه حسب كمية الدم التي فيه من الاحمر الصافي الى الاسمر البني وقد يكون عكراً ورائحة تركد منه جلط دموية او املاح . وكمية البول عادة تكون على حالها لكن دفعات التبول كثيرة . واما التبول فغير مؤلم على انه عقب هضم مواد قابضة يزيد حس الصلب وتبليك الحيوان في سيره وين . هذا مع عطش وخلل في شهوة الاكل والاجترار ومغص وذرب وقبض متواليين . اما الحليب فيتلون او ينشف

وان مكثت هذه العلة ولو اياماً قليلة تضعف المصاب بها وتوهن قواه

العلاج : اذا امكن الوقوف على العلة المحدثه تعالج تلك العلة ويمنع الحيوان من اكل النباتات النابضة ويعلف الحشيش الاخضر الجيد . ويسقى من الداخل ماء ديف بكاربونات الكلس من ٥ الى ١٠ دراهم يوميا محلى بالدبس . مع المشروبات المضاف اليها درهم من الحامض الكربوليك لكل اقة ماء وعندما ينقطع الدم يسقى الحيوان مناقيع الاعشاب المرة لتفويته كورق الجوز وجذر الجنطيانا وقشر الحور والصفصاف

## (٥٨) فالج الحبل الفقري


حدة، هو احتقان او نزف او التهاب الحبل الفقري واغشيته  
ومع ان هذه العلل تختلف تشريحياً قد اصطلحت العامة ان  
تطلق عليها اسم عرضها الرئيس وهو فالج الشق الموتر ويحدث لكل  
انواع الحيوان وهو اما عرضي او عقيب علة نيفو يديه او زهرية  
اسبابه، ان كان عرضياً فعن سقطة او كسر او خلع يسبب  
نشوش الحبل الفقري واغشيته. وان كان ذاتياً فعن تغيرات فصلية  
او عن برد او عقب ولادة متعسرة او عن علف الحيوان وهو في  
مربطه بدون تشغيل كما لو كان يشتغل

اعراضه: عرج من احدى القوائم فجأة. تلبك في المشي ثم عدم  
استطاعة الحيوان ان يتي واقفاً فيريض وان اضطر الى الوقوف  
ينفض على يديه ولا يقدر ان يثبت على رجليه وقد شل موخره  
وان كان نصف الحبل فقط مصاباً فلا يشل غير الجنب المقابل ولا  
تضمرفيه العضلات ولا تخسر حسها من الوخر على انها تضعف قوتها  
التقلصية. وقد يفقد المصاب قوة الحس والحركة اذا عمت العلة  
الضفيرة العليا والسفلى. وقد تبقى شهوة الاكل وكل امارات

الصحة ~~تغير~~ ان الحيوان لا يقدر على الوقوف ويبقى رايقاً فتعقر  
جوانبه وتشكون قروح فيضئ المصاب ويموت. وان خف المرض  
ووقف لا يزول العرج وتشتي رجله عندما يركزها على الارض  
ويبقى هكذا اشهر ابل اعواماً قبل ان يشفى تماماً

العلاج: عند ظهور العرض الاول اى العرج. يوقف  
الحيوان ويفصد وتستعمل المحبرات على الصلب كالخردل  
والمصرفات كالحماريق. ويسقى مسهلاً من الصبر ١٠ دراهم او  
من كبريتات الصودا ١٠٠ او ١٥٠ درهماً. ويحقن بماء الصابون  
وان فلع الحيوان بغتة ينقل بطريقة مريحة الى مربوطه ويفرش تحته  
الزبل او القش الناشف ويدار مرتين او ثلاثاً في النهار لئلا تعقر  
جوانبه حالاً

ومنهم من اشار بامرار مكواة حامية على ناحيتي الصلب. وفي كل  
الاحوال تجب تدفئة المصاب وان يطعم قليلاً كل مرة ويسقى  
كثيراً. وهذا المرض شديد الخطر دائماً



(٥٩) تمزق الحجاب الحاجز وانبثاقه

الحجاب الحاجز عضل مسنق يفصل متضمنات الصدر



عن الاحشاء البطنية واسباب نزق السقطات لو الشد العنيف  
وللمعدة لم تهضم العلف بعد او لطمة كسرت الاضلاع في القسم  
المؤخر لها

الاعراض : قد تختلف الاعراض باختلاف سعة المزق ففي  
بعض الاحوال يموت الحيوان حالاً بعد حدوث العارض المسبب  
وبعد الحادث نحدث كآبة وحزن وعدم شهوة الأكل مع نوب مغص  
متقطعة لاشارات خصوصية تدل عليه وقد يفحص الحيوان  
الأرض يديه ويكون التنفس متضيقاً عسراً والمناخر مفتوحة  
وبالاستقصاء يسمع عوض اللغط التنفسي المألوف قراقر يختلف  
عددتها وقوتها وقد لا تلاحظ اعراض ظاهرة اذا كانت مساحة  
المزق قليلة بحيث لا يمر منه غير جزء قصير من الامعاء الى الصدر  
على انه في كل الحالات تكون حركة الخواصر غير منتظمة. وان  
لم يخنق الحجاب على المعى فقد يمكن للحيوان ان يعيش عدة سنين  
على ان هنا الامر نادر جداً ولم يقرر له علاج

## الفصل الخامس

في علل المعدة

### (٦٠) المغص المعدي

اسبابه: كثرة الاكل خصوصاً اذا كان نخالة وكثرة الشرب  
ايضاً. والبرد والتعب. وهو كثيراً ما يصيب ذوات الحافر  
اعراضه: نوب مغص تختلف شدته على انه يكون اقل  
وضوحاً ما في المغص المعوي (سيدكر) يريض الحيوان بتانٍ  
ويحاول احياناً القيء. فان كانت كمية الاكل الغير مهضومة كثيرة  
تنبثق المعدة ويبقي الحيوان وهذا العرض ينذر بمخطر شديد. اما  
النبض فيكون سريعاً والتنفس عسراً

العلاج: يمنع الحيوان من الربوض ويسقى المشاريب المنبهة  
بكمية قليلة لئلا يزداد تمدد المعدة فيسقى الشاي او البابونج او  
الخمر البيضاء او القهوة او ماء ملحاً ويحقن بزيت الخروع هذا مع  
فرك قوائمهم فركاً شديداً بالخل وتمشيتهم

(٦١) النفخة. التطيل

سوء الهضم

تحدث النفخة للحيوانات المجترة لتولد غاز في معدتها من جرى

فعلها

سوء الهضم

اسبابه: اكل الحشيش الاخضر والميتدي فيه الفساد والذي  
يختم بسهولة خصوصاً اذا قطع واحي معرضاً للشمس او

الانتقال السريع من جيل الى جيل او اكل الاعشاب المضرة

الاعراض: توقف الاجترار في كيس الراس وانتفاخ البطن

ازداد الفم عسر التنفس مع غصن واثنين وانتفاخ البطن خصوصاً

الخامسة اليسرى انتفاخاً يكثر في بعض الاجوال اعظماً جداً

تعاين من حمراء البورة الدموية والتنفس وهو من الحيوانات اخناً قاً

ولا يحدث التطيل في كل الاجوال عن تجمع غاز في الكرش فقط بل

عن مواد غير مهضومة فيكون البطن اذاً تحت الجس مقاوماً

للضغط عجزاً وقد تنبل هذه العلة مدة وجيزة. ومن علامات

قرب الموت اخفاء النبض وشدة ضربات القلب وازرقاق


الاششية وانديلاخ اللسان ولوعاش عصبي ثم يسقط ويموت

وبعض الحيوانات يرجع الاكل من فيها وهذا من الاشارات

الحسنة

العلاج: يبدأ باعطاء روح النشادر السائل ١٠ دراهم منه  
مدودة بثلاث مائة درهم ماء تعطى دفعة واحدة او دفعتين كل  
نصف ساعة. هذا للبقر والخيول ودرهمين الى ٣ مدودة بماها ايضاً للغنم  
والعزوان لم يوجد بوخذ قبضة من ملح الطعام وتذاب في ثلاث اكواب  
ماء وتعطى دفعة واحدة وربع او ثلث المقدار المذكور للغنم. وان


لم تحصل افادة من اول جرعة  
يعاد اعطاؤها ثانياً وثالثاً ما لم يخش  
على الحيوان من الاختناق من  
تعاطم الطبل وقلة فعل العلاج  
وقيل ان لف جسم الحيوان يشرف  
مبلول بما يعين فعل ماء الملح المعطى  
ومنهم من مدح تغطيس المصاب  
في الماء الجاري ان وجد قرب نهر  
او ساقية عميقة تناسب هذا الامر



شكل ٢

وان اجريت هذه الوسائط  
ولم تزل العلة يلجأ الى بزل الكرش  
لافلات الغاز التجمع الذي اذا  
طال مكثته يشق الكرش او يخنق المصاب من جرى الضغط على

الجهاز الدوري والتنفسي اويسب احتقان الامعاء وهذا داء عيالة  
وطريقة البزل هي ان تاخذ الميزل (شكل ٢) بيدك اليسرى وتلقي  
راسه على خاصرة الحيوان اليسرى قرب منتهى الاضلاع في وسط  
الحذبة النائمة المسببة عن النفخة انظر (شكل ٢) ثم تضرب بيدك



شكل ٢

اليمنى الميزل بعنف بحيث يخرق الى الكرش ثم تسحب تاركا ابوتته  
في الثقب وثبتها بخيطين تربطها تحت بطن الحيوان فيفات  
الغاز المتجمع من الانبوبة حالا ويسمع له صوت على انه قد يبرمه  
شيئا من متضمنات الكرش ويسد ثقب الانبوبة فامرر حيثئذ  
فيها عودا او الميزل وادفع المواد السادة الى الداخل  
وقد يعناض عن الميزل لعدم وجوده في كل الاحوال

بشفرة ضيقة طويلة حادة او نحوها. وعن الانبوبة المرافقة المنزل  
 بالانبوبة من فصب تثبت في الثقب اخشاء من ان المواد النثرية  
 تجمّع الغاز وتبديد في التجويف البطني فتحصل عنها علل شتى  
 وعندما ايفلت الغاز يستريح المصاب حالاً وبعد قليل يعاوده  
 الاجترار فان لم تخش معاودة التطفل فاصحب انبوبة المنزل او  
 القصبة ولا تعن بالجرح الا من حيث النظافة لانه يلتم لذاته  
 ويدون خياطة. وان لم يعاوده الاجترار فاخط ٢٠ درهماً من  
 صبغة الصبر بدرهم من مسحوق عرق الذهب برطل خمر واسق  
 الحيوان الربع كل ساعة تصب في فيه بحيث يبتلع بلعات كبيرة.  
 وان ساعدت ذلك بفرك جسم المصاب ثم بتغطية بدنه وتركه  
 في مرتبط منفرد يعود الى الاجترار غالباً قبل بلع الجرعة الرابعة من  
 الدواء المذكور

وقيل انهم ادخلوا حقنة ذات بزال طويل في دبر الحيوان  
 وسحبوا الغاز المتجمع في الكرش. ونظراً لما نعرفه من وضع الجهاز  
 الهضمي في الحيوان نشك بنجاح هذه العملية ولم نذكرها هنا الا  
 اشارة الى تجربتها

## (٦٣) احتقان الكبد

حدة: عاة كثيرة الحدوث شديدة الخطر خصوصاً في الغنم  
وهذا الاحتقان نتيجة تجمع مواد ثلبد ونجف وتصلب على هيئة  
اقراص بين ثنيات المعدة الثانية المعروفة بام سبع طوابق اوقبوعة  
ام ناصر الدين

اعراضه: عدم انتظام الاجترار. رفض العلف. تطبل  
خفيف. مغص. هيئة انحطاط. ترنج في السير. احتقان الاغشية  
المخاطية. جفاف الفم وسخونة. تكثف اللعاب. انين خصوصاً  
وقت الربوض. قلة الدر. انقباض الامعاء. اسوداد البراز  
وجفافه وتغطيته بمادة مخاطية. هزال. كمودة الشعر. عسر  
الوقوف. وقد يخالط هذه العلة احياناً شلل والتهاب بريتون مع  
انسكاب مبرشج فيه

العلاج: تقليل العلف وتكثير الشرب؛ فرك البطن. الحن  
المليئة كما يغلى ورق الخبازي. ويسقى المصاب ٥ دراهم من  
الحامض المورياتيكي اي روح الملح في رطل من منقوع حشيشة عطرية  
كالننع او القصعين. ويعطى مسحوق عرق الذهب من ٢ الى





الغشاء. ولا يحدث قيء الدم بدون غزق بعض الاوعية الدموية  
علاجاً : راحة تامة . تصويم المصاب وإسقاؤه المشروبات  
القابضة او المحمضة المبردة بالثلج اذا امكن وجودة وانجح دواء في  
هذه العلة اعلى كلورور الحديد من درهمين الى ٥ ممزوجة بماء  
للحيوانات الكبيرة وربيع درهم الى درهم للصغيرة

## الفصل السادس

في علل الأمعاء

### (٦٥) التهاب الأمعاء

حدة : التهاب الغشاء المخاطي المعوي يحدث لسائر انواع  
الحيوان وهو نوعان حاد ومزمن  
اسبابه : رداة العلف وفساده  
الاعراض : تبدي اعراض الالتهاب المعوي الحاد بقله  
القابلية . توقف الاجترار في الحيوانات المجترة وان كان كلباً ففي .  
ضعف عام . حمى خفيفة . احمرار الاعين . كثافة اللعاب .  
ايضاخ اللسان والم في البطن تحت الجبس اذا كان المصاب

عن الحيوانات الصغيرة احياناً وقرقر وانباض البطن وقبض  
الامعاء وظهور غشاه على البراز من مادة مخاطية . ثم يعقب القبض  
ذرب وطحراي زحير . وقد يخرج احياناً العلف غير مهضوم .  
ومدة هذا الداء اسبوع تقريباً وشفاءه سهل

اما في النوع المزمن فيصير البراز نثناً كثيراً فيه فضلات الاغذية  
ويخالطه دم او مخاط . اما شهوة الأكل فتفق والضعف يزداد  
ويتطبل البطن ثم يضر ثم يتطبل وهكذا . وقد يخالط هذه العلة  
استسقاء البطن

العلاج : الحمية عن الأكل . المشروبات المملطة اللعابية  
كمشقوق جنود الخطي والبابونج مع ملح الطرطير . اوراق حشيشة  
البنج لآكلة النبات من ٤ الى ٦ دراهم . الاقيون اذا كان المصاب  
كلباً او خنزيراً . المحولات كنزق الخردل على البطن او فركه  
بالمروخ النشادري . وقد يفيد الفصد والمسيلات الملحية مثل  
كبريتات الصودا او المغنيسيا والكالومل . والحفن بزيت الخروع  
هذا مع ترقية الحيوان وحسن سياسته من حيث العلف  
والتدفئة

## (٦٦) في الزحير وهو الدوسنطاريا

حدة: علة النهاية فيها يصيب التهاب بالاكثير نسيج  
الغدد المعوية ويحدث فيها تقرحاً. وهذه العلة أكثر ما تصيب  
البقر. وتخذ هيئة وافدة

اسبابه: التعرض في ايام الربيع الاولى لبرد رطب في يوم  
كثير الضباب. والعدوى من مفرزات حيوانات مصابة به  
ومختلطة

اعراضه: نفس اعراض التهاب الامعاء. وقوف الشعر.  
جفاف المناخر. قذر اللسان. ثقرز. بطو الاجترار. التديك.  
تواتر التكلف الى البراز ومغص وطحر والمواد المندفعة تكون  
دامية مخاطية قليلة الثفل يفلت معها غازات تن. ويتالم البطن تحت  
الحبس. وعندما يتقدم الداء تزداد حساسة البطن ويحجم المصاب  
وقد ينسلخ ما حول الدبر. ومدة هذه العلة تختلف فقد تنتهي  
بالصحة في الاسبوع الثالث او الرابع او تستعصي فيهزل الحيوان  
كثيراً ويموت

العلاج: تغيير المرعى. العلف بالطحين. ويسقى المصاب

مغلى المواد القابضة كمغلى قشر السنديان او جنور الرتانيا او قشر  
الرمان او جنور الجنطيانا . كبريتات الحديد مذاباً بالماء درهم في  
اليوم لو اقل حسب جنس الحيوان . ماء الحامض الكربوليك مع  
اللودنم اى خمر الاقيون . الحارريق على البطن . الحفن بمغلى  
قشور قابضة كالمذكورة انفاً . تدفئة المصاب وحسن سياسته من  
حيث النظافة وحسن تهوية الربط



### (٦٧) القولنج اوسدد الامعاء

حده: هونوب مغص شديد يحدث عن سوء الهضم في  
الامعاء او عن انحشاك مواد غريبة فيها او عن حصي تكون هناك  
وهو يحدث لسائر انواع الحيوان خصوصاً للخيـل  
الاعراض: تظهر فجأة على الحيوان امارات الكابة والقلق  
ويكثر التديك والتلويح بذيله ويبحث الارض يده ثم يبرض ويتفرغ  
ويتخذ على الارض هيئات وضع مختلفة ثم ينهض وقد يصاب باسـر  
البول وقبض الامعاء . ويكون النبض سريعاً منتظماً غير منتظم  
والاذان باردة . والجسم اوبعض اقسامه مغطاة بعرق بارد وقد يبلغ  
الام احياناً اقصى درجات الاحتمال فيهيـج المصاب كالمجنون بحيث

لا يمكن النوم منه ويتكرش الوجه وتذبل العين وتبيض الاغشية  
المخاطية ويتنفخ البطن احيانا ثم يبرد الجسم ويصفر النبض ويتلاشى  
وموت المصاب

وان كانت العاقبة حسنة تزول الاعراض المذكورة بغنة  
فيتنفخ الحيوان ويبول ويبرز وان كان امامه علف اكل منه وقد  
شفي

العلاج: النصد من اي محل كان من الجسم . ويسقى ١٠ او  
٢٠ درهما من الاثير الكبير بتيك بماء او اللودنم اي خمر الافيون من ٥  
الى ٨ دراهم والاحسن ان يعطى الاثير والافيون معا ويحقن بمائة  
او بمائتي درهم من زيت الخروع و ١٥ درهما من زيت التربينينا  
مذابة بماء سخن . مع مداومة تشيته وان كان البطن متطبلا ينزل  
مع مراعاة الشروط التي ذكرناها في الكلام عن النفخة اي التطبل  
على ان النزل في الخيل من الخاصرة اليمنى لامن اليسرى كما في  
البقر وباقي المجتر

### (٦٨) انفاد الامعاء

حده: الانفاد هو اندغام بعض الامعاء في بعضها . يحدث

لسائر الحيوانات . وهو ردي العاقبة

اسبابه : حدوث الاندغام امر فجائي على الغالب عقيب شرب  
ماء كثير البرودة يتسبب عنه حركة دودية شديدة في قسم من  
الامعاء مع تقلص الالياف العضلية المحيطة بذلك القسم وارتخاها  
في القسم الذي يباشره من اسفل

اعراضه : مغص شديد يصير الحيوان من الماء كالجنون . تكثر  
الوجه وكثرة العرق في الجلد

العلاج : لا علاج لهذه العلة . قيل انهم نجحوا احيانا بنفخ  
الامعاء بمنفاخ عن طريق المستقيم وانها الواسطة الوحيدة لفك  
الاندغام اما شق البطن وفك الانغداد يجذب المنغمد من غماده  
فقلما ينجح

—x—

### (٦٩) هبوط المستقيم

حده : هو ان يظهر طرف المستقيم من الفمحة اي حلقة الدبر  
على انه غالبا لا يظهر الى الخارج غير الغشاء المخاطي المحفون  
الاسباب : تجمع مواد صلبة في المستقيم اما من جرى الطهر

المسبب عن القبض او عن التهاب الأمعاء . او عن حقن الحيوان  
بسوائل شديده السخونة

العلاج : رد المستقيم النافر وان كان الغشاء مخنثاً وتعسر  
ارجاعه بشرط اولا لیسيل منه كمية من الدم المخثن ويحقن بعد  
الرد بماء بارد او بمغلي مواد قابضة باردة مثل قشر السنديان  
او الرمان او مجلول الشب الابيض وقد يحوج الحال احيانا الى  
عمل رباط مخصوص موافق لضغط الفمقة بدون ان يعوق مرور  
الفرث



## الفصل السادس

### (٧٠) في الديدان

الديدان تعيش وتنمو في الأمعاء والاحشاء لولا انسجة وقد تصل  
الى الحيوانات من النبات الذي تغتدي به واليه من براز حيوانات  
مصابة بها او من الماء وهي انواع كثيرة لا نتكلم هنا الا عن اكثرها  
وجودا وضررا

## (٧١) العلق

يتوصل العلق الى فم الحيوان من ماء يشربه وإلى المهبل  
من تغسيله في ماء تكثرفيه هذه الديدان  
علاجه: الماء المالح او ماء الحامض الكربوليك . او ماء الخلط  
فيه قليل من روح النشادر او زيت التريبتينا او البترين شرباً  
او حقناً  
قيل انه اذا وضع الانكليس في البرك او الينابيع التي يكثر  
فيها العلق يلاشيه



## (٧٢) اسكارس الخيل

ويقال له الاسكارس ذو الراس الكبير . هو دود مختلف  
الطول بين ٦ و ١٦ فيراطاً اسطوانياً الشكل مرأس من طرفيه  
غير ان الراس ادق من الطرف الاخر محمر اللون شفاف بحيث  
تُشاهد احشائه اذا وضع بين العين والنور . مقره الامعاء الدقاق  
وقد يكثر حتى يكاد يسد الامعاء . وقد لا يوجد منه غير دودة او  
دودتين



اعراضه: لا عرض يدل على وجوده اذا كان قليلاً لكن اذا  
 كثير يتسبب عن وجوده نوب مغص واحياناً فتق الامعاء  
 علاجه: الرمح اي الزرنج الايض (طعم الفار) نصف درهم  
 يومياً مذروراً على علف الحيوان مبلولاً. او بطعم الحيوان من  
 الكوكلان ١٥ يوماً مع ثلاثين درهماً من ملح الطرطير ثم يعطى ١٥  
 درهماً من الصبر. زيت التريبتينا ٢٠ درهماً مع ٢٠ درهماً زيت  
 الخروج



### (٧٣) الاسكارس المختزيري والبقري

دود كالسابق يصيب البقر والمختزير مفره الامعاء الدفاق  
 اعراضه: قبض الامعاء ونوب اعراض تشبه اعراض  
 الصرع  
 علاجه: زيت التريبتينا ٢٠ درهماً وزيت الخروج ٢٠ ايثر  
 كبريتيك وان لم تخرج الديدان فتعاود الجرعة



### (٧٤) أكسيورس دودي

دودة صغيرة بيضاء مفرها الامعاء والمستقيم في الكلاب

اعراضها: حكة الالست فيكثر الكلب من حك دبره على  
الارض وعند فحص المبرزات يرى الدود فيها  
علاجها: يحقن الكلب بماء الملح او بمنقوع الخشب المر مع قليل  
من صيغة الصبر

— ١٠٨ —

### (٧٥) ذوالفمين الكبدي

دود طوله نحو ثلاثة ارباع القيراط وقد يبلغ قيراطاً وعرضه  
بين نصف القيراط وثمانية خطوط مفلطح الهيئة لونه بني فاتح مائل  
الى الاصفر مع شيء قليل من اللون الوردي . وهو كثير الوجود في  
البقر والغنم والمعز . مفره الاقنية الصفراوية والمرارة والكبد . وعن  
وجودها تحدث للغنم العلة المعروفة بسوء الفنية المائية راجع ما  
ذكرناه هنا لك

— ١٠٩ —

### (٧٦) التينيا العريضة

هي اكبر الديدان المستقرة في جسم الحيوان يبلغ طولها مراراً  
كثيرة ٦٠ قدماً . راسها طويل دبوسي الشكل طوله  $\frac{1}{1}$  القيراط

وعرضه  $\frac{1}{36}$  من الفيراط ثم يستدق فينتهي الى العنق وعلى نحو ثلاثة  
 قراريط من الراس يتندي الانقسام الى فصوص عددها نحو  
 ٤٠٠٠ فص . وهي توجد في البقر والغنم . ومقرها الامعاء الدقيقة  
 اعراضها : يعرف وجودها من ظهور فصوص منها في  
 اللبرزات . ومن هزال المصاب وزيادة العطش وشهوة الأكل  
 ونفخة البطن وعدم انتظام الاجترار ووهن ثم موت  
 علاجها : زيت التريتينا والخروع . السرخس الذكر ٥٠ او  
 ٦٠ درهما من مسحوق جذره للحيوانات الكبيرة ومن ٥ الى ٢٥  
 للصغيرة حسب الحسن واحسن علاج الكوسواي الحشيشة الحبشية  
 بالكمية ذاتها وبعد ساعتين من تناول النبات يعطى مسهلاً من  
 زيت الخروع

## الفصل السابع

في علل الجمجمة والدماغ

(٧٧) شج او جروح جلد الراس

اسبابها : سقطة اولطة او ضربة بالآلة واخزة او قاطعة او

راضة

الاعراض: قد تختلف حسب اختلاف طبيعة الجرح  
وهيئة بان يصحبة او لا يصحبة كسر العظم او نزف دموي او جسم  
غريب متشبث فحالة الجسم العامة تختلف حسب شدة العرض  
العلاج: غسل الجرح بالماء واستخراج الجسم الغريب منه  
ان وجد وان كان النزف غزيراً توضع الضامات القابضة كحللول  
اعلى كلورور الحديد او محللول الشب الابيض او ملح الرصاص  
وان لم تنجح فالضغط والربط وان اقتضت هيئة الجرح بخاط ويداوم  
سكب الماء البارد المضاف عليه شي من الحامض الكربوليك. وان  
كان فلفهون او خراج يفتح حذراً من مكث الصديد. وان حدثت  
حمى يفصد الحيوان فصداً خفيفاً ويسقى المشارب المسهلة من ملح  
الطرطير او كبريتات الصودا مع تقليل العلف



### (٧٨) كسر عظم الجمجمة

قد يتخذش عظم الجمجمة من لطبة او سقطة بدون ان  
يظهر جرح احياناً فان ظهر جرح تسهل روية العظم المصاب والّا  
فيستدل عليه من احقان والم موضعي وان كان العظم منضغطاً

وضاغطاً للبخ تظهر على المصاب اعراض خمول وسبات. وقد  
يتسبب ضغط البخ أيضاً عن وجود جسم غريب او عن تجمع مرتشح  
داخل الجمجمة

العلاج: ان كان العظم ضاغطاً للبخ فلا سبيل الى اصلاح  
الحال الا بعملية جراحية يقال لها التربة لا يدرك كنه دقتها سوى  
من مهربن الجراحة. وان كان الكسر ذا شظايا تزال الشظايا.  
ويفتح طريق للمرشح ان تكون. ثم بخاط المرحح الأفتحة لمرور الصديد  
ان تكون ويغير عليه بالضمادات الباردة الكروية. ويسقى من  
الداخل المشروبات المسهلة المحمية هذا مع تقليل العلف والقصد  
اذا حدثت حي



### (٧٩) ارتجاج الدماغ

يرجح الدماغ من جرى لكمة او سقطه ارضة فتبطل الدورة  
الدموية فيه فجأة مؤقتاً وتختلف درجة ما يتسبب عن ذلك فقد  
يكون عرضاً يزول سريعاً او شديداً الخطر يبقى عقبه المخ معتلاً  
وقد يميت حالاً

الاعراض: هيئة بله وخمول. خدر الجسم. نخود الحس وضعف  
قوة التقلص وإرتخاء الشفاه وتدليها وانتشار حدقة العين وبطء  
النبض وصغره

العلاج: المشروبات المنبهة كالخمر أو الكونياك أو السبيرتو  
وفرك الجسم فركاً قوياً. والزرق المنبهة الخردلية على البطن  
والانخاذ. وعندما يتنبه النبض يفصد المصاب



## (١٠) استسقاء الدماغ

هو ارتشاج سيال مصلي بين الدماغ و أغشيتيه . وقد يكون  
خلفياً او يحدث في سير مرض اخر وقد يحدث من وقوف نحو  
الجنين

اعراضه : عظم جرم الراس واتخاذ هيئة مخروطية الشكل وفي  
بعض الاحيان يظهر على هيئة كيس ملان سيالاً متموجاً . وقد يضعف  
المصاب ويكون بحالة خمول تام ويصيبه الحول فيرى الاشباح  
مزدوجة ويرفض الأكل وإن كان فلولاً يلتهم الضرع  
العلاج : لا علاج لهذه العلة مطلقاً

## (٨١) شلل عصب الشفاه وجناح المناخر

علة تحدث لسائر انواع الحيوان خصوصاً الخيل  
اسبابها: النوم المستطيل والراس مسنود بحيث تنضغط  
الضفيرة التي تحت الوجنة  
الاعراض: انجذاب الشفة وفحة الانف الماكسة للعصب  
المصاب . سيلان اللعاب . ضيق فتحة الانف فيسمع للهوا بعد خوله  
وخروجه منها صوت مختلف قوته

العلاج: الفك بقطعة صوف خشن ناشفة على الوجنة او  
بها مبلولة بمروخ الشادر او بزيت التربينينا . حراقة على خد  
المصاب . وان لم تغد هذه الوسائط فالكمرباثية (دولاب البرق)



## (٨٢) احقان الدماغ

حده: زيادة الدم في اوعية الدماغ واغشيته  
اسبابه: التعب المفرط في زمن شديد الحر خصوصاً بعد  
العليق وقد تلحق ايضاً بعلة اخرى كعلل القلب والعلل  
التيفويدية

الأعراض : دوار . سير مترجرج . نقص في قوة الحس والتقلص . اسناد الجمجمة على الملعف أو الحائط . تقلص . تشنج . ثم فقد البصر . عدم انتظام الهضم خصوصاً في الحيوانات المجترة قبض الأمعاء ويبرد الجسم قبل الموت بقليل

العلاج : يربط الحيوان في محل مظلم بعيد عن الغوغاء ويستخرج له كمية دم قليلة إذا كان قوياً دموياً والاحتقان شديداً والعيون والاعشية المخاطية حمراء محتقنة والأف فيصب الماء البارد صباحاً متواصلاً مدة على الرأس وتستعمل المحبرات الجلدية كالفرسك بالسوائل المنبهة والزرع الخردلية والمساهل واحسنها رب الراوند أو الصمغ النقطي ١٠ دراهم منه للحيوانات الكبيرة ونصف درهم الى درهم للصغيرة . والكالومل اي الزئبق المحلو من درهم الى درهمين للحيوانات الكبيرة ومن ربع الى نصف درهم للصغيرة . ٥٠٠  
مع الراحة التامة وتقليل العلف

### (١٢٣) التهاب النسيج داخل الجمجمة عموماً

تلتهمب النسيج داخل الجمجمة من تعرض مستطيل لفعل اشعة الشمس أو من ضربة عليها أو كسر عظمها .



الاعراض : الانقطاع عن الأكل . عسر الحركة . كلال  
الحسن . احمرار الاعين . التاثر من النور والضجة . حركات  
اضطرابية غير منتظمة على الاخص عندما يرفع المصاب راسه .  
ويفضل الحيوان ان يستند الى الحائط

علاجه : الفصد . الحرق على العنق . المسهلات . الحن  
المهيجة بماء الملح او بماء مزج فيه زيت التريتنينا . ربط المصاب في  
محل مظلم بعيد عن الضجة . تقليل علفه وحسن سياسته في مدة  
النقه

—xoi—

### (٨٤) النزف الدماغى . السكتة

هو انسكاب دم في جوهر الدماغ او في اغشيته . وحدث  
السكتة اما فجائي قتال او بطي تدريجي تسبقه اعراض لا ينتبه اليها  
في الحيوانات غير من كان كثير الاعتناء شديد الخدر  
اسبابها : الاشغال الشاقة . الراحة الكلية مع كثرة العلف .  
الضرب او السقوط العنيف على الراس . او تحدث في سير بعض  
الامراض الخميرية او المزاجية الحادثة من تسم الدم

الاعراض: يسقط الحيوان بغثة الى الارض ويفقد قوة الحركة والحس. وقد تختلج بعض العضلات. ويكون التنفس سريعاً فلا يلبث ان يموت. وان كان مقدار الدم المنسكب قليلاً بحيث لا يقتل حالاً يبقى المصاب مطروحاً يصعب باسنانه وحذقة عينه منتشرة ومناخيره مفتوحة واغشية العين والمناخر والغم مخفنة حمراء والفواطم مرتخية والتنفس قصير بطيء والنبض صلب خفي والبدن بارد. وقد تنفلج بعض اقسام الجسم. وسير العلة سريع وانتهأؤها الغالب الموت

العلاج: الوضعيات الباردة على الرأس. والفصد. الحرقائق على العنق. فرك الجسم بالمرّوخ النشادري او بزيت التريتينا او فركاً ناشفاً بنسج صوفي خشن. المشروبات والحفن المسهلة واجودها زيت الخروع ٤٠ درهماً وزيت التريتينا ٢٠ درهماً في ماء الشعير



## (١٥) الدوار الدودي

حذرة: علة مزمنة تحدث عن وجود نوع من الديدان

الكهسية في ادمغة الحيوانات المجترة خصوصاً الخنم . تنفذ الى الدماغ عن طريق المعدة وهناك تنمو . واصل هذه الديدان من مبرزات الكلاب تلتصق زبائنها بالعشب فتربعه المواشي فيكون سبب هلاكها

الاعراض : رفض الاكل . ضعف . خمول او تهيج . تنكيس الراس . يركض الحيوان بدون سبب ظاهر نافضاً راسه الى اليمين او اليسار دائراً الى جهة او اخرى . ويكون دائماً بعيداً عن القطيع متبيس القوائم ابله . وترى مقلته كأنها كبرت ولون عينيه يصير مزرقة

وقد يعرف مركز الدودة في دماغ المصاب من حركات راسه ودورانه فان كانت على فص من فصوص الدماغ يدور الحيوان لجهة الفص المصاب ولا يدور الحيوان اذا كان مركز الدود في الخط المتوسط للدماغ وان كانت الى الامام يكون الراس منكساً او مرتفعاً بحيث يقلب الحيوان الى الوراء اذا كانت الى الجهة الخلفية . ومدة هذه العلة تطول وتعاود نوباً يستكن الحيوان في فتراتها نوعاً . على انه اخيراً يهزل وتنطلق امعاؤه وتفرز مناخره ويكمن بصره ويموت ضئياً

العلاج : لادوا غير ثقب النفطة حيث وجود الكيس الدودي

وتفريضة وحرق المحل بصبغة اليود . او ثقب الخحف فوق  
الكيس وسحب . على ان هذه الوسائط عسرة الاجراء غير ثابتة  
النتيجة



## الفصل الثامن

في علل العين

(١٦) الكمة . او الماء الاسود

حدها : ضعف او فقد البصر بدون تغير ظاهر في طبقات  
العين

اسبابها : رض الدماغ او اعتلاله او اعتلال اغشيتيه . الدوار  
البسيط . الهرم

الاعراض : الكمة النامة اذا اصبحت العينان يستدل عليها  
بحركة الاذان وسير خصوصي والتنظام الحيوان بما امامه وان  
كانت عين واحدة مصابة يكون الراس مائلاً الى جهة . وان  
فحصت العين لا يشاهد فيها تغير على ان الحدقة تكون منتشرة

لانتفاخ بعض بعرضها للنور كما في الحالة الطبيعية. ويظهر قعر العين  
ايضاً مائلاً الى الخضرة

وقد يعسر تشخيص العلة اذا كانت لم تكمل بعد لان الاعراض  
المذكورة اعلاه تكون اقل وضوحاً ويحدث غالباً في هكذا حالة  
ان الحيوان يصير جموحاً لانه يشاهد الاشباح على خلاف ما هي  
عليه. وقد تصغر المقلة اذا ازمن الداء

العلاج: الخلال او الحرايق على العنق خلف الاذان.  
فرك المحل المذكور بمرهم النشادر المخضر حديثاً بمزج ١٠ دراهم من  
الزيت بمثلها من روح النشادر القوي ومن الباطن يعطى من ثلثة  
دراهم الى درهم من مسحوق جوز اليوميأ حسب جنس الحيوان  
المصاب وان كان كلباً يعطى من فحمة الى ٥ فقط. ومنهم من  
اشار بالفصد وبالمساهل الحريفة على ان هذا الداء من العلل  
العضالة وانجبع دواء فيه تسمين الحيوان ونحره اذا كان ما يوكل

—•—

### (٨٧) الرمد. التهاب الملتحمية

التهاب ملتحمية العين يحدث عن لطمة او احتكاك او عن  
وجود جسم غريب كحبة رمل وما اشبه في العين او عن علة في

الجفن كانه انقلابه الى الاعلى او الى داخل المقلة بحيث تفعل الاهداب  
كفعل جسم غريب وبعض انواع الرمد يمتد بالعدوى  
الاعراض: احمرار يياض العين وسخونتها وتدمعها. تسمك الاجفان  
وتورمها. وقد تشكدر قرنية العين احيانا تكدرًا كاملاً او جزئياً  
وتتلاصق الاهداب وقد ينسلخ الجلد من مجرى الدمع  
وقد تفرز المقلة احياناً عوض الدموع مفرزاً صديدياً فيقال  
للعلة اذ ذاك الرمد الصديدي. والرمد يختلف شدة من التهاب  
الغشاء المخاطي للاجفان الى التهاب القرنية وتقرح القرنية  
العلاج: يزال السبب ان وجد. فصد المصاب من شريان  
عند زاوية العين. الشريط. الحجم. غسل المقلة بمغلى زهر البلسان  
او جذور الخطمي او محلول مواد قابضة كمنسوب ملح الرصاص او  
الشب. ويقطر داخلها من محلول كبريتات النحاس اي الشب  
الازرق ١٥ قمحمة منه في ١٠٠ درهم ماء او من محلول نترات الفضة  
١٠ قمحات منه في ٣٠ درهما من ماء مقطر او ماء الورد

### (٨٨) الرمد الزكامي

هو التهاب نسيج العين الداخلية من جرى لطمة او سقطة على

العين او عن امتداد الالتهاب من الجلد في علل معوية او نفاطية  
اعراضه: احمرار المقلة وزيادة حسها مع ألم شديد وتدمع غزير  
ثم بعد ٢٤ او ٢٦ او ٤٨ ساعة تتعكر القرنية والرطوبات الداخلية  
تتكسر وأحياناً تصير دامية وتنفر القرنية ويشتد الألم وتنفذ شهوة  
الأكل . وإن لم يحصل انحلال ويتبدد الالتهاب يتقرح سطح القرنية  
ويحصل مرتشح داخل الطبقات وتحدث الكمئة او كثافة البلورية  
او انفصال الشبكية

العلاج: اذا كان الاحتقان والتضيق شديداً يرسل ٢٠ علفة  
على ظاهر الاجفان او قسبة الانف . وتضمّد العين بماء فاتر ويحصر  
المصاب في محل مظلم ويعطى المساهل القوية واحسنها الصبر .  
والحراريق على صفحة الوجه

### (١٩) بياض القرنية . اللقطة

ضبابة القرنية تحصل عن تمخلل جوهر القرنية بليفا او عن  
اندمال قروح القرنية وهي لاتحدث الا لكها تسبب اضطراباً في  
البصر

العلاج: اذا كان البياض على القرنية خفيفاً يزال باستعمال

كحل من مسحوق كبريتات الصودا او من الكالومل اي الزئبق  
الحلو او بزيج من مكس التوتيا والكالومل والسكر والصبر اجزاء  
متساوية مدة طويلة

ولا نتكلم عن امراض العين الجراحية لانها من متعلقات  
المهريين بفن الجراحة ونقتضي لانقاذها دروساً كلية وآلات عديدة  
مختلفة ...



## الفصل التاسع

في علل الاذن

(٩٠) التهاب الاذن. زكام الاذن

هذا الالتهاب كثير الحدوث للكلاب ونادراً للحيوانات الاخر  
اسبابه: دخول جسم غريب الى الاذن. وفي الكلاب عن  
بنية قوباوية

الاعراض: ألم عند قاعة الاذن. يكثر المصاب من نفخ  
راسه مائلاً به الى جهة الاذن المصابة. ويعوي عواء الالم. ويكون  
داخل الاذن احمر رطباً ثم تزداد هذه الرطوبة فتفرز مادة  
صديدية رمادية اللون لها رائحة خاصة



وان انتقلت العلة الى درجة الازمان يشاهد احياناً قروح صغيرة دائمة متفتحة القاعدة قليلاً. ويكثر المصاب من حك وفرك اذنه ويهزل واحياناً يطرش

العلاج: تنظيف الاذن وحفنها بمغلى ورق الخبازى فانراً باضافة قليل من كربونات الصودا. او بماء الصابون فانراً وان كان الالم شديداً يضاف الى الماء بضع قطرات من اللودنم او مغلى بضعة رروس خشخاش. فان لم تحصل نتيجة فالحسن القابضة كمذوب الشب الابيض او ملح التوتيا او نترات الفضة وما يفيد كثيراً الجليسرين ممزوجاً بصبغة اليود مثلاً بمثل يقطر منه قليلاً الصبح والمساء. وان تكون خراج يشق ويحفن اذذاك بمذوب بمرنغيات البوتاس ١ منه الى ١٥٠ ماء. والخرادل. والحراريق. والمساهل تستعمل في الاحوال العسرة المستعصية. وان كان التهاب الاذن عقيب علة جلدية او صاحباً لها يستعمل الرهج اي الحامض الزرنيخوس من قحمة الى قحنتين يومياً اذا كان المصاب كلباً ومن ١٠ الى ٢٠ اذا كان كبشاً وضعف ذلك اذا كان من الحيوانات الكبيرة. او يودور البوتاسيوم من درهمين الى ثلاثة للحيوانات الكبيرة ومن ٥ الى ١٠ قححات للصغيرة كالكلب ودرهم للغنم

## (٩١) نقرح الاذان

نقرح حوافي صدفه الاذن علة خاصة بالكلاب التي اذناها طويلة متدلية

اسبابه والاعراض : احنك الاذان بمواد تجرحها او تكرر وخزها بالنباتات الشائكة ومن جرى ذلك ينهيج المحل ويحوج الحيوان الى حكه ونفض اذانه وهذا يزيد التهييج وينع التحام الخدوش ولطول مكثها تبقى دامية متنفخة الحوافي متصلبة تتخدش بسهولة . واحياناً يتوصل الالتهاب الى الغضروف ويهتك على النادى . وعدم اذعان الكلاب للمعالجة تجعل هذه العلة عسرة الشفاء

العلاج : الشرط الاول هي ان نتخذ طريقة بها ترفع الاذان بحيث لاتمس ما يشوكها وتغسل بمذوب الشب الابيض فانراً . وعلى الغالب نشفى بهذه الواسطة البسيطة والا فاقطع الاذن او اقشر جلدها واكوها بحجر جهنم او بالشب الازرق . ومن جرى حركة الاذن المستديمة يتكون غالباً ورم ملوئ دماً في الوجه الداخلى لمحارة الاذن في النسم المتدلى وهذا الورم يكون متموجاً يستجيب الى كيس مصلي ففي كلا الحالين شق الورم شقاً عرضياً وغيره عليه بصبغة اليود او باعلى كلورور الحديد ممدوداً بماء

## (٩٢) الدود الاذني

نوع من الديدان تستقر في قناة عضو السمع للكلاب ومن اعراض وجودها انه ما دام الكلب مستكناً فلا شيء يدل على وجود الدود وانما عندما يمشي الكلب او يركض تراه بغتة يصير كالجنون فيركض الى هنا وهناك ناجماً مزبناً يدور على ذاته ثم يسقط الى الارض ولا يلبث ان ينهض على انه يبقى برهة كالحامل قبل ان يعود الى حاله الاصلية

العلاج: تحضن الاذن يومياً مرة بمزيج مركب من ٢٠ درهما زيت زيتون و ٢٠ دراهم بنرول اي زيت الكازول ٨ دراهم ايثر كبريتيك على شرط ان تسد الاذن بعد الحقنة عشر دقائق بكرة من القطن او ان يغسل داخل الاذن بمذوب كبريتور البوتاسيوم ٦ دراهم منة لاقه ماء

## (٩٣) زكام الانف

التهاب الغشاء المخاطي للانف يحدث لسائر انواع الحيوان وله درجتان حاد ومزمن

اسبابه: تعرض للبرد او تهيج الغشاء من قبل دخول مواد حريفة الى الانف مثل دخان وغبار وما شاكل ذلك

الاعراض: سخونة ونشوفة واحمرار الغشاء الانفي. احياناً حى خفيفة في بادى الامر. وفي اليوم الثاني او الثالث يسيل من المناخر سبال مائي صافٍ يتخيط قليلاً. عطاس متواتر. ثم يشتد قوام المفرز الانفي ويتكدر الى ان يصير صديدياً ويتعلق بجناحي المناخر. ومدة الزكام على الغالب من ٨ الى ١٥ يوماً فتزول الحمى وتنتهي العلة اما الزكام الزمن فلا يشعر فيه بحى ولا عطاس. والمفرز من الغشاء المخاطي الانفي يصير لزجاً يلتصق بجناح الانف وحياناً تكون رائحته نتنه. وقد يرم الغشاء المخاطي الانفي فيضيق المجرى ويحدث شخير مستمر. وقد يخالط الزكام احياناً التهاب الشعب واحتقان او خراج تحت اللسان

العلاج: ربط المصاب في محل دفيء وتغطيته. ويسقى الماء فاتراً او يقلل علفه وتعمل له التهايل المليئة كنجار مغلى ورق الخبازى ويعطى معجوناً ملطفاً مصنوعاً من مسحوق عرق السوس مجبولاً بالعسل مضافاً الى كل جرعة منه قليل من الاقيون. وان استمر المفرز الانفي يسقى الطرطير المقيى من درهم الى ٢ حسب نوعية الحيوان او مسحوق الكبابه الصينية ١٠ دراهم يومياً. وفي الزكام

المزمن تقيد التهايل بماء أغلي فيه القطران او حبوب الكوكلان  
 وحسن المناخر بمذوب ملح قابض كمذوب الشب الابيض او  
 مذوب ملح التونيا وان تكون خراج يشق . ومن الموافق فصل  
 الحيوان المصاب لئلا يعدي السليم



### (٩٤) الشخير .

الشخير صوت غير مألوف يحدث عند مرور الهواء في  
 المناخر ادا خلا او خارجا من المسالك التنفسية . وكثيرا ما  
 يحدث هذا للخيول

اسبابه : شلل او ضمور العضلات البخجيرية لاقعة بية يسببها  
 عادة ضغط عرضي او باثولوجي . تضيق المسالك الهوائية من نواام  
 لحمية او من تورم القصبة او عن تجمع تورم الغدد الخلفية او عن  
 اوذما الغلصبة وقد يمكن ان يكون موروثا . وان كان الشخير حادئا  
 عن احد الاسباب التي ذكرت فهو مزمن ويكون حادا اذا حدث  
 عن علة حادة في المسالك التنفسية كالزكام الانفي او السفاوة او  
 التهاب البخجرة او الشعب الخ

الاعراض: صوت تختلف شدته من تخير قوي الى صغير خفيف يسمع عند مدخل الفمحات الانفية واحياناً الى مداوة بعيدة وهو يختلف تماماً عن تنفس الحيوان بحالة صحته الاعتيادية ولو كان نعباناً. وان كان التخير قوياً واتعب المصاب به تعباً زائداً يركض او بجلافة فربما يسقط مخوفاً لزيادة سرعة التنفس وقد يكون التخير متقطعاً يعاود الحيوان نوباً

العلاج: في معالجة التخير الحاد نجب مداوة العلة المحدثه ومع ذلك يبقى التخير ولو شفيت العلة. وان كان مزمناً تستاصل النواحي اللحمية ويعطى يودور البوتاسيوم ثلاثة دراهم على مرتين يومياً اذا كان السبب تضخم الغدد الحلقية. على ان هذه العلة غالباً عضالة

— ١٠٨٤ —

### (٩٥) الجَر

هو عرض لامرض. يراد به نتانة النفس او المفرزات المخاطية وسببها اما قروح في الغشاء النخاعي او غضروف الانف او سن نخرة علاجه: قلع السن النخرة اذا كانت السبب ومداوة القروح بحقن المناخر بمذوب كلورات البوتاس او بمحلول اعلى منغنيات

البوتاس واحد مئة الى ١٥٠ ماء او يخفف الحامض الكربوليك  
بالماء ٥ بالمائة



### (٩٦) الزكام الغنغريفي ويقال له ألم الراس المعدي

على قول البعض هو التهاب السحايا اي اغشية الدماغ. وهي  
علة خاصة بالبقر تنفش احياناً في اقليم مجملته ممتدة بالعدوى  
اسبابه : هذه العلة تصيب العجول الفتية الضعيفة البنية  
المعرضة للتدرن. ومن الانتقال الفجائي من فصل حار الى فصل  
بارد

الاعراض : يتبدى بقشعريرة وحي وانحطاط وضعف وتكون  
قاعدة القرون كثيرة السخونة والمناخر يابسة وشهوة الاكل  
والاجترار مفقودة والعطش شديداً والامعاء قابضة والمقلة منتفخة  
دامعة محتقنة حمراء وسعال جاف يعقبه نفث جامد مخضر. وبعد  
يومين او ثلاثة تخف السخونة وتفرز المناخر ويغني الراس الى جهة  
ثم يعلو سطح غشا النملخ حمرة. وتتكدر القرنية ونصير الدموع  
مخاطاً صديدياً. ويتعسر البلع وتنطلق الامعاء ويفرز المبل. وفي  
الدرجة الاخيرة يفسد الدم وتغفر اللطح التي على سطح غشا

الأنف فيصير مفرزها دائماً تنكاً وقد تيبس أو تُشلُّ بعض أجزاء  
 الجسم وأحياناً تسقط القرون أو الأظلاف  
 العلاج: الفصد في ابتداء العلة. ثم الفك بمواد منقطة على الحنجرة  
 والمجبهة. وبمسح المفاخر بمواد عطرية منبهة لتحريض العطاس.  
 والمساهل الملحية وأوقفها كبريتات الصودا. والمشروبات المعروفة  
 كمنقوع النعنعين المضاف لكل افة منه ٥٠ درهماً من خللات  
 النشادر السائل تعطى مرتين أو ثلاثاً في النهار فان توقفت العلة  
 في الدرجة الأولى شفيت وإلا فلا يرجى الشفاء بعد ذلك



## (٩٧) احتقان قاعدة القرون

تحتقن قاعدة القرون من لطمة أو من زيادة ضغط النير  
 الأعراض: زيادة الحساسية في القرن والرقبة وسخونتها. حي  
 مختلفة الشدة خصوصاً عندما يتكون صديد أي يتفجح الحبل  
 المحتقن  
 العلاج: الوضعيات الباردة. الفصد العام أو الموضعي.  
 الحرايق على قاعدة القرن المصاب



## (٩٨) الرعاف او النزف الانفي في الكلاب

الرعاف هو نزف اي خروج دم من الانف علة خاصة  
بالكلاب سببها وجود نوع من الدود في اعضاء الشم  
الاعراض : عطاس . ونخير . ضيق نفس . هزال . نزف دم  
من الانف تخط من مداومة افرازه قوة الحيوان فيموت ضنى  
العلاج : تنخير الانف بمواد عطرية وحفنة بالبنيزين ممدودا  
بماء ثم تغذية المصاب جيدا خصوصا باللحم الني اذا كان هزىلا



## الفصل العاشر

علل الفم

## (٩٩) خلع الفك السفلي

خلع الفك السفلي يحصل من صدمة او من تقلص العضلتين  
الجناحيتين والفم مفتوح في الثأوب فيزيغ راس العظم الى الامام  
وقد ينخلع الجانب الواحد من الفك او الجانبان معا وفي كلا  
الحالين يبقى الفم مفتوحا لا يمكن اطباقه ويسيل اللعاب ويبرز

الفك الى الامام او الى الجانب الخائف الجانب المخلوع فيعارض اللوك والابتلاع

العلاج: يرد هذا المخلع بادخال اسفين من خشب الى داخل الفم بين الاضراس الاخيرة ثم يرفع الفك الى الاعلى باليد او انة يربط برباط مناسب للشد الى الاعلى واذ ذاك اكبس ييدك على طرف الاسفين الباقي خارج الفم واستعمله كالمخل لكى ينهز راس العظم من مقعره العرضي. وبعد الرد تربط الفك بضع ساعات بحيث لا يتمكن الحيوان من فتح فيه

## الفصل الحادي عشر

في امراض الفم

### (١٠٠) علل الاسنان عموماً

الاعراض: عسر لوك العلف مع ان شهوة الاكل باقية بطء حركة الفك السفلى عند المضغ وقد يسقط من فم الحيوان الحشيش او التبن غير ملوك كما يجب. عسراو عدم امكان الحيوان على سحق الشعير. واذا طال هذا الحال ينزل الحيوان وتسقط قواه لقلة الغذاء الكافي. فان فتحت الفم وفحصته تجد ان بعض الاسنان

مكسورة او غير منتظمة اي بعضها طويل والاخر قصير وغالبا  
 يكون في الفم اسنان نخرة او انها تقصر حتى تلاصق الاسناخ اي  
 مغارزها من اللثة. او تنعطف العليا الى الداخل بحيث يبرز الفك  
 السفلي الى الامام او الى الامام بحيث لا تقع على السفلي او تنبت  
 اسنان زائدة عن الحالة الطبيعية فتتراكب احداها على الاخرى.  
 ويتمسب عما تقدم تخديش الاحناك وجرح اللسان وتورم اللثة  
 وتثانة النفس واللحاب واحيانا قذف مادة نمت من فتحة الانف  
 خصوصا اذا كانت العلة في الفك العلوي

العلاج: قلع السن النخرة بكلاية كالثي تستعمل للبشر. او  
 بدفعها الى الداخل او الى الظاهر وبرد الطويلة منها بحيث تساوي  
 البقية. وتقلع ايضا الاسنان الزائدة او المعوجة او اصول المكسورة  
 اذا وجدت ولا حيلة بالاسنان القصيرة الملاصقة اللثة. وبعد قلع  
 السن المصابة يسقى الحيوان مشروبا غلي فيه بضعة رؤوس خشخاش  
 وجذر الخطمي مضافا اليه ما يكفي لتحريضه من الخل. ويعلف  
 بضعة ايام مواد طرية سهلة المضغ ووافها النخالة المبولة او طحين  
 الشعير مدوفا بالماء

### (١٠١) جروح اللسان

قد ينحرج اللسان اما من انطباق الاسنان عليه بغتة لسبب

ما كاجفال الحيوان مثلاً او من صدمة او عن سوء انتظام الاسنان  
او عن عدم موافقة اللجام خصوصاً اذا كان الحيوان جموحاً  
الاعراض: يعرف الامر حالاً اذا فتح الفم وقد يصاحب الجرح  
نزف شديد من الشريان والاوردة اللسانية فان كان الجرح بليغاً  
يتعسر الأكل ويسيل اللعاب ويكون القسم الامامي من اللسان  
ازرق بارداً

العلاج: في بعض الاحوال يجب قطع القسم المزرق اذا  
كان الجرح بليغاً والجزم منفصلاً (ان الحيوانات تقدر على الاغذاء  
ولو فقدت معظم جزء من السننها) والافخاط الجرح وبمضغ  
الحيوان بمغلي جنود الخطمي المحض بالخل او بالحامض  
الكبريتيك اي روح الزاج. او بمنخف اعلى كلورور الحديد.  
ويعلف طحين الشعير مدوفاً بالماء الى ان يبرأ الجرح تماماً



## (١٠٢) شلل اللسان

يشل اللسان عقب علة تيفوئيدية او من جرى آفة دماغية  
واعراضه تفرح اللسان واندلاعه وسيلان اللعاب

العلاج: فرك العضو بصبغة جوز الفى. الحرايق على الشعر  
وان لم يحصل افادة فنجرب الكهر بآتية اى دولاب البرق

### (١٠٣) القلاع

القلاع التهاب وقروح تحصل من نمو مادة فطرية في الفم  
والقناة الهضمية من الحيوانات الضعيفة ولذلك ترى هذه العلة  
في الحيوانات الفتية

الاعراض: حرارة واحمرار الفم. ثم ظهور نقط بيضاء غير  
منتظمة منظرها مثل منظر قريشة اللبن على جوانب اللسان  
وباطن الشفتين او الشدين وقد تكون القطع متفرقة او متجمعة  
ثم بعد بضع ايام تفحل وتسقط وتتجدد. وتارة تنصل القطع الملتهبة  
بعضها ببعض فتكسو كل باطن الفم والحلقوم والمري وتقتل  
المصاب بها

العلاج: الاعتناء التام بالنظافة وحسن التغذية مع المشروبات  
المحمضة. او اضافة الحامض الكربوليك الى الاحواض التي تشرب  
منها الحيوانات المصابة درهمين من الحامض الى افة ماء او مس  
البثور بمذوب كلورات البوتاس

## (١٠٤) الترماس

ورم التهامي يحدث في سقف حلق المهاري في زمن التسنين  
وأوفق علاج لشفائه الراحة وتقليل العلف وتشريط الحلق المتورم



## (١٠٥) خراج تحت اللسان

ورم يتولد تحت اللسان على مسير القيد اما من جرى التهاب  
بين الغدد تحت اللسان او لتكون حصي في الافنية هناك يتسبب  
عنه تلعب والم عند الفحص

العلاج: ان كان خراج يشق ويعصر بالاصابع حتي تستخرج  
متضمراته وان كان حصي شق شقاً موازياً لمحور القناة واستخرج  
المادة المتجمدة. ولربما تسبب الورم تحت اللسان عن سف سنابل  
قمح نشبت فانزعها بحفت ان وجدت. واغسل فم الحيوان بمغلي  
قشر السنديان محبضاً بالخل.



## (١٠٦) جروح الفم

اذا كان الجرح في سقف الحلق والتلف من احد الشرياني

هناك شديداً يكوى بأعلى كلورور الحديد أو انك تصنع كرة من خرق تبلها بالسيال المذكور وتضعها فوق محل التزف وتضغط عليها بلوحة مدة . وإن كانت الجروح خدوشاً من عدم موافقة اللجام وتسبب عنها احتقان وتلعب وعدم استطاعة لوك العلف فأوفق شي لشفائها عدم استعمال اللجام وغسل الفم بمغلي جنود الخطمي المحض بالخل والelf بطحين الشعير مدوفاً بماء

### (١٠٧) جروح الشفاء

جروح الشفاء كثيرة الحدوث وعلاجها قطع التزف بالحديد الحمى أو بأعلى كلورور الحديد أو باحد الكاويات القوية كحجر جهنم خباطة الجرح بأبر مخنية ويغير على الجرح بماء الحامض الكربوليك ضامداً وإن لم يوجد فبماء ممزوج خمرًا بمقادير متساوية

### (١٠٨) الثآليل

نوامٍ تولد على شفاء الحيوان وقد يختلف حجمها وهيئتها ولكنها تكون غالباً على شكل زهر القرنبيط

علاجها : قلعها وكبها بالحمض الكبريتيك الخفف او  
بالحمض الخليك القوي



### (١٠٩) عقد اللسان

علة خاصة بالدجاج اجل اعراضها سماكة الغشاء المحيط  
باللسان تمنع الطير عن الشرب وعن صياحه المعتاد . وهي في  
اكثر الاحوال ليست سوى عرض من اعراض علة معوية او  
معدية او شعبية واكثر حصولها في ايام الصيف الكثيرة الحر  
والجفاف خصوصاً اذا لم تحصل الطيور على ماء نقي بارد للشرب  
ولا يكون علفها غير الحبوب اليابسة

العلاج : معالجة العلة الباطنة اذا كانت هي السبب المحدث  
والانتباه الى حالة المصاب من حيث النظافة وتغيير ماء الشرب  
والتكرم عليها ببعض البقول الخضراء من وقت الى اخر . غسل  
فم المصاب بمحلول بورات الصودا او الشب الابيض وان تكون  
خراج داخل الفم يشق . ومنهم من اوصى بقشر الفشرة البيضاء  
المتسكة حول اللسان ومنهم من نهى عن ذلك



## الفصل الثاني عشر

### في امراض العنق

#### (١١٠) التهاب الغدة النكفية

الغدة النكفية أكبر الغدد اللعابية. موقعها تحت الاذن. وكثيراً ما تلتهمب هذه الغدة خصوصاً في الخيل عقب السقاوة وقد يلتبس التهابها بالتهاب الغدد الليفاوية المجاورة الاعراض: تورم. سخونة. ألم. ويكون الراس مدوداً. والحركة عسرة مؤلمة. والغم سخناً. والازدراد عسراً والتنفس متلبكاً وانتهاء هذه العلة الانحلال او التقيح. فان كان الاخير نشدت الاعراض المتقدم ذكرها ويحس بتفجج الصديد

العلاج: يفرك محل الالتهاب بمرهم الكافور او بمرهم منقط ويلف الحل بالصوف. ويستخرج الصديد اذا تكبر مع الاحتراس بان لا تنجرح الغدة والوعية او الاعصاب العديدة الموجودة في تلك النقطة. وان زال الالتهاب وبقي الحل محمقناً يدهن بمرهم يودور الهوتاسيوم ويسقى من هذا الملح ايضاً

## (١١١) الكواتر. ضخامة الغدة الدرقية

الغدة الدرقية او الجسم الدرقي غضروف من اكبر غضاريف  
الحنجرة يشغل قسمها الامامي العلوي

الاعراض: ورم رخو غير مؤلم بارز في القسم السفلي على  
جنب الفم وقد يكون على جانب واحد او على الجانبين في  
الخيل. تضخم بطيء لا يزج الحيوان الا عندما يكبر كثيراً فيتسبب  
عنه صعوبة في الازدراء والتنفس

العلاج: يسقى يودور البوتاسيوم ويدهن الورم بمرهم اليود.  
او يفتح خلال. وقلماً يفتح دوائاً في هذا الداء



## (١١٢) التواء العنق

حدة: ألم التهاوي اوروماتسي يصيب احدى عضلات العنق  
فيلزم الحيوان بان يحنى راسه الى الامام او الى احد الجانبين  
العلاج: غسل العنق وتنطيله بماء سخن وتدقيقه وفركه  
بمرهم الكافور مع اعطاء مسهل

## (١١٣) ناسور العنق

علة خاصة بالخنازير. وهي فتحة ناسورية على جانب العنق ترشح منها مادة دبقة يتلاصق بها الشعر. وأحياناً تلتهمب وتشورم. ويحدث من ذلك حى وعسر ازدراد وتنفس يقتل الحيوان المصاب في مدة وجيزة

العلاج: يوضع المصاب في محل نظيف ويعطى مقيثاً ويعلف مواد رخوة ويسقى المشاريب المحمضة. ويكوى الناسور بالحديد الحى وإن لم يشفا يستأصل



## (١١٤) داء الخلد

اسم لورم يحدث في القنال على محاذاة المفصلين المحوري الاطلسي والاطلسي المؤخري للخليل وأحياناً للبقر وذلك من جرى ضربة أو لطفة أو احتكاك متواتر أو من ضغط النير الاعراض: ألم. سخونة. ورم. تيبس عضلات العنق. ويسند المصاب راسه على المعلف. تشجات عصبية في بعض الاحوال. وقد يتكون خراج

العلاج: في ابتداء العلة تستعمل الغسولات القابضة كحلول ملح الرصاص او الشب الابيض . وحرقة على الورم . وان تكون الخراج يوضع ويشغل بفنائل ويفسل بغسولات كاوية كسمال فيلاني او بمنسوب الشب الازرق او الحامض الكربوليك هذا مع عدم اهمال امر النظافة

— ١٠٠١ —

### الفصل الثالث عشر

في علل البلعوم والخجيرة والقصة الرئوية والمري

#### (١١٥) الزلة البلعومية الخجيرية

قد يلتهم البلعوم والخجيرة من التعرض للبرد او من السقاة او من مرض الكلاب الصغيرة . وهو يصيب كل انواع الحيوان الاعراض: حى . ازدياد حساسة النحر وحياتاً ورم ظاهر . وتعجن المحل . جفاف الاغشية المخاطية ثم ارتشاحها . كافرار المخاط واللغاب وقد يخرج الاكل حتى الماء من المناخر . عسر الازدراد . سعال غالباً مولم عسر . وان استقصيت الخجيرة تسمع الغاط مختلفة

حسب درجة الالتهاب فيكون اللفظ صريحا في الابتداء ثم  
شخيرا ترافقه فيما بعد خراخر. وشخير من المناخر. وقد ينتقل  
الالتهاب من الحمة الى الازمان وانتهاء الانحلال او التفج او  
الغغرينا

العلاج: يربط المصاب في محل معتدل متساوي الحرارة.  
ويغطي عنقه بالصوف ويلتصق مواد سهلة البلع وتعمل له التهايل  
المليئة ويعطى مقيء للحيوانات التي تقيء وتوضع الخردال والحرايق  
حول العنق وان تكون خراج يشق. وان كان مفرز الانف كثيرا  
يعطى مسحوق الكبابه الصينية معجوناً بالعسل ١٢ درهماً على ٥ او  
٦ مرات في اليوم وينفخ في المناخر من مسحوق مركب من درهم  
كبريتات التوتيا و٨ دراهم سكر العادة

### (١١٦) النزلة الدفثية

حدها: تكون اغشية كاذبة داخل الفم والمسالك التنفسية  
وهي تصيب كل حيوان على ان حدوثها نادر  
اسبابها: فلما يعرف لها سبب غير العدوى

اعراضها: كاعراض التزلة الصدرية على ان التنفس يكون  
اعسر حتى انه يخشى الاختناق السريع. ازرقاق الاغشية. تجمدات  
بيضاء او مصفرة على قاعدة اللسان وسقف الحلق ويقذف السعال  
ندف اغشية كاذبة. وقد تسرع دورة الدم وترتفع حرارة الجسم.  
عرق غزير. انحطاط القوى

العلاج: الفصد. المقتبئات للحيوانات القادرة على القىء.  
الخردال حول العنق. كي داخل الفم والحجرة بالحامض  
الهيدروكلوريك المخفف او بمذوب نترات الفضة او باعلى كلورور  
الحديد. ونفخ مسحوق الشب الابيض او الكالومل. وقد مدح  
مسحوق الكبابة الصينية ١٥ درهما في اليوم على ٢ او ٥ مرات. شق  
الحجرة. (هذا من متعلقات الماهرين بفن الجراحة)

وقد يحدث بمدة النقة ان يموت الحيوان فجأة ففي هكذا حالة  
وجدوا في البلعوم كتلة اكل سادة الفناة وما ذلك الا من شلل  
ذاك العضو فيعتنى اذا باعطاء علف رخو سهل البلع

— ٣٠٠ —

## (١١٧) انقسام القصة الرئوية

تنقسم القصة الرئوية من اطبة شديدة او من جرح وقد

يظهر الانقصاص او يكون تحت الجلد

الاعراض: احترقان من جرى ارتشاح الدم تحت الجلد .  
انفيسما اي تجمع هواء يكثر احيانا . وقد تسيل من الانف مواد  
نجيبة

العلاج: الوضعيات الباردة او الفايضة كمنسوب ملح الرصاص  
الفرك بمواد منفطة محمرة . وان كان الجرح ظاهرا سهل خروج  
الصديد وعندما تحسن حالته ويبتل خروج الصديد بخاط .  
هذا مع النظافة التامة



### (١١٨) الاجسام الغريبة في المريء

هذا الداء عبارة عن وقوف اجسام غريبة كمواد غذائية  
كبيرة الحجم مثل جذر او قطعة بطاطه او لفت او ما شاكل ذلك  
في المريء اي البلعوم وهو يصيب البقر خصوصا

الاعراض: صعوبة بلع جامد او سائل وان شرب الحيوان  
ينتفخ البلعوم ويرجع الماء من الفم او المناخر . وقد يسيل من الانف  
او الفم لعاب تخالطه ندف غذائية وقد يحس بالجسم الغريب

بإمرار اليد على مقدم العنق هذا إذا كان الجسم مستقراً نحو خرجة  
المزمار. وإن كان لوطى من ذلك فلا يحس به على أن الأعراض  
المذكورة تكون على حالها وأحياناً يزداد عليها انتفاخ البطن  
العلاج: دفع الجسم الغريب إلى المعدة أو إخراجهُ أو سحقهُ  
إذا أمكن والأفيسقى الحيوان زيتاً ويخفض رأسهُ على مقدم العنق  
وذلك لكي تتوسع العكفة البلعومية. والأشقى الحنجرة وهذا من  
متعلقات الجراح

### (١١٩) تمدد المريء

يتمدد المريء تمدداً غير اعتيادياً في الخيل أو المجترة الكبيرة  
الأسباب: مزق المريء من ضربة أو رضة  
الأعراض: عسر الإزدراد محاولة التقيء وإن كان التمدد في  
الجزء العلوي من المريء يحس بورم صلب أو رخو غير مؤلم يمكن  
اختفاؤه مؤقتاً إذا ضغط مقدم العنق من الأسفل إلى الأعلى. وإن  
كان التمدد داخلى الصدر لا يحس به من الظاهر على أن المواد  
الغذائية التي يقيشها الحيوان لا تكون لها رائحة المعدة الحمضية. وهذه  
العلة تضعف المصاب بها كثيراً وتبينه ضناً



العلاج: قد اشاروا بتجنيطة الحبل المنفصم من المريء ولكنه  
قلما يرحى النجا واجود الوسائل ملاحظة تغذية المصاب فلا  
يعلف غير المواد الرخوة والسهلة المضغ والبلع



### العصل الرابع عشر

آفات القص والسلسلة

## (١٢٠) كسر و خلع الاضلاع

قد تنخلع الضلع او تنكسر من ضربة او سقطة او من عنف  
خارجي واكثر حدوثه للخيال المتقدمة بالسن  
الاعراض: الم موضعي. تحرك العظم المكسور وقضضته.  
عسر تنفس من جرى التهاب البلبورا الموضعي. وقد تنجرح احيانا  
الرئة من شظايا العظم المكسور فيحدث نفث دم والتهاب رئوي  
ومن ثم امفيسيا اي تجمع هواة تحت الجلد. وفي بعض الاحوال  
يحدث فتق رئوي

العلاج: الحرايق اذ لا زرع. وان وجد زرع او كسر يرد  
بالضغط على الزاوية البارزة. يرفع القص برباط موافق كي

يرتفع راس الضلع اذا كان غائراً الى الداخل . وان حدث فتق  
رثوي يعمل رباط موافق لضغطه



### (١٢١) اورام مختلفة على ظاهر الصدر

اسباب ورم ظاهر الصدر كثيرة منها احتكاك القلائد  
المتكررة او ضغط النير وما اشبه وقد يبقى ورم ظاهر في مجاورة  
خلال قديم

العلاج : تحسين القلائد وآلات الحجر . شق الورم او  
استئصاله اذا كان مكيساً . وان كان حديقاً تستعمل له المراهم  
المحلة كهرم يودور البوتاس او يودور الرصاص



### (١٢٢) جرح الغارب اي اعلى الاكتاف

جرح هذا القسم من جسم الحيوان مولم وبطيء الشفاء وكثيراً  
ما يحدث للجيل من ضغط القلائد او الحزم او من الاحتكاك  
بالمعالف او ما جاورها

الاعراض : تكون ورم فلنمو في أي ورم مولم سخن محبر رخو  
داخلة مادة مصلية او تكون داحس مولم . ففي الحالة الاولى يتفج  
داخل الورم ويخشى من ان الصديد يفسد بنية العظام الكتفية  
ويخشى في الحالة الثانية من حدوث التهاب داخلي يفعل بالعظام  
نفس فعل الصديد . وكثيراً ما تهتك الربط العنقية وتخرج من  
الجرح قطعاً متعفنة

وفي بعض الاحوال يكون خروج الصديد غزيراً بحيث  
يهزل الحيوان وتلتهب الاوعية الليمفاوية حتى تخال الصراحة .  
وان ادخلت الاصبع في الجرح بحس بحشونة التوات الشوكية  
العلاج : في ابتداء ظهور الآفة يغسل المحل بغسولات قابضة  
كماء ملح الرصاص والتضديد . وان تكون الخراج يفتح ويشغل  
بفتائل . وان كان الداحس يقص الجزء المتصلب ويكوى او يدهن  
بالشم الى ان يلين وينزع من اصله اذا امكن . وان تكون قرح  
يرش عليه مسحوق الشب الازرق ويحقن من محلوله ان كان  
كهف صديدي مع التضديد بخلول الحامض الكربوليك هذا مع  
مراعاة النظافة ومنع الحيوان من الاحتكاك وحسن علفه وراحته

## (١٢٣) عقر السرة

اسباب هذه العلة واعراضها وعلاجها نفس علاج جرح  
اعلى الاكتاف على انها اقل خطراً واطوع للمداواة (راجع ما  
ذكر آنفاً)



## (١٢٤) انكسار الفقرات

كثيراً ما تنكسر فقرة او اكثر من السلسلة خصوصاً في الخيل  
والكلب واسبابه ضربة شديدة او السقوط تحت الحمل او وثبة  
عنيفة او عندما يطرح الحيوان يعمل له عملية فينحذب السلسلة  
الفقرية يحدث ان احدى الفقرات تنضغط اكثر من الاخرى  
فتنكسر وهذا يحدث خصوصاً عندما يربطون قوائم الحيوان  
ليطرحوه على الارض

الاعراض : يسمع انفقاع عند حدوث الحادث . عدم مقدرة  
الحيوان على النهوض . شلل مؤخره والمستقيم والمثانة . وان  
حصل الكسر بدون زيفان او ان لم ينكسر الا السنسنة يكون  
شلل المؤخر اقل وضوحاً

العلاج: لا علاج لكسر الفقرة في الحالة الاولى وإنما في الثانية  
يؤثر بالراحة التامة وبالمحاريق والكي بالنار

—x—

### (١٢٥) استسقاء النخاع الشوكي

حده: تجمع مصل في التبؤيف الشوكي ابي داخل السلسلة  
الفقرية. وأكثر حدوثه للغنم والكلاب. واسبابه غالباً استعداد  
خلقي

الاعراض: تخير في المشي. عدم موافقة نقل القوائم. ألم في  
السلسلة عند الجس. تشنج

العلاج: الادهان المنقطة على الصلب. اعطاء مدرات  
البول مثل ملح البارود. حسن العلف

—x—

### (١٢٦) تيبس السلسلة الفقرية

تحدث هذه العلة من ثقل الحمل او من السقوط تحت الحمل  
او من حركة عنيفة عندما يكون الحيوان ملقى على الارض لاجراء  
عملية ما او من تأثير البرد

الاعراض: تيبس السلسلة الفقرية. تحديقها. عدم موافقة.

نقل القوائم . عسر الحركة والربوض والنهوض . سير مترنح .  
صك الرجل الى الداخل . انفراج القوائم الخلفية . عدم المقدرة  
على الرجوع الى الخلف وعلى الدوران الحلقي . وحيثا يكون الم  
وورم على الصاب

العلاج : الراحة . التهايل والليخ السخنة . المراهم المنفضة او  
الحاراريق . الكي . تجنب كلما يلزم الحيوان للشد والحركة العنيفة

— ١٥٣ —

## الفصل الخامس عشر

في امراض الجلد

### (١٢٧) التهاب الجلد

قد يلتهب الجلد عقب ضربة او احنكاك فيسخن ويحمر  
ويصير مؤلما وفي بعض الاحيان يحدث ورم وارتشاح مصلي في  
الجلد

العلاج : النطولات المليئة بماء الخبازى او النخالة او القابضة  
كماء ملح الرصاص حسب الظروف وان تورم الجلد وتجمع مصلي  
داخل الورم يشق وتوضع عليه الليخ المليئة

## (١٢٨) الارشيا . احتقان الجلد

اسبابه: البرد . الحر . ضربة الشمس . الاحتكاك او عاقبة في  
الدورة الدموية

الاعراض: احمرار . سخونة . اكλαν . سقوط الشعر . تكوّن  
حويصلات او شقوق . ورم . الم . وقد تزول هذه الاعراض احيانا  
يبط فية شر الجلد كالنخالة . واحيانا تزول الاعراض الالتهابية  
ويبقى الاحتقان اى التورم

العلاج: دهن الحبل بالكليسيرين او بالزبد وغسله بغسولات  
ملينة كماء الخبازى واللبن منها . رش مسحوق النشا . الراحة . المساهل

## (١٢٩) الحكمة

فيها تنفط غلات صغار قليلة النمو على لون الجلد الاعتيادي  
شديدة الاكلان حتى ان الحيوان لا يستطيع ان يضبط نفسه عن  
الحكاك . ومن جرى ذلك يسقط الشعر ويلتهب الجلد

العلاج: النطولات الزرنجية او الكبريتية او بمحلول السليمانى  
دروهم منه الى ١٠٠ درهم ماء . الدهن بمرهم القطران . المساهل المحمية

## (١٢٠) الأكريما البسيطة

علة تصيب كل انواع الحيوان خصوصاً الفتية منها . ومن  
الاسباب المحدثة عدم الرياضة ورداءة العلف وما يهيج الجلد  
كالعرض لحرارة الشمس

اعراضها : تنفط حويصلات متجمعة على محل من الجلد  
محتفن . أكلان تنفجر من جراه الحويصلات فيسيل منها سائل  
مصلي صديدي . وفي الكلاب يحصل النفاط على الاذان والخواصر  
وفي الخيل يكون على الساق ويسمى الشكال . وقد يحدث من شدة  
الالتهاب احياناً حتى . وقد تنتقل الأكريما الى درجة الازمان  
وهكذا تستعصي على العلاج لان الحويصلات تنفجر وتنفج وينبت  
غيرها على التعاقب فيحتقن المحل المصاب

علاجها : النظافة والوضعيات القلوية كمحلول كربونات  
الصودا او ماء الكلس والمساهل الخفيفة والمشايب المرطبة  
الحامضة وان ازمى فالزرنخ او احد مستحضراته كمحلول فوكلر  
يعطى منه ١٠ الى ١٥ درهماً للحيوانات الكبيرة ومن ٢ الى ٦ للمجنرة  
الصغيرة ومن ١ الى ٢ للكلاب



## (١٣١) الأكريما البثرية

هي حويصلات غالباً متجمعة تنفجر ويصير مكانها قشور غليظة  
مصفرة . ففي الخيل مجلسها على المعرفة بجاورة مكان الرأسية  
فيتسماك الجلد ويتثنى

العلاج: النظافة. دهن الحل بالزبدة . الدهن بزيت الغار  
مزوجاً بزيت التربينينا . ضرور الكبريت او النشاء . تحسين  
العلف



## (١٣٢) اميتيجو

بثرات حويصلية محلمة على الشفاه وتكون مرآسة على قاعدة  
حمراء تنفجر فتكون قشور صفراء ينفذ من تحتهما مصل يجهد ويزيد  
القشور غلاظة . وقد يمتد النفاط الى اجزاء الجلد الرقيقة  
العلاج: النظافة . الغسل بمذوب البورق او الشب الابيض  
فاتراً



## (١٣٣) الاكثيا

علة جلدية خاصة بالخيل والغنم والكلب واسبابها العرق

اعراضها: تنفط بثرات متفرقة على الغالب وقاعدتها صلبة  
وعندما تنفجر البثرة يسيل منها صديد احياناً نجيعي. ومجلس النفاط  
محل التلائد في الخيل وعلى ظهور الغنم وكثيراً ما تحدث للحيوان  
في سير علة تيفريدية

العلاج: تشق البثور في اول الامر ويذر عليها مسحوق  
النشاء وتغسل بمغلي ورق الخبازي وفيما بعد تغسل بمغلي نبات  
عطري كالقصبين وما اشبه. ثم تدهن بمرهم الميعة السائلة. ويسقى  
المصاب يودور البوتاسيوم. ويعنى بامر النظافة والتغذية

### (١٣٤) الحمرة

الحمرة تصيب كل الحيوانات خصوصاً الغنم والكلاب  
والهررة والخنازير. وهي ثلاثة انواع بسيطة وغلغونية وغنغرينية وافدة  
الحمرة البسيطة: التهاب مختلف الامتداد على الجلد  
وقد يشغل النسيج الخلوي تحت الجلد. واسباب هذا الالتهاب  
غامضة

اعراضها: احمرار وانتفاخ والم وسخونة المحل المصاب من الجلد  
مع حكة وسرعة نبض. فان ظهرت الحمرة في الراس يمكن ان  
تظهر اعراض مخية مثل سبات او تشنج

الحُمرة الفلغمونية: ان لم يتتو الورم بالانحلال في  
الدرجة الاولى تحفن الغدد الليمفاوية وتكون مجال ضمنها مصل  
يصير صديداً وتحدث ايذيماتمد الى سائر الانحاء فيعاق حيثئذ  
النفس والمضغ وتسمى العلة اذ ذاك بالحمرة الايذيمية . وقد تكون  
نقالة احياناً ويقال ان الغنم اذا رعت الحنطة السوداء خصوصاً وهي  
مزهرة تصاب بهذه العلة

العلاج: الفصد اذا كانت الحمى شديدة . المقيثات . المساهل  
المحجية . التضميد بمحلول ملح الرصاص او بمنقوع زهر البلسان  
التمايل الملية . شق المجال لاجراج الصديد

الحمرة الغنغرينية الوافدة : اسبابها العلف بمواد  
فاسدة متعفنة

اعراضها: نفزز . هيئة حزن . وهن القوى . احمرار جلد الراس  
والعنق والظهر مع تكون مجال يسيل منها سيال مصلي . انتشار  
الصوف . ثم يصير الجلد ازرق بارداً غير حساس وينغفر في  
بعض اقسامه فتتخطقوى الحيوان ويموت احياناً في يومين او ثلاثة  
العلاج: الغسل بمنقوع نبات عطري والدهن بالمروخ  
النشادري . ويعطى من اداخل المنبهات . حب الكوكلان . ماء

الحامض الكربوليك . ماء محبض بالحامض الكبريتيك . فصل  
السامة عن المصابة بخافة العدوى

— ❦ —

(١٢٥) مفحوس

علة نفاطية قلما تصيب غير الكلاب واسبابها غير معروفة.  
اعراضها: فقاقيع ملانة سيالاً صافياً تجعد ثم تجف وتشكون  
قشرة تسقط ويحول التهاب

العلاج: ثقب المجال ومسح السيال عن الجلد . ومنع  
الاحتكاك . دهن النفاط بالزبدة . المسهلات الخفيفة

— ❦ —

(١٢٦) قروح الصيف

قروح مستعصية تظهر خصوصاً في الفصول الحارة مجلسها  
اعلى الاكتاف والعنق والكفل ورمانات القوائم فتولد فيها ازرار  
لحمية وتعلوها الطخ مصفرة كلسية او فيبرينية زلالية وهي قلما تفرز  
قيحاً وبروؤها عسر وتسبب حكة شديدة

علاجها: سكب الماء البارد . دهنها بالجليسرين او بالزبدة


او بالمرهم الزئبقى . الكى بالحديد الحى . تضميدها باعلى كلورور  
الحديد الصرف او بمجاول جزء من بلسم ييرو في ٢ اجزاء سيرتو .  
اعطاء ٢٠ قمحة من الحامض الزرنيخوس يومياً . منع المصاب عن  
الاحتكاك . وكثيراً ما تلتبس هذه القروح بحب الصراجة



### (١٣٧) الدمامل

الدمامل ورم النهائي ناتى عن سطح الجلد يتكون داخله قمع  
وشرقة مكونة من النسيج المتهتك مع سخونة المحل واحتقانه والماء .  
والدمامل تظهر افواجا

العلاج : التهايل والغسولات واللج الملبنة والمرخية . شق  
الدملة وعصرها لاجراج الشرقة ويغير على الجرح بمرهم قابض  
كمرهم العفص او مرهم ملح الرصاص



### (١٣٨) الماء في الساقين

اسم لمرض جلدي يعتري السطح الموتر للساقين ثم يسري  
بالتدرج حتى يصل الى بيت الشكال واكيل الحافر وهو من  
العلل العسرة الشفاء

اسبابه: مكث التقدم مدة طويلة في المستنقعات او في احوال  
طبيعتها حامضة كاوية

• اعراضه: ورم. احمرار والم وحكة وسخونة المحل. وقوف الشعر  
وارتشاج مادة مصلية اولاً ثم نصير صديدية وتلتصق بالشعر. ثم  
يتشق الجلد وتعلو ازرار الحمية ينتثر من حولها الشعر. وقد يختلف  
جرم الازرار الحمية وتخذ هيئة عجر التين او عناقيد العنب  
وتكون دائماً منددة بسيل نتن الرائحة. وقد يتغفر الجلد احياناً  
وتشكون فروح عسرة الاتهام. وقد يزداد الورم في بعض الاحيان  
فلا يستطيع الحيوان عملاً. وغالباً يخالط هذا الداء الداء  
الضفدي

علاجه: النظافة الكلية بالغسل المتكرر. تحسين العلف.  
وربط المصاب في محل نظيف مجدد الهواء معتدل الحرارة. حفظ  
المحل المصاب من الرطوبة. اللبخ المليئة والدهن بالجليسرين.  
الغسولات القابضة كمحلول ملح الرصاص. دهن القطران او مرهم  
الحامض الكربوليك. محلول الشب الازرق. المشروبات المسهلة  
والمدرة البول

## (١٣٩) السعفة

التهاب حويصلي يحدث للبقر الشغيلة مجلسه الذئب  
والاكتاف وجلد العنق

اعراضه: حرارة وحكة والم. نفاط حويصلي تسيل منه مادة  
صفراء تجف وتشكون قشور تشقق فتتلف منها مادة مصلية دامية.  
وقد يمتد النفاط ويغطي مساحة كبيرة من الجلد

العلاج: يضمّد النفاط بمذوب السليمانى المعمول من درهم  
منه لمئة درهم ماء. يدهن بالجليسرين ثم يذر عليه النشا. وتعطى  
المساهل. ويمنع الحيوان من الاحتكاك



## (١٤٠) القرحة الاكلة

ويقال لها الفم الاسود وتاكل الاذن وهي تحدث للغنم والمعزى  
والكلاب واسبابها غامضة

اعراضها: التهاب جلدي تشكون مكانه قرحة تغور في الجلد  
فتهتك كل النسيج من رُبط وعظام

علاجها: كي الفرحة بالحامض الكبريتيك المخفف بالسيرتو  
او بمذوب السلياني او بمجول الحامض الكربوليك ثم دهنها بمرهم  
القطران

— 1001 —

### (١٤١) الاستسقاء العام

ايندما عامة تحدث للخيول من جرى تعرضها للبرد وهي بحالة  
العرق. لها ثلاث درجات

اعراض الدرجة الاولى: تحدث فجأة حتى مختلفة الشدة  
ويكون النبض 'ولا قويا' ثم بصغرو ضربات القلب شديدة والاعشية  
المخاطية صفراء زعفرانية مرشوشة بشبه نمش. وقد تنورم الشفاء  
وراس الانف وتمتد الايندما بحيث يتشوه الراس وقد يتعسر التنفس  
تناول الاغذية

اعراض الدرجة الثانية: تعاظم الاعراض المذكورة آنفاً وقد  
تسيل من المناخر مادة مخاطية دامية ومن الفم لعاب غروي لزج  
ويزيد اصفرار الاعشية والاحتقان وبعد ٥ او ٦ ايام ان بقي  
الاحتقان آخذاً بالعظام يتشقق الجلد عند بيت الشكال وفي  
ثنيات الركب والعراقيب او تنفصل من الجلد خشكريشة



مختلفة السعة . وتكون ضربات القلب شديدة والنبض صغيراً  
والحيوان خامداً حزيناً لا يبدي حراكاً

اعراض الدرجة الثالثة: ازدياد سرعة التنفسات . فلق .  
نقشر الاغشية المخاطية الانفية . ويكون الهواء الخارج بالتنفس  
نتناً والاستقصاء يدل على مرثع في الرئة . وقد تتعاضد ضربات  
القلب مع ان النبض يكون صغيراً ضعيفاً . وقد يفسد الدم .  
ويحدث بعض الاحيان ان المرثعات تمتص بغنة ويحصل مغص  
وذرب مفرط ويموت المصاب . ومدة هذه العلة تختلف من اربعة  
الى ١٠ ايام وفي كل الاحوال فلما تنتهي على سلامة

علاجها: في الابتداء يفرك الحلق المحنق بالخل السخن وتعطى  
المساهل المحمية والمشروبات المنبهة السخنة . وفي ثاني يوم ان لم  
تحسن الحال يعطى خللات النشادر من ١٠ الى ١٥ درهماً . ثم  
المعاجين المقوية المصنوعة من مسحوق الجنطيانا او مسحوق خشب  
الكينا والعسل . والوسائط التي يحتم باستعمالها روح الكافور ومغلي  
القهوة من كل ٢٠٠ درهم تسقى اربع او خمس مرات في النهار  
وتعمل الوسائط الميكانيكية لتفتيح المناخر . تشريط الحلق المحنق مع  
مراعاة امور النظافة والتغذية والترويض في الشمس واسكان  
المصاب اخيراً نظيفاً مجدد الهواء

## (١٤٢) الجاورسية

علة جلدية نادرة الحدوث . اسبابها الاغذاء ببعض  
النباتات

اعراضها: حتى تدوم ٢ او اربعة ايام ثم تنفط على الجلد دما مل  
صغيرة تبيض وتنتلي في فمها فيجاء ثم تنفجر وتشكون قشور وبعد  
سقوطها يبقى اثر احمر معررى . ومجلس الدما مل الوجه الباطن  
للقوائم وكلما ظهر النفاط تسقط درجة الحمى . ومدة المرض ١٥ يوما  
واحيانا يبقى بعدها احتقان خفيف في القوائم  
علاجها: المساهل المحمية والمشروبات المحبضة والنظافة



## (١٤٣) القرمزية

علة جلدية خاصة بالخيول والكلاب . واعراضها ظهور بقع  
صغيرة بنفسجية اللون او حمراء لا تخفي تحت الضغط . مجلسها  
اقسام الجلد الخالية من الشعر . وقد تحدث انزفة من السطوح  
الخاطية . وقد تكون القرمزية من جملة اختلاطات بعض الامراض  
ومدتها من ٨ الى ١٠ ايام ثم تاخذ البقع في الاختفاء تدريجيا .

علاجها: الفسولات الباردة القابضة والمنهات من الداخل  
مثل السيروتو وزيت الثربنتينا وإن كان المصاب ضعيف البنية  
يعطى المعاجين المقوية

### (١٤٤) الارثيا القوباوية

ويقال لها الداء الاحمر. كثيرة الحدوث للكلاب ومجلسها  
الوجه الباطن للاطراف والبطن  
اسبابها: قلة الرياضة والنظافة  
اعراضها: نقاط حويصلي يتفجر عن مادة دامية. وهذه العلة  
كثيراً ما تعاود الحيوان  
علاجها: الزنج من الداخل والمسيلات والنظافة  
والرياضة

### (١٤٥) البسورياس

ويقال له داء الحمار. علة جلدية تحدث للخيل والكلاب.  
اسبابها استعداد وراثي والبرد الرطب وعلم النظافة

اعراضها: ارتفاعات صغيرة تعلوها فيما بعد لطخ قشرية  
ومجلس هذه العلة القوائم في ثنيات الركب والعراقيب والرسغ  
(بيت الشكال). فيسقط الشعر وتشتد الحكمة فتتكون شقوق  
وزوائد مغطاة بقشور وقد تكون حراشف مستعصية على الجهة  
المقدمة للأكليل فوق الحافر

العلاج: الدهن بمرهم الزئبق ومرهم القطران ومرهم الحامض  
الكربوليك والمرهم المصري. ومن الداخل يعطى الزرنج او يودور  
البوتاسيوم. حسن التغذية



### (١٤٦) بترياسس . خشكريشة

ويقال القوبا القشرية. هو التهاب الجلد التهاباً خفيفاً فيه  
تتكون على وجه الفرس ومعرفته وعلى ذنبه قشور صغار مثل  
الخشكريشة يرافقها أكلان شديد واحمرار  
العلاج: الغسولات القلوية كما الصابون او مذوب كربونات  
الصودا. مرهم القطران. مرهم الكبريت. ومن الداخل الزرنج  
والمسهلات الخفيفة

## (١٤٧) الأكزيما القوباءية

ويقال القوبا الرطبة . تحدث للخيل والكلاب عن اسباب غير معروفة

الاعراض : نفاط حويصلي كثير يفرز مادة صفراء دبقه يتلاصق بها الشعر ويصبحها اكلان . وقد تلتيس هذه العلة بالمجرب  
العلاج : الغسل بمذوب السليمانى الى ١٠٠٠ ماء ويعطى من  
الداخل الزرنج او يودور البوتاسيوم

—xx—

## (١٤٨) الحزاز السعفي والحالق

علة معدية مسببة عن فطر خصوصي وهي تحدث للخيل والكلاب والهررة والطيور الاهلية . مجلسها الجبهة والقفا وقاعدة الاذان

اعراضها : اكلان . رائحة كريهة . ويكون الشعر ناشفاً قصفاً فينتثر واصوله باقية كأن قد قرضه العث . تقشر البشرة  
العلاج : قص الشعر عن الاقسام المصابة او حلقة . وشدة الاعناء بالنظافة واستعمال الغسولات المبيدة للجراثيم العلة مثل

ماء الحامض الكربوليك وصبغة اليود وخصوصاً مذوب السليمانى  
او مرهم نترات الفضة . مرهم الزئبق

### (١٤٩) الجرب

علة جلدية مسببة عن فراد مخصوص وهي تحدث لكل  
انواع الحيوان وتنتقل بالعدوى حتى الى الانسان . سيرها بطيئة  
اعراضه : اكلاان شديد . تولد دمامل او حويصلات صغيرة  
تنفجر وتكون قشور صفراء تلتصق الشعر . وقد يلهب الجلد ويتثر  
الشعر . ويهزل المصاب . ومجلس العلة في البقر الذنب وجانبا  
العنق والظهر وقاعدة القرون والضرع وفي الغنم الظهر وفي الخيل  
العنق وقاعدة الذنب وبنت الشكال وقد تمتد احياناً الى الركب  
او العراقيب

العلاج : الغسل بماء سخن وصابون وفرشاة . قص الشعر او  
جزء الصوف . الدهن بزيت الكازاو بعصير ورق التبغ . مرهم  
او محلول الحامض الكربوليك . مرهم الكبريت . المغاطس  
الكبريتية . تطهير المراض ومسح الحيوانات المصابة مخافة  
العدوى

## (١٥٠) جرب الكلاب والهررة

حبوب عدسية الهبة مجلسها الراس والوجه او البطن والظهر  
او الخواصر تفرز مادة مصلية تكون قشوراً وتسك الجلد . أكلان  
قليل . سقوط الشعر . ومدة هذه العلة طويلة وتضعف المصاب  
بها كثيراً

العلاج : الزطافة . الدهن بمذوب بلسم يبرودرم واحد الى  
٣٠ درهماً كحولاً . مرهم الحامض الكربوليك . وللهررة مرهم نترات  
الزئبق وغالباً لا ينجح دوائه في هذا الداء

## (١٥١) القراد . او الفاسوق

دويبات مختلفة الاسماء والاشكال تعيش على اجسام الحيوانات  
فتضئها وتلفها  
علاجها : مسح محل وجودها بزيت الكاز او زيت التربنتين  
او عصير ورق التبغ

## الفصل السادس عشر

في الفتق السري وعلل الضرر

(١٥٢) الفتق السري

يغلب حدوثه للحيوانات الحديثة السن خصوصاً الخيل  
والكلاب وقد يكون خلقياً أو اكتسابياً

اسبابه: التلطي العضلي . استعداد شخصي او ارثي  
الاعراض: انتفاخ الخط الذي فوق السرة تماماً وقد يختلف  
حجم الانتفاخ حسب فراغ او امتلاء الامعاء . وهو متحرك رخو غالباً  
غير مؤلم يخف تحت الضغط ويظهر حالماً يبطل عنه . وقد يشعر  
بالحركة الدودية وبالفرار داخل الامعاء . وقد يلتمح المعى باغلفته  
اي بالجلد والنسيج الخلوي والكيس فلا يمكن بعد ذلك ارجاعه  
الى البطن

العلاج : بوضع حفاظ يعلق بسيور بشرط ان يضغط الفتق  
على انه هما كان صنعة متقناً يلبك المهر ويوقف نموه . الحواريق .  
الدهونات القابضة وضعيات كحولية على انها فلما تقيد . يجلق .



الشعر ثم يدهن بفرشاة على الانتفاخ من الحامض النترك الثقيل  
ومن المناسب ان لا يدهن الا بعشرة دراهم من الحامض المذكور  
وذلك في مدة ٢ الى ٥ دقائق فتكون خشكريشة صفراء رخوة  
وورم يخف تدريجاً ثم يشقق السطح المكوي ويتكون في وسطه مثل  
ثلم فاصل قرب اليوم العاشر. ثم تستط الخشكريشة ويبقى مكانها  
قرح احمر عندما يندمل يقلص النسيج ويسد السرة ويعين هكذا  
على ارتداد الفتق

وقد نعقب عملية الكي بالحامض عواقب ردية مثل تمزق  
جلد البطن والتهاب البريتون والتيتنوس على ان هذه العواقب  
نادرة الحدوث. وقد اشاروا بمرهم كرومات البوتاسا درهم من  
الكرومات لثلاثة دراهم مرهم بسيط وقيل ان فعلة كفعل الحامض  
النترك وان لم تحصل افادة مما تقدم يلجأ الى عملية جراحية وهذه  
من متعلقات الماهرين في فن الجراحة البيطرية

### (١٥٣) التهاب الضرع

كثيراً ما يلتهب الضرع عقب الولادة من جرى تخثر اللبن  
ومكنه داخل الحيوب او لانتشار نفاط قلاعي او جلدي. وقد

يكون الالتهاب علماً او موضعياً . واعراضه موضعية وعامة  
 الاعراض الموضعية : عدم سيلان اللبن من القسم المصاب .  
 وبعد ٢٤ ساعة يحدث ألم وحرارة واحمرار وورم يلزم المصابة ان  
 تفرج رجلها عند المشي ويمنعها من الربوض . وقرب اليوم الرابع  
 يزداد الورم ويمتد الى الفخذ والسرة . ويسيل اللبن ماصلاً حاملاً  
 ندفاً متخثرة او خطوطاً دموية

الاعراض العامة : فقد شهوة الأكل . عطش شديد . اجترار  
 غير منتظم . وقوف الشعر . حي . قشعريرة . احمرار الأغشية المخاطية  
 وينتهي هذا الالتهاب بالانحلال او التصلب او التقيح والغنغرينا  
 ومن ثم الموت

فان انتهت بالانحلال يبقى الضرع متضخماً وبعض انحاء  
 متصلة حساسة وكمية اللبن تقل حسب اتساع المساحة للتصلبة  
 وان كان التقيح فمن اليوم الثامن الى الثاني عشر يتكون خراج  
 يشعر بتموج الصديد فيه . وقد ينفجر اجناً داخل الضرع  
 فيمتزج القيح باللبن

والانتهاء بالغنغرينا كثير الحدوث في الغنم فيصير الضرع  
 بنفسجي اللون عديم الحساسية تنتشر عليه نقاط تاخذ في التهلك  
 والنهري

العلاج: في ابتداء الفصد والمطبات. وضع لبخة مصنوعة من مسحوق الفخار والمخل. لبخة اوراق حشيشة الشوكران. مرهم الكافور والبالادونا. تغطية الصرع بالكلوديون المرن. وتعطى من الداخل المسهلات المحمية والمشروبات المدرة البول ويقلل العلف. يجلب الصرع بلطف بقصد تخفيف الضغط. وان حدث تصلب يدهن بمرهم يودور البوتاسيوم. وان كان خراج يشق ويحقن بمغلى نباتات عطرية او بمحلول خفيف من الحامض الكربوليك ويشغل بقتيل ملتوت بمرهم الحامض المذكور وان حدثت غنغرينا فالتشريط والكي والحقن بالمواد المانعة الفساد كمنسوب الحامض الكربوليك او بمرمنغفات البوتاس او الشب الابيض او الازرق

### (١٥٤) قشب الصرع وتشققة

اسباب هذه العلة اجتهاد الرضيع بالمص ومماسه الزبل الاعراض: شقوق وتجفيف جلد الصرع. قشور تتكون من جفاف ما تفرزه تلك الشقوق. ألم شديد يلحى الام الى ابعاد

رضيعها . وقد تسد ثقب الضرع اذا كان الشقوق على طرفه  
السائب وهذا ما يزيد الالتهاب والاحتقان  
العلاج : عند اول ظهور الالتهاب يمنع الرضاع وتحلب باليد  
ويطخ الضرع بمسحوق النشا او بمسحوق قشر السنديان والاحسن  
ان تكوى الشقوق كيا خفيفا بمذوب خفيف من الشب الابيض  
او تترات الفضة . (حجر جهنم)



### (١٥٥) سيلان اللبن

قد يسيل اللبن من الضرع قطرة قطرة او يسيل متواصلاً  
وقت الحركة والسير  
اسبابه : ارتخاء عواصر الضرع او جرح او ثآليل او غضة او  
ضعف عام  
العلاج : منع تجمع اللبن بكثرة . غسل الضرع بمواد قابضة



### (٢٥٦) انسداد ثقب الضرع

اسبابه : اما خلقية او مسببة عن التهاب تصلبت من جراه

الافنية

الاعراض: ان كان خلقياً يظهر الامر حالاً بعد الولادة لأن  
الضرع يتنفخ لتجمع اللبن فيه ولا يمكن اخراجه بالحلب . وان كان  
مسبباً عن التهاب لا يكون الثقب مسدوداً تماماً بل ينفذ منه شيء  
يسير على انه ينسد وويدار ويدار

العلاج: اذا كان الجلد وحده ساداً الثقب يشق راس الضرع  
شفاً صغيراً صليبياً ويوضع داخل الشق انبوب من صمغ لدن  
وينترك ٢ او ٤ ايام ولا يتزع الا وقت الحلب وعند تعذر الانبوب  
المذكور يعتاض عنه بريشة حمام او دجاج

### (١٥٧) ثآليل الضرع

تظهر الثآليل على الضرع واحياناً داخله وقد يختلف حجمها  
كثيراً واجود واسدة لازالتها هي ان تقطع او تقرض وتكوى بنترات  
الفضة او بالحامض الكبريتيك المخفف او بالحديد المحمى

### (١٥٨) سرطان الضرع

هذه العلة الخفيفة تحدث لجميع اناث الحيوان خصوصاً للبقرة  
والكلبة واسبابها بنية خصوصية

الاعراض: ورم منقوص يتولد في خلف او أكثر وهو في  
 الاول صغير وعديم الألم ويبقى هكذا مدة طويلة ثم تنمو الغدة  
 بالتدرج ويكون الجلد الذي يغطيها محزراً بشرايين دوالية. ثم  
 يبرز جزء من الورم ويرتخي ويتغير وتبقى موضعة قرحة مزمنة  
 تسيل منها مادة كريهة الرائحة. وقد يمتد المرض الى الغدد الليمفاوية  
 فتصير حالة الجسم العمومية ردية. عياء. هزال فقد قابلية الأكل  
 وقد تموت المصابة بعد بضعة اشهر واحياناً بضع سنين  
 العلاج: لا علاج لهذا الداء غير تبر العضو المصاب قبل  
 ان تسري العلة في سائر الجسم

—•—

## الفصل السابع عشر

في علل الجهاز التناسلي البولي في الذكور

### (١٥٩) شلل القضيبي

قد يشل القضيبي من أكثر التزاو من ازدياد شبق  
 الحيوان بسبب مجاورته الأنثى. وقد يحدث للنيل عقب علة

## تفويدية

الاعراض : يكون القضب متدلياً متحركاً بحركة رصاص الساعة ومحتمناً لا يدخل في غلافه بعد الانزال . وهو مع ذلك بارد قليل الحس او فاقده واحياناً احمر او بنفسجي وقد يختلف من احثكاكه بالقش او غيره مما يفرش تحت الحيوان

العلاج : الغسل بالماء البارد او بماء زهر البلسان الممزوج بالسبيرتو بنسبة جزء الى خمسة . تشريط متكرر . الكهربائية وان لم ينجح العلاج يعمل للقضب غلاف اصطناعي يثبت ويمنع احثكاكه بالافخاذ وقت الشغل او ان يتر العضو



## (١٦٠) تجميع المادة الدهنية

قد يكثر احياناً تجميع المادة الدهنية في غلاف قصب الحيوان وتنف وتصلب وهكذا تضغط المجرى وتغرق مرور البول فيقشب مغص مولى

العلاج : ملاحظة امر النظافة . الغسل بماء الصابون فاتراً او بمذوب كربونات الصودا

## (١٦١) المأكيل على القضيبي

هي نوازل لحمية تتخذ هيئات مختلفة تنمو على رأس القضيبي  
وغلافه وتكون كجمر التين أو كبوش التوت أو زهر القرنبيط ومن  
جرى وجودها تسيل من تحت الغلاف مادة صفراء دامية  
علاجها: القص والكلي بالحديد المحمى أو بنترات الفضة أو  
بالحامض الكبريتيك المخفف أو بالشب الأزرق مع مراعاة  
النظافة

— — —

## (١٦٢) الانعاظ المولم

يحدث للكلب من كثرة السفاد أو من تواتر محاولته وهو  
بالحقيقة التهاب القضيبي وإغلفته لا انعاظ طبيعي تهيجته الشهوة  
الحيوانية  
علاجه: المغاطس والغسولات الباردة وإبعاد الحيوان  
عما يهيج



## جراح القضيبي (١٦٣)

قد يكون المجرح عرضياً او طولياً سطحياً او غائراً ففي الحالة  
 الأخيرة لمجرى البول والجسم الاسفنجي يدخل في العارض  
 الاسباب: ضربة او احنكاك بجسم غريب والقضيبي بحالة  
 الانتصاب وقد يفجر قضيب الكلب عند محاولته فك الاعتقاد  
 الاعراض: نزف مادة دامية من الغلاف. ورم. تضيق في  
 فتحة القلفة يعارض كشف الحشفة او يمنع بالكلية. او تضيق يسبب  
 تعرية الحشفة. وقد تولد زوائد لحمية

العلاج: خياطة المجرح. الضمادات الباردة. النظافة التامة  
 ادخال ميل في القضيبي اذا اقتضى الحال. وان تكون صديد  
 فالغسولات والمراهم المانعة للفساد كماء الحامض الكربوليك ومرهمه.  
 وان كان نزف دم فالكي باعلى كلورور الحديد



## (١٦٤) التهاب الحشفة والقلقة

قد يلتهب القسم الامامي للقضيبي من وجود جسم غريب  
 تحت الغلفة او من تجهد المادة الدهنية هناك او من كثرة السفاد

لو من محلولة أو من ضربة لو أنه يكون عقيب مرض ما. وكثيراً ما يحصل هذا للثور لضيق فتحة غلته

الاعراض: انتفاخ يضيق الغلاف ويعارض كشف الحشفة وإن كانت الحشفة مكشوفة فيعارض رجوعها وتسيل خصوصاً في الكلاب مادة مخاطية صديدية تلتصق الشعر في البقر. ألم وقت جس العضو وعند الاتصاب. وشكون قروح صغيرة على الغشاء المخاطي وتجددات في الحفرة الزورقية ودوائر القيد

العلاج: إزالة المواد المهيضة. الغسل أو الحنف بالخمر. النظافة التامة. الغسولات القابضة كحل ملح الرصاص أو الشب الايض. التشريط. وإن كان اخنناق الفلقة فالخنان لو شقها. لمشاريب اللعابية كغلي بزر الكتان مع كلورات البوتاس



### (١٧٥) سيلان المنى

يسيل المنى مع شبق أو بدون وغالباً بدون ارادة الحيوان واسبابه اما ضعف عام او منع الحيوان عن التزو في الحالة الاولى تحسين العلف وفي الثانية المرطبات والغسولات الباردة وابعاد

الحمل عن مجاورة الاثني واعطاء بروموز البوتاسيوم من ٢ الى ٨  
دراهم يوميا.

### (١٧٧) التهاب الخصية

قد تلتهم الخصية من ضربة او من احتكاكها بالاث الحجر  
او من جرى شديد عنيف او انما تعقب المرض الزهري  
الاعراض: احتقان . زيادة الحس . انتفاخ الصفن . انفراج  
القوائم الخلفية . عسر في المشي . تيبس الصلب . هيئة حزن . حمى .  
صلابة النبض وسرعته . احمرار البول . وفي الكلاب غثيان وقيء .  
وقد يمتد الالتهاب احيانا على مسير الحبل المتوي الى البطن  
وقد تنتهي العلة بالانحلال بعد ٦ او ٨ ايام او بالتفج . فان  
كان هذا الاخير تدوم الاعراض الالتهابية من ١٢ الى ١٥ يوما ثم  
تبرز على الخصية نقط متموجة وتكون خراجا ان لم تبضع . وحيانا  
يكون الصديد متفرقا فان كان في الصفن اي غلاف الخصية  
يسهل اخراجه بالبرل فتبهط الحمى اذ ذاك وينخف الالم او يزول  
تماما . وان كان الصديد في الحبل يلتهم البريتون  
وقد ينتقل الالتهاب الى درجة الازمان فتصلب الخصية .

اوانه ينسكب مصل في لفافتها الغهدية فتكون ما يسمونه القبيلة  
او الادرة المائية

علاجها: الراحة. توقيتها من الاحنكاك. استخراج الدم من  
احد اوردة الصفن و احيانا التشريط الغائر بقصد تخفيف ضغط  
الصفن على الخصية. سكب الماء البارد. الغسولات القابضة  
كمحلول ملح الرصاص. الدهن بمرهم المحور او بمرهم خلاصة البلادونا  
او بمرهم الكافور. التطولات والنج السخنة المعلقة بكيس. فتح الخراج  
وحقنه بماء الحامض الكربوليك او بمحلول بزمغنيات البوتاس .  
والأفالبتر والكي بالحديد المحمى او بالمواد الكاوية



### (١٦٧) القبيلة المائية

هي تجمع مصل في اللفافة الغهدية للخصية. علة تحدث لكل  
انواع الحيوان خصوصا الخيل

الاسباب: قد تحصل القبيلة المائية من التهاب الخصية او  
من ضربة او لطمة غير انها تحدث غالبا بدون سبب محسوس  
الاعراض: ورم اجاصي الشكل يتعاضم احيانا حتى يتبدل  
بين الانفخاد وقد يرفع المصل الخصية الى القسم الاعلى من غدها.

تعسر المشي . انفراج القوائم . ويكون السطح املس متموجاً غير مملح  
ولا حساس لا يزجج الا بقله

العلاج : الغسولات المحللة والقابضة الا انه لا يوثق بها . فلا  
دواء غير بزل الكيس وتفرغ المصل منه وعقبة الحفن بالحجر  
والاجود بصبغة اليود كما يفعل ذلك في البشر



### (١٦٨) دوالي الصفن . القيلة الدوالي

هي عبارة عن دوال في اوردة الحبل المنوي . وهذه العلة  
نادرة الحدوث للحيوانات وان حدثت فعقب التهاب الخصية  
الاعراض : ورم يختلف حجمه يحس داخله بعقد او بمثل  
كبة خيطان

العلاج : الوضعيات والغسولات الباردة . ولا شفاء الا  
بالخصي



### (١٦٩) القيلة الدموية

هي ارتشاح دم في الخصية او اغلفتها . تحدث لكل انواع  
الحيوان خصوصاً الخيل

الاسباب: لطبة عتيقة لا تؤثر في الجلد نظراً لمرورته على ايها  
تمزق الاجزاء الغائرة فتترشح دماً

الاعراض: يحدث حالاً بعد وقوع السبب ورم مختلف  
مساحته ويكون سطح الجلد الملس سخناً موملاً والورم في البدء متموجاً  
ثم تسمع له فرقة خفيفة عندما يتخثر الدم داخلة وفيما بعد يرجع الى  
التموج ثانية. ويكون المشي عسراً والارجل منفرجة والسلسلة  
الفقرية يابسة مقوسة

وتنتهي هذه العلة بالانحلال والتقيح والغضرينا . وكثيراً ما  
تلتبس بالقيلة المائية او بالفتق المختنق

العلاج: الراحة . اللجج والغسولات القابضة ورفع الخصية  
بكيس . سكب الماء البارد . بزل الكيس وحفنه بقصد اخراج  
الجائط الدموية . وانجع دواء خصي الحيوان تسليماً



### (١٧٠) جراح الخصية

تجرّح الخصي من لطبة او سقطة على اجسام حادة . فان  
كان المرح عميقاً وبرز جوهر الخصية الى الخارج يرد ويخاط

المجروح وتوضع الوضعيات الباردة ثم التناضضة كما ملح الرصاص .  
وان كان المجروح قديم العهد وجوهر الخصية كثير الاذى والمجمل  
مزقاً فالاجود خصي الحيوان نسليناً



### (١٧١) التهاب مجرى البول . حرقة البول

التهاب الغشاء المخاطي لمجرى البول فلما يحدث لغير الكلاب  
اسبابه : حرقة البول من جرى مناولة الحيوان مواد حريفة  
سامة . كثرة السفاد . لطمة . وجود حصي في المجرى  
اعراضه : اكلان . عسر افراز البول مع ألم عند محاولته .  
احمرار فتحة القضيب . سيلان مادة مصلية مخاطية وان كان المصاب  
تيساً يكون البول ماسوراً تماماً

العلاج : المشروبات اللعابية مثل مغلى بزر الكتان . المساهل  
الخفيفة . الراحة التامة . حبوب نعل من مسحوق الكبابه الصينية  
او من بلسم قوياو او من التريبتينا . الحقن في المجرى بمحلول ملح  
الرصاص درهم منه في مئة ماء او بمذوب ملح التوتيا بالنسبة  
نفسها

## (١٧٣) زكام المثانة

التهاب غشاء المثانة المخاطي حاد ومزمن وحدوثه للحيوانات

نادر

اسبابه: من اسباب زكام المثانة وجود حصاة فيها ذات  
تنوات او زوايا حادة. زيادة حرافة البول من ابتلاع مواد حريفة  
مثل الذباب الهندي وما اشبه

الاعراض: قلق . مص بالقوائم . كثرة التكلف للتبول  
زحير والام ومغص . ويكون البول ماسورا ولونه صافيا او محمرا  
والمستقيم يشارك المثانة في زيادة الانتباه فيكثر المصاب من  
الزحير تكلفا للبراز. وقد ترافق هذه الاعراض حمى تختلف شدتها  
ومنتهى هذه العلة الانحلال والغفرينا وقد يتكون خراج  
وينفجر داخل المثانة فيصير البول اذ ذاك لبني اللون لاحتوائه  
على كمية من الصديد

وان انتقل الالتهاب الى الازمان تخف الاعراض الالتهابية  
ويستدل على الالم عند التبول بحركة ذنب الحيوان . ويصير  
البول خثرا الزجا لوجود مخاط صديدي فيه



العلاج: الفصد . المشروبات اللعابية كمغلى بزر الكتان  
والحنظل بمغلى رؤوس الخشخاش والنج العنخنة على مرق البطن .  
التمايل للمينة . حشيشة البلادونا او صبغتها اذا كان البول ماسورا  
تماما وذلك لتخفيف اعتقال المثانة وفي درجة الازمان تعطى  
البلاسم كبلسم قوباو او الترتبتينا هذا مع المساهل المحمية مثل  
الملح الانكليزي او كبريتات الصودا وحقن المثانة بالماء الفاتر

— ١٠٠٤ —

### (١٧٣) انقلاب المثانة

شاهد هذا الحادث في الإنثى بان المثانة تنقلب باطنها الى  
الظاهر وظاهرها الى الداخل اي كما لو قلبت كيساً بطانة الى  
الخارج فترى اذ ذاك المثانة في المهبل

الاسباب : شدة الزحير وقت التبرز او التبول خصوصا  
اوان الطلق

الاعراض : يشاهد داخل الفرج ورم اجاصي الشكل مرتكز  
على نخت المهبل لونه محمر . رخو حساس . نافذ من الصماخ البولي  
ويندب العجز والذنب بسيل يفرزه الفرج . وان مكث الانقلاب  
مدة يكون غشاء المثانة المعرض اسود او تعلوه رقط سمراء داكنة

العلاج: نرد المثانة وتسهل العمل تشرط تشریطاً خفيفاً سطحياً وذلك ما يصغر حجمها نظراً لما يسيل من المصل بواسطة التشریط . سكب الماء البارد والاحسن حفاظاً يضغط الفرج على شرط ان تبقى له فتحتان لمرور البول والفرت



### (١٧٤) حصى المثانة

رواسب ترسب من البول في الكلية وتسقط الى المثانة او ترسب رأساً في المثانة فتكون حصاة مختلفة الهيئة والجرم بين قدر حبة رمل صغيرة وبيضة الدجاج واكبر كثيراً . وهذه العلة تحدث لكل انواع الحيوان خصوصاً البقر والغنم الاعراض : لا اعراض ظاهرة اذا كانت الحصى صغيرة وان كانت كبيرة فمغص شديد واحياناً يتوقف سيل البول فجأة لانسداد فتحة مجرى البول الداخلية من وقوع الحصاة عليها . كثرة التكلف الى التبول وكثيراً ما يظهر دم في البول بعد جهد العضلات

العلاج: العلف بالحشيش الاخضر . المشروبات القلوية كهنوب ثاني كربونات الصودا . وانجح دواء في هذا الداء تفتيت

المحصى اي سحتها بحيث يمكن خروج الفتات من المجرى البولي ولهذه  
الغاية آلات مركبة ورشاقة يد لا يسعنا المقام شرحها تفصيلاً لكونها  
من متعلقات الجراحة

## الفصل الثامن عشر

في علل الاريتين والاسث

### (١٧٥) الخراج فوق الحالب

حدوث الخراج الاربي اي في ما يجاور اعضاء التناسل لجهة  
البطن كثير الحدوث وذلك من جرى مرض السقاوة او التهاب  
الغدد الليمفاوية عنب جرح او بعد النخعي  
الاعراض: عسر المشي . ورم متعجن مع ألم واحمرار الجلد .  
وبعد مدة يرتخي الورم ويصير متموجاً . وقد يكبر الخراج في هذا  
النسب من الجسم جداً لاحتوائه على مقدار كبير من القيح  
العلاج: دهن الورم بالزبدة او بمرهم الحور او بزيت الغار ثم  
عندما يرتخي يشق ويحافظ على امر النظافة

## (١٧٦) الجرح او الرض الاربي

قد يحصل رض او جرح في النسم الاربي من سقطة او ضربة  
او من احناكه بعريش مركبة او برك الفلاحة وما شاكل ذلك  
الاعراض: حسب عظم الجرح. حرارة. ألم. عسر مشي.  
سيلان مصل او صديد  
العلاج: بدهن الحبل بالزبدة او بمرهم الحور او بمرهم ملح الرصاص.  
الضمادات الباردة

## (١٧٧) الفتق الاربي

ينبتق قسم من المعى من احدى الحلقنين البطنيين او  
ثنتيها وهو اربعة اصناف المنحرف والمستقيم والخلفي والمكيس. وهو  
كثير الحدوث للخيول والبغال ونادر في الحيوانات الاخرى  
الاسباب: الشد والوثوب العنيف. السقوط او الحركات  
العنيفة والحيوان مقيد او مربوط. الحر الشديد  
الاعراض العمومية: قد يحدث للحيوان فجأة عرق يغطي

بعض جسمه وتظهر عليه امارات الحزن ويكثر من الفحص بقوائمه وقد تزداد هذه الاعراض بالحدريج فيحدث للحيوان منص شديد ويجمد جلد وجهه ويحفص الارض بيده ويقلب على ظهره وعندما ينهض يبقى مترنحاً. وبعد مضي ثلاثين ساعة تقريباً من ظهور الحادث يظهر في الاعراض خمود وما ذلك الا لشد حساسة الحل من جرى وقوع الغنغرينا فيه

الاعراض الموضعية: ورم عند الحلقة البطنية الباطنة اية فوق الحالب. واذا جست الخصية لا تحرك في غمدها ويكون الغمد ممتلئاً صلباً يقاوم الجس غير متحرك. والورم يكون أكثر حساسة كلما كان الجس على الحالب اعلى. ألم قليل اذا جس الورم باليد. وان كان الفتق مختلفاً والمعى ملتصقاً تحدث حرارة والم وانتفاخ. وكثيراً ما يحصل مغص لانسداد المعى بالمواد الغذائية العلاج: اذا كان الفتق حديثاً ومنحدرًا الى الصفن يرد باقرب وقت بالغمز او بعملية جراحية او بسكب الماء البارد المتواصل. وعملية الغمز تتم بتربيط قوائم الحيوان والقاء على ظهره وبادخال اليد في الاست ويجذب طرفي المعى المنبثق جذباً خفيفاً واليد الاخرى تضغط على الصفن لرد المعى والاحسن ان يبدأ بضغط الصفن وذلك لتفريغ المعى وطردها غازات منه

واعلم ان عملية الغمز قلما تنجح وفيها خطر لانها تزيد اضطراب  
 للمعى بالجذب وقد يمزق  
 وللعملية الجراحية طرق لا يسعنا المقام استيفاءها وهي من  
 متعلقات الماهرين بفن الجراحة



### (١٧٨) جروح الامت

قد تجرح الامت من وجود عظمة في المبرزات او من سوء  
 استعمال الحقنة او من اليد عند فحص المستقيم او من ادخال  
 اجسام غريبة هناك  
 الاعراض: فتختلف الاعراض حسب اختلاف السبب. مجاهدة  
 الحيوان وقت البراز. روث بخالطة دم. وان كان الجرح خارقا  
 للمعى اينما. حرارة والم. احيانا مغص وخروج صديد  
 العلاج: استخراج الجسم الغريب ان وجد. خياطة الجرح  
 اذا احتيج الامر. الغسولات الباردة او القابضة كمنذوب ملح الرصاص  
 المسهلات الخفيفة. النظافة التامة والاعتناء بان لا يبقى شعرو ولا  
 فربث على الجرح

## (١٧٩) الناصر الاسمي

عبارة عن استطراق غير طبيعي بجانب عاصرة الاست .  
يحدث للجيل والكلاب عقب جرح الاست او خراج بجانب  
المستقيم وقد يكون الناصر كاملاً او ناقصاً . فالكمال الذي له  
فوهة قرب الاست واخرى في المستقيم . والناقص ويقال له  
الاعور الداخلي هو الذي لا يستطرق الى الجلد غير ان موقعه  
يعرف من الخارج باحمرار وصلابة بقرب الاست . والناصر  
الخارجي فتحة ضيقة تحيئة الحواقي تفرز صديداً تتناً احياناً . وان  
جس يجس يدخل فيه عميقاً ويكون التبريز متعباً . واما الداخلي  
فيسبب المآ وعسر تبريز ويكون الفرث حاوياً صديداً او دماً  
العلاج: شق الناصر وكبة بالحديد المحي او شقة ووضع  
نسالة كيميائية ملونة مجلول الحامض الكربوليك او بصيغة اليود  
والاعتناء بامور النظافة وتغيير الفتل

## (١٨٠) البواسير

البواسير اورام صغيرة بقرب الاست ويتغلب نوحها داخلها  
وهي قليلة الحدوث للحيوانات

الأعراض: انتفاخ محمر نائي قليلاً خارج المستقيم . تطلب  
 التبريز قطردم . انتفاخ القنحة أي حلقة الدبر  
 العلاج: الحقن بالماء البارد . المسهلات الخفيفة . الحقن بمغلي  
 جنر الراتانيا او مذبوب اعلى كلورورا الحديد الى ٥٠ . والوسائط  
 الجراحية تقوم بالربط والقطع والكي



### (١٨١) حكة الاست

أكلان شديد يحدث تحت الذنب او حول القنحة من عدم  
 النظافة او من حزازة هناك  
 العلاج : الغسولات القلوية كماء الصابون او مذوب  
 كربونات الصودا او بورات الصودا او مذوب السليمان واحد  
 منه الى ١٠٠٠ ماء

### الفصل التاسع عشر

في علل الرحم

### (١٨٢) التهاب الرحم

التهاب الرحم عقب الوضع أكثر حدوثاً مما قبله وقد يشاركه  
 اعتيادياً التهاب البريتون



اسبابه: عسر الوضع. الافراط من السفاد في الكلاب.  
الحفن المهيجة. الجراج. وقد يبتدي بعد الوضع او بعد  
الاسقاط

الاعراض: قلق. زحير وتبريز موم. تدليك. نفوس الظهر  
مع زيادة حس وضعف في الصلب. ويكون التنفس عسراً والبطن  
مؤلماً أحياناً والحيا منتفخاً وغشاؤه أحمر سخناً تسيل منه مادة  
مصلية مخاطية تظهر كأنها صديد. فقد شهوة الأكل. عدم انتظام  
الاجترار. قبض الأمعاء قلة اللبن أو فقده. ويكون النبض ملائماً  
سريعاً. وإن حدث التهاب الرحم بمدة الحمل يسقط الجنين غالباً  
فإن انتهت العلة بالانحلال تزول هذه الاعراض وتعود  
امارات الصحة تدريجياً وإن انتقلت الى الأزمان تظهر على الأنثى  
امارات الحمل ويسيل من الحيا مخاط صديدي وسيلائه مستديم  
أو متقطع. وقد يمتد الالتهاب أحياناً الى النسيج الخلوي للبريتون  
والرحم وتشكون خراج يفتح في الرحم أو في المستقيم أو المثانة  
العلاج: يتحقق أولاً هل في الرحم فضلات من الخلاص. أو  
جنين أو جسم غريب. فتحفن الرحم بالسوائل المانعة الفساد  
كمذوب ملح الطعام والأفانصدان كانت المصابة قوية البنية.  
للروحات المحولة على أسفل البطن كزيت التريتينا أو المروخ

النشادوي. المحمن الفاترة. المساهل الخفيفة. الراحة. وإن كان  
سيلان مخاطي فالمحمن القابضة كبغلي قشر السندبان او مذوب  
الشب الابيض او ملح التوتيا. وإن تجمع منها كثير في الرحم وكانت  
العنق متضيقة توسع بدهنها بمرهم البلادونا وتنظف من الداخل



### (١٨٣) التزف الرحمي

يتزف الدم من الرحم قبل الوضع او بعده او في خلاله وذلك  
بسبب انفصال المشيمة عقب ضربة او سقطعة. فان حصل وقت  
الوضع يكون سببه عدم كفاءة الطلق وإن كان بعده فتتبعه عملية  
سقيمة اجريت لاسراع الوضع

الاعراض: سيلان دم مائع او متخثر. وإن تخثر الدم في  
الرحم يزداد كبر البطن حالاً. وإن حدث التزف قبل الوضع  
يحصل الاجهاض. ثم مقص وضعف يؤدي الى انيميا اي فقر دم  
قتال. وقد وجدوا احياناً في الرحم جلط دم كبيرة جداً

العلاج: تحمن الرحم بماء بارد للتقلص او يعطى الجودار ٤  
دراهم منه في ٢٠ ماء يسقى كل ساعة النصف. وللكلاب يعطى

كبريات الكيين اي ملح الكينا. وان لم يتوقف الترف تسد  
الرحم بكرة نسالة او اسفنجية مبلولة بمذوب الشب. ولتوقيف الترف  
الحاصل بعد الوضع ينزع ما بقي من المشيمة في الرحم. الراحة التامة  
العلف المقوي

### (١٨٤) الشبق الحيواني

يه يشتد ميل الانثى الى الفحل بنوع خارج عن الحد الطبيعي  
الاسباب: علة في المبيض او في الرحم. المنع المستطيل والانثى  
مجاورة فحل

الاعراض: تطلب الانثى مجاورة الذكر. قلقها عند سماع صوته  
انتصاب البظر. كثرة التبويل. حجمة او عجمج او نباج. انتفاخ  
غشاء المهبل وسيلان مخاط مصفر لزج منه. وقد تنفر الانثى على  
رفقتها. ويزاد على هذه الاعراض في الكلاب والهررة الحزن واحيانا  
شراسة الاخلاق. وهذه الاناث على الغالب عقيمة

العلاج: يحرب التزو. الفصد. التغطيس او سكب الماء  
البارد. فجنّب الاغذية المنبهة. تقليل العلف. اعطاء الكافور من

٤ الى ٥ دراهم ومثله برومور البوتاسيوم. المساهل. ادخال جسم غريب داخل الرحم يوقف الداء احياناً على انه يمنع العلوق .  
خصي المصابة (هذائيم باستئصال المبيضين ولا تتكلم عن العملية لكونها من متعلقات الجراحة)



### (١٨٥) هبوط الرحم

زيغان الرحم كثير الحدوث للبقر وباقي الحيوانات المجترة الصغيرة وهبوطها اما كلي او جزئي واسبابه الوضع خصوصاً اذا كان سريعاً

الاعراض: ان كان الهبوط كلياً تظهر الرحم الى خارج الحيا ويكون ورم اجاصي الشكل مختلف الحجم احمر داكن او بنفسجي او مسمر مخدش واحياناً مهزق. وقد لا يظهر الورم اذا كان جزئياً الا وقت التبويل او التبريز او عندما يكون الحيوان رايضاً. فلق. تديك. زحير. حى. وقد يخالطه احياناً هبوط المهبل

العلاج: تفرغ المثانة والمستقيم بمسهل مدر البول ثم تنظف الرحم وترجع باليد مقبوضة مع الاحتراس بان لا يضغط العامل

حين انقباض عضلات الحيوان . الاعتناء بان يبقى الحيوان واقفاً  
ولن كان الورم كبير الحجم لا يرجع كله دفعة واحدة بل الاقسام  
الهاجرة الفرج اولاً . ضبط الرحم بحفاظ يعمل بطريقة تترك مبراً  
للبول والبراز . وان تعذر ارجاع الرحم تستاصل وهذا من متعلقات  
الجراحة

### (١٨٦) انزاق الرحم

تنزق الرحم وقت الوضع او من استعمال آلات لسحب  
الجنين عند تعذر الولادة

الاعراض : بطلان الطلق . ألم شديد وان كانت الرحم  
هابطة تشاهد بالنظر . وقد يعقب المنزق نزف دموي وانثقاق الامعاء  
او التهاب البريتون

العلاج : استخراج الجنين ان كان باقياً وارجاع الرحم ورد  
الامعاء اذا كانت منبثقة وضبطها بحفاظ . توقيف النزف باعطاء  
الجودار او بركلورور الحديد . لو كبرت ثبات الكيتين اذا كان النزف  
متقطعاً . ويعطى الاقيون لتسكين الالم


## (١٨٧) التهاب المهبل

التهاب الغشاء المخاطي للمهبل يرافق اعتيادياً التهاب الرحم  
 الحادث بعد الوضع . وأسبابه نفس أسباب انزلاق الرحم  
 الأعراض : تورم الفرج واحمراره وسخونته مع سحج ورقط في  
 غشائه المخاطي وسيلان مادة صافية أولاً ثم تصير مصليمة صديقية .  
 وقد تنتهي العلة بالانحلال أو بالانتقال الى الأزمان  
 العلاج : حقن المهبل بسوائل مليئة قاذضة أو بمذوب الحامض  
 الكربوليك أو بمذوب برمنغنات البوتاس وإن أزمّن الداء فحقن  
 نترات الفضة بنسبة ١ الى ١٠٠

## (١٨٩) هبوط المهبل

انبثاق المهبل من الفرج يحدث غالباً بمشاركة هبوط الرحم .  
 يحدث للأنثى غير الحوامل ولكن نادراً وأكثر حصوله في أول  
 العلق أو قرب الولادة وخصوصاً بعد الوضع  
 أسبابه : التعب . رداة ارض الاصطبل من حيث الوضع .

الاعراض : ورم منبثق بين اشفار الفرج هيئته اسطوانية وهو  
 املس احمر مغطى بخياط . على قسمه السفلي ثلم يؤدي الى فتحة  
 مجرى البول . زحير . اسربول واحيانا حي . ثم موت لكثرة الضنى  
 وقد يلتبس هبوط المهبل بهبوط الرحم  
 العلاج : نفس علاج هبوط الرحم . بثر الورم على شرط  
 توفي الصماخ البولي



## الفصل العشرون

علل الذنب والقوائم الخلفية

### (١٩٠) جراح الذنب وكسره

يغرح الذنب او ينكسر من احناكاهـ بالحيطان او بجواني  
 المعلق او بالقوش او من سقطة او ضربة  
 الاعراض : ممانعة الحيوان عندما يراد النوم او لمس  
 العضوان كان الجرح غائرا فربما تسبب عنه نزف مضر او نخر

العظام العصبية . وإن كان مكسوراً فزيغان الزائدة الذيلية  
ويكون الذنب اذ ذاك كثير الحساسة جداً يقبضة الحيوان بين  
الانفخاد . احتقان شديد احياناً

العلاج : تثبت الذنب بحيث لا يتحرك وإن كان الاحتقان  
شديداً فالتشريط وإن كان نزقاً فالضمادات الباردة او بيركلورور  
الحديد . النظافة التامة . وقد تحدث احياناً غنغرينا عقيب  
الجرح ومن اعراضها الاحتقان ونقاطات حويصلية وبرودة  
العضو المصاب وقد يتهتك الجلد وينتثر احياناً

علاجها : التشريط والكي بالحديد المحمى . البتر . وإن كان  
الجرح غائراً والعظم متأذياً يحدث النقر او الثغر ومن اعراض  
الاحتقان والتقيح ويتكون ناصور او أكثر  
العلاج : قطع الثغر . كي النواصير . بتر الذنب



### (١٩١) رض وجراح الانفخاد

امر كثير الحدوث للحيوانات من جرى رفسة او سقطة او  
من احشاك الات الجراو من التحميل



وقد يختلف العرض من الخدش البسيط السطحي الى الجرح  
للفاسع العميق المرافق بالمو عرج وتزرف واحتقان شديد احيانا  
العلاج: حسب اهمية الجرح. سكب الماء البارد. اللزق  
القابضة. المحاريق. الراحة. وقد تلجىء الضرورة احيانا الى تعليق  
الحجوان بحيث يرتفع عن الارض

### (١٩٢) كسر عظم الفك

ينكسر عظم الفك من السقوط تحت الحمل او من صدمة  
شديدة. وهذا الكسر غير قابل الانجبار في الحيوانات الكبيرة  
الجسم

الاعراض: (قد يصعب تشخيص كسر عظم الفك في الحيوانات  
الكبيرة بسبب سماكة عضلاتها) ارتفاع العضو. قصره. عسر  
الدوس والمشي. الاحتقان. وان جذبت الفك المكسورة الى الجهة  
الوحشية اي جهة الشخص الجاذب يمكن مداها وابعادها اكثر مما  
لو كانت سليمة وبجالتها الطبيعية

وان وضعت الاذن على الفك وحرك قليلا يسمع صرير او

خشخشة العظم المكسور. وأما في الحيوانات الصغيرة الحجم فيكون  
الفحص اسهل والتشخيص اصح  
العلاج : لا علاج تقريباً لاجناس الحيوانات الكبيرة .  
وللصغيرة . تجبير العضو بمصائب ولفائف مغموسة بمذوب  
الدكسترين ويعتنى باليجاد وسائل تمنع العضو المصاب من  
الحركة . وغالباً يقصر العضو بعد انجباره



### (١٩٣) التهاب مفصل الرضفة

الرضفة عظم صغير مفرطح قصير سميك مثلث موقعة القسم  
المقدم من الركبة ومن اسباب التهاب مفصلها الجراح واللطامات  
او عقب التهاب البلبورا او التهاب الرحم والبريتون  
الاعراض : تورم وسخونة والم . تعسر المشي بنوع ان الحيوان  
يسحب رجلاً سحياً على الارض . وان كان جرح يسيل منه زلال .  
ويتكون ناسور . وتلتهب كل الركبة وربما انكشفت الغضاريف  
واذا ذاك يكون الخطر عظيماً  
العلاج : الضمادات القابضة . صب الماء البارد . الحرقائق .

كي النواسير بمذوب السليمانى . التغيير على الجرح بالمرهم المصرى .  
الراحة التامة



### (١٩٤) استسقاء المنفصل

ارتشاج يحدث في التجويف المنفصلي خصوصاً للخيول  
اسبابة: يعقب التهاب منفصل الرضفة او يحصل عن لطمة  
او ضربة او عن شد عنيف او عن زيانان الرضفة زياناً غير  
كامل

الاعراض: ورم مختلف الحجم رخو متبجح قلما يؤلم او يؤلم  
قليلاً على انه يعوق الحركة فيسحب الحيوان رجلاً سحياً وتظهر  
الرضفة كأنها بارزة

العلاج: الحرايق . الكي بالحديد الحى . ومنهم من يحفن  
الحل بصبغة اليود على ان هذه الطريقة لا تخلو من الخطر



### (١٩٥) زيانان الرضفة

تزيغ الرضفة زياناً كاملاً او جزئياً وهذا الاخير أكثر

حدوثاً من الأول وهو كثير الحدوث للخيول خصوصاً للفتية منها  
أسبابه: الهزال . والأمراض المضعفة والسقاوة . انقباض  
المفصل انقباضاً فجائياً

الأعراض: يحدث فجأة أن الحيوان لا يقدر أن يثني ركبته  
ويكون رأس الحافر فقط راکزاً على الأرض وإن مشى يسحب رجلاً  
سحباً . وإن جس المحل يحس بان الرضفة زائغة الى فوق وإن  
الرُبط متوترة . ولا ألم في أول الأمر

العلاج: يمسك الحيوان بالمقود من تحت ذنبه ويلزم بان  
يرجع الى الوراء . ويربط قيد في بيت الشكال بحيث تجذب الرجل  
الى الامام ويضرب بعنف على ثنية الركبة . صب الماء البارد  
الدهونات المنبهة والحرايق . وهذه العلة كثيرة الانتكاس

### (١٩٦) كسر الرضفة

كسر الرضفة كثير الحدوث للخيول وأسبابه وفس حيوان آخر  
اعراضه: عسرا وتعذر المشي . سحب الفخذ عند السير وفي  
الراحة الدوس على رأس الحافر . ألم شديد وورم . وبالجس يحس

بتباعد تقطعتي العظم المكسور أو بشظاياها. وشفاء هذا الكسري بطي  
عسروقلما يشفى تماماً  
العلاج: الراحة. التخيير بلنائق مغسوة بمذوب الدكسترين.  
الحرقاريق المتعاقبة

### (١٩٧) شلل العصب الفخذي المابضي

قد يُشل هذا العصب شللاً جزئياً وذلك من رضة شديدة  
تؤذي الضفيرة العصبية (موقع هذا العصب أعلى الفخذ)  
الاعتراض: عسر مشي أشبه بالمسبب عن آفات الرضة.  
وكما أني الحيوان حافراً إلى الأرض يكبو بحيث يمس سطح  
المحافر الأرض  
العلاج: الحرقاريق المتكررة. الكهربية. والراحة في مرج.  
اخضر

### (١٩٨) احتقان ليمفاوي

احتقان الليمفا في الفخذ كثير الحدوث عقب ضربة أو  
جرح أو رضة

الاعراض: انتفاخ يختلف حجمه بحسب داخلته بعقد نائمة  
 موملة تسبب عسر المشي وحى. ويحدث أحياناً قيح وكثيراً ما  
 تلتبس العلة بالنهاب الوريد وهي من العلل السهلة للمعاودة  
 العلاج: فرك الورم بالخل. اللصق المحمرة او المحرقة. المروح  
 النشادرى ويسقى المصاب المساهل المحمية والمشروبات الحديدية  
 المقوية وإن حدثت نقط متقيحة فتكوى بالحديد المحى



### (١٩٩) جراح القصة والعروق

تحدث الجروح في هذا القسم من رفس او لطمة وتكون  
 مختلفة الصغر والسعة بسيطة او يخالطها اذى الوريد الصافن او  
 العظم الطويل المعروف بالقصة  
 الاعراض: احترقان وحرارة والم وعرج وان كان الوريد  
 مصاباً فترف وبالجس تعرف حالة العظم  
 العلاج: قطع الترف بالوضعيات القابضة او بيركلورود  
 الحديد. خياطة الجرح وان بقي الاحتقان فالحراريق والراحة.  
 وان ظن بان عظم القصة مشقوق يعلق الحيوان بحيث لا يمس  
 الارض

## (٢٠٠) كسر القصبة

ينكسر هذا العظم من رفس اوسطة وعلى الغالب يحدث به انشقاق بدون تفرق القطعتين

الاعراض : عرج رفع العضو عن الارض . ورم والم وحي . وان كان العظم مشقوقاً فقط يكمل انكساره عند ربوض الحيوان او نهوضه

العلاج : لا علاج تقريباً للحيوانات من النوع الكبير والصغير التخيير بلفائف وعصائب مغموسة بالاكسترين مذاباً بالماء وانهاض الحيوان



## (٢٠١) انقطاع رباط القصبة بعظم رسغ القدم

ينقطع وتر هذه العضلة من زهق الحيوان وسقوطه الى الورا او من رفسه بعنف . ويعرف هذا الوتر بالقصي الرفي الاعراض : يحصل عرج بغنة وفي المربط يكون العضو ملتقى على الارض ولكن وقت السير يسحب الحيوان سحباً وعندما يرتفع عن الارض نراه مرغياً مندلياً وما تحت العرقوب لا يثنى لجهة

البطن ووتر العرقوب رخو حتى يخال كان عظم الساق مكسور بدون الم. وهذه الافة سليمة العاقبة على انها بطيئة الشفاء تقتضي شهرين في الراحة

العلاج: وضع الاجبار بقصد تثبيت الساق ومنع الحركة  
الحارريق ان كان احتقان

### (٢٠٢) تورم المابض

هو ورم متعظم صلب يتكون في الوجه الداخلي والاعلى للمابض اي ثنية العرقوب على راس عظم القصبة. وهو يحدث عن ضربة او رضة وعاقبته سليمة  
اعراضه: الورم الصلب في القسم المنوه عنه واحيانا عرج خفيف

علاجه: في الابتداء الحارريق والمراهم الممللة والأ فالكى بالحديد المحمى

### (٢٠٣) تورم العرقوب

هذه العلة نوعان الاول ورم متعظم يحصل في الوجه الداخلي



والاسفل من ثنية العرقوب اعلى قليلاً من راس عظم الساق  
المعروف بالمدفع فاعدته على العظام الدرقية وقد يمكن ان يمتد  
ويعم كل ذاك القسم

اسبابه : كثرة اجتهاد الحيوان بالشد وقت الجر او الوثوب  
او الجروح بعنف . تشغيل الحيوان قبل تمام نموه . الرض . سوء  
تركيب خلقي

الاعراض : وقت الراحة يبطأ الحيوان على راس حافره  
وان سار خيباً يعرج وقد يمكن ان يطل العرج بعد تعب  
الحيوان وركضه مدة واحياناً يتالم من جس المحل ونشوه روية  
المابض اذا كان الورم كبيراً . وقد يحدث الداء في الفائميتين معاً .  
وفي مدة السير يكبو المصاب اي يثني عرقوبه الى الامام

العلاج : في الابتداء الحرايق . المحللات مثل مرهم ثالث  
يودور الزئبق بنسبة واحد الى عشرين او مرهم كرومات البوتاس .  
الكي بالمحدد المحي وان كان يمرود يدخل داخل الورم كان انفع .  
تكرار العمل ان لم تحصل نتيجة

واما النوع الثاني المعروف بالجاف فهو حركة تشنجية في  
العرقوب يديها الحيوان وقت السير واسبابه غير معروفة وقد  
تنسب لضغط غضروف عظم القدم

الاعراض: لا عرض وقت الراحة ولكن وقت المشي تشنني  
الرجل من العرقوب بغتة وهذا الامر أكثر وضوحاً عند ابتداء  
ركضه. ولا دواء لهذا الداء

### (٢٠٤) المرض المعروف بالجرداء والجاردون

ورم متعظم موقعة الوجه الخلفي من العرقوب



(شكل ٤)

اسبابه: لطمة. الاجتهاد او الوثوب بعنف وقيل استعداد

ارثي

الاعراض: عرج. ألم موضعي. ورم يشوه العرقوب. تلبك  
حركة العضلات القابضة

العلاج: الحمايق. الدهون المحللة كهرم يودور الزئبق  
او الرصاص او البوتاس والافق الكي بالمحديب المحمي واجوده  
ان يكون الكي غائرا



### (٢٠٥) الورم الزلالي

يحدث من تمدد الرلال داخل مفصل العرقوب وهو ورم  
موقعه الوجه الداخلي ان كان مفصليا وعلى جانبي العرقوب ان  
كان وتريا ويكون اذذاك مثل كيسين يختلطان سوياً واحيانا



يكون الورم مثل كيس على الجهة  
اليمنى او اليسرى (انظر الاشكال  
٦٥) وهذا الورم يتكون احياناً بسرعة  
واخرى ببطء

الاسباب: ضربة والتشغيل  
فوق مقدرة الحيوان او عقب التهاب  
المفصل

(شكل ٦٥)

الاعراض: ورم يشوه ذاك

القسم ويكون رخواً متموجاً وإن تعب المصاب يتألم ويعرج. وإن  
تكون الورم يبطء فلا عرج ولا حساسة فوق العادة المألوفة.  
لكن تلبك خفيف وقت المشي ما لم يكن الورم ضخماً جداً. ومنه  
نوع مستعص غالباً موقعة القسم الامامي الظاهر السفلي للعقوب  
(انظر شكل ٧)




(شكل ٧)

العلاج: نفس علاج التهاب  
المفصل إذا كانت الاعراض النهائية.  
صب الماء البارد. الوضعيات القابضة  
كحلول ملح الرصاص او الشب الابيض  
الحار يرق. المراهم اليودية او مرهم كرومات  
البوتاس. البنزل والحفن بصيغة اليود

خصوصاً إذا كان الورم على جانبي العقوب. على شرط ان تبقى  
الصبغة ٤ او ٥ دقائق داخل الكيس. ومنهم من اشار بالضغط  
على ان الكي بالمد يد الحمى من اجود الوسائط

(٢٠٦) ايغروما . وهو التقيع

- ورم رخو موقعة نتو العرقوب (انظر شكل ٨ و ٩)



شكل ٨ و ٩

اسبابه: احتكاك نتو العرقوب باجسام صلبة . الرفس .  
ويقتضى لشفائه وقت وصبر

الاعراض: ورم رخو متموج مختلف الحجم غير مؤلم في اول  
حدوثه ولا يتسبب عنه عرج

العلاج: الوضعيات الباردة القابضة في الابتداء وعند زوال  
الالتهاب الدهن بصغة اليوداو بالمروخ النشادري . الحرايق

المتكررة. الشق والحفن بصبغة اليود. الدهن بالفطران المكربل  
وضع الخلخال. الكي الغائر بالحديد المحمى. على ان الخلخال والكي  
يبقيان أثرًا مشوهًا



## الفصل الحادي والعشرون

في علل الفوائم الامامية

### (٢٠٧) الخراج على الكتف

يحدث خصوصًا لحبل الجر من ضغط القلائد او من

رض عنيف

الاعراض: تورم سخن مؤلم متفج عبيق فلما يشعر بتهموجه  
وقد يبقى الورم احيانًا مدة طويلة قبل ان يتفج

العلاج: اللزق المرخية. البضع. الكي الغائر. وعندما يخرج  
الصديد ولو قليلًا يشفى الاحتقان حالًا. تحسين القلائد بحيث  
لا تضغط الأضغاطًا متساويًا



### (٢٠٨) الارتشاج الدموي

يرشح الدم في النسيج الخلوي من صدمة شديدة او من عضه

حيوان لاخر فيضغط المرتشخ الضفيرة العضدية ولربما سبب شلل العضو الامامي

الاعراض: تشل حركة العضو شللاً كلياً او جزئياً حسب كثرة اوقلة التفرعات العصبية الحاصل عليها الارتشاج  
العلاج: سكب الماء البارد. الحارريق. الخلال. الكي  
بالحديد. الراحة في مرج اخضر

### (٢٠٩) شلل عضلة الكتف

تشل عضلة الكتف احياناً من جرى وثاق الحيوان وقت عملية ما او من صدمة ترض العضلات في ذاك القسم  
الاعراض: عسر رفع العضو بحيث لا يقدر الحيوان ان يحرك كتفه الى الامام فيفلج الارض براس حافره ويكبو بحيث تمس رمانة يده واحياناً ركبته الارض. وقد تهزل الكتف ويبرز اللوح

العلاج: قد يمكن ازالة العلة بفرك المحل بمراهم منبهة اذا كانت موقنة او نوعاً من الخدر والا فالحارريق. الكي. الكهربائية.  
(دولاب البرق)

## (٢١٠) كسر اللوح

هذا العرض نادر الحدوث وإن حصل فمن صدمة أو  
سقطة أو ضربة

الاعراض: عسرا وعدم المقدرة على القيام اليد على الأرض  
وقد يمشي الحيوان وثباً رافعاً العضو المصاب. فإن كان عنق  
الرفش المكسور لا يحصل زيغان واضح وعكسه إذا كانت إحدى  
زواياه

العلاج: إن لم يكن زيغان يثبت المحل بلفائف وعصائب  
مصلبة مبلولة بمواد لاصقة أو بدهن المحل بالدهونات المنفطة. وإن  
كان العظم زائغاً يرد ويعمل ما تقدم

## (٢١١) زيغان اللوح

يزيغ اللوح من السقوط تحت الحمل خصوصاً ومن اعراض  
زيغانه بروز راسه. تغدر حركة الكتف. قصر العضو  
العلاج: رد الخلع عسرو غالباً غير ممكن وإن رد ينخلع ثانية



من حركات طفيفة . وطريقة الردان يطرح الحيوان ويربط تحت ركبته ويشد بالرباط وبالوقت ذاته يضغط الساعد على العظم البارز حسب مقتضى الحال . وعندما يتم المقصود توضع الجبائر بحيث تبطل حركة العضو تماماً

## (٢١٢) التهاب الغشاء الزلالي الكتفي العضدي

يلتهب الغشاء الزلالي في هذا القسم عقب علل البليورا ومن اعراضه ألم وحي وعسر في المشي وفقد شهوة الأكل  
العلاج : الحرايق . المنفطات . ومن الداخل يسقى المصاب مذوب كربونات الصودا او سالي سيلات الصودا من ٥ الى ٨ دراهم يومياً حسب نوعية الحيوان

## (٢١٣) الكسر بوجه العموم

الاسباب المتبعة للكسر هي العنف الخارجي كصدمه حجر او دولاب او عريش عجلة او كلة مدفع او نحو ذلك او يكون السبب غير واصل الى موضع الكسر وذلك كما اذا

حصل من الوثوب أو الوقوع من موضع عال أو تحت الحمل .  
وانواع الكسر تنقسم الى اقسام منها الكاملة البسيطة والمتعددة  
والمختلطة وغير الكاملة والصدعية وهي عبارة عن انشقاق العظم  
بغير بينونة القطع

اعراض الكسر: الألم قد يكون خفيفاً حتى لا يكاد يشعر به  
وقد يشتد بحيث يعذب بلا انقطاع . وعدم اقتدار المصاب على  
تحريك العضو . الانتفاخ . تغير هيئة الطرف بزوغان العظم  
المكسور . قابلية التحريك غير الطبيعي ابي في غير مواضع المفاصل  
وهي اوضح اعراض الكسر . الصرير والخنششة الحاصلة من  
احتكاك طرفي العظم المكسور

معالجة الكسور . رد الكسر بالمد أو بالخلل أو بالعجن واللي  
ثم وضع جهاز التجبير . والجهاز المذكور كناية عن وسائد ورفائد  
وعصائب تغط بمواد لاصقة مثل مذوب الزفت او جبسين مجبول  
بماء او بزال البيض او بمذوب الدكسترين . وقد يحتاج الامر  
احياناً الى تعليق الحيوان مخافة التحريك وزج الجبار . وان ظهر على  
المصاب حمى تعطى المسهلات والمرطبات . واذا تكون صديد  
يجب اطلاقه بالشق

## (٣١٤) الخلع عموماً

الخلع ترحزح طرف عظم من مفصله ترحزحاً كلياً او جزئياً وهو يحدث ا.ا عن صدمة خارجية او عن جهد عضلي او عن السقوط تحت الحمل . ومن اعراضه تغير هيئة المفصل فينخفض موضع البروز الطبيعي ويبرز راس العظم في موضع غير اعتيادي وقد يقصر العضو او يستطيل وتتنوع الحركات المفصلية الطبيعية . ويمتاز الخلع عن الكسر بعدم وجود الصرير او الخشخشة التي تحصل من ملاسة طرفي العظم المكسور

العلاج: يتم رد الخلع بازاحة طرف العظم المخلوع الى حيث يمكن العضلات ان تؤثر فيه فتجذبه الى موضعه . وينفل ذلك اما بالحرفة او بالقوة . فاذا لزم استعمال القوة بطرح المصاب على فراش قش ويمد العظم المخلوع ويبرم او يدار او يثنى ويبسط حسب مقتضى الحال وبحيث يزاح راس العظم من مقره غير الطبيعي . وبعد الرد يسكن العضو الى ان تلتئم الرباطات المهزقة لئلا يتجدد الخلع

## (٢١٥) اسفنج الكوع

ورم رخو عجبي القوام مختلف الحجم مولم او غير مولم يحدث للخيال على قمة الكوع . واسبابه هيئة ربوض خصوصية يتخذها الحيوان يسمونها بالربوض البقري فينضغط راس الكوع بالنعلة ضغطاً تكررهُ بسبب الورم الاسفنجي

اعراضه: ورم رخو مختلف حجمة . انتشار الشعر عن القسم المصاب . انتفاخ الكوع بكامله احياناً . ففي ابتداء الامر يكون داخل الورم دم ومصل وان ازم من فحصل مقتط ضمن كيس غشائي . و احياناً يتكون خراج يتفج وتبقى مكان العلة نقطة متصلة بالعلاج : ينظر في النعلة بحيث لا تزيد عن الحافر وتكون اكثر ضغطاً على الكوع وقت الربوض ويربط للحيوان مثل محدة صغيرة في يمت شكله وهو في الاخور . الغسولات واللقز القابضة وعندما يحس بالتوج يشق الورم او توضع الحرايق . الحفن مجلول فيلاني او بصغة اليود هذا مع مراعاة امر النظافة ومنع الاسباب المحدثه

## (٢١٦) رض وشج الركبة

قد يختلف شج الركبة من الرض البسيط او تحديش الجلد الى الجرح الغائر. واسبابه السقوط على الركب  
 الاعراض: ان كان رضا او خدشاً فحرارة والم وانتفاخ قليل  
 وان كان الجلد ممزوقاً يسيل من الجرح دماً. وان كان  
 الجرح غائراً يسيل منه زلال ويكون حى وانتفاخ وألم مختلف الشدة  
 العلاج: الغسولات او الضمادات الباردة. محلول ملح  
 الرصاص مع صبغة الارنيكا. المروخات المحرقة. المرهم المصري.  
 وان تكن زوائد لحمية في الجرح تكوى بحجر جهنم او بالتب  
 المحروق



## (٢١٧) الورم الزلالي في الركبة

ورم يحدث عند تمدد الاجرنة الزلاية داخل مفصل الركبة  
 واسبابه الوثوب والركض السريع. او تشغيل الحيوان قبل ان  
 يبلغ اشده

الاعراض: ورم مختلف الحجم موقعة فوق الركبة لوجهها  
الظاهر. والورم رخو متموج يشوه المفصل ويعوق الحركة وقد  
يعرج الحيوان قليلاً والمرض حاد

العلاج: الضمادات الباردة القابضة. الحرايق. الدهن  
بصبغة اليود. مرهم يودور البوتاسيوم او كرومات البوتاس او  
كلاهما معاً بنسبة واحد من كل من املاح البوتاس الى ٨ مرهم  
بسيط

### (٢١٨) توتر الرباط

قد يصيب الرباطات خصوصاً الوتر القابض في اليد  
التهاب سببه ثقل الحمل والركض السريع. زلة القدم. رض  
عنيف وما شاكل



الاعراض: احترقان على سير العظم  
المعروف بالمدفع اي من تحت الركبة  
لرمانة اليد من الجهة الخلفية (شكل  
١٠) زيادة الحس حسب عظم  
التهاب. وفي وقت الراحة يكون  
العضو نصف مثني ووقت المشي عرج

(شكل ١٠ و ١١)

ظاهر جلياً وإن ازمن الداء ترم زلوية الرمانة الامامية كما في  
(الشكل ١١)

العلاج: الراحة. صب الماء البارد. الفرك بمرهم ثاني يودور  
الزئبق بنسبة ١ الى ٨. الحرايق او النار السائلة. الكي بالحديد  
الحصى. ولا تقطع الوتر وهذا من متعلقات الجراحة

## الفصل الثاني والعشرون

في امراض القدم

(٢١٩) الورم المعروف بالموليت

هو عبارة عن ورم زلالي يظهر حوالى الزراري رمانة اليد وينشا

(شكل ١٢)



عن اتساع الجراب الزلالي اتساعاً زائداً وعن

اتساع الغمد السلاحي ومفصل بيت الشكال.

وقد يكون الورم جانبياً او مقدماً فيها معاً

اسبابه: الاجتهاد العنيف. صدمة. العدو

السريع. التعب المفرط قبل الاشتداد

الاعراض: انتفاخ قلما يؤلم وإن ازمن

يتصلب ويسبب العرج ويبس المفصل (انظر شكل ١٢)

العلاج: الضمادات الباردة القابضة. اللفائف الضاغطة.  
المراهم المحللة. الحمايق. الكي بالنار. الراحة. ومنهم من اشار  
بالحنن بصبغة اليود على ان عواقبها ردية

—xox—

### (٢٢٠) استسقاء الزر. اي رمانة اليد

ورم موقعة الوجه الامامي للزر  
(انظر شكل ١٢). اسبابه وعلاجه  
كالذكر آنفا



—xox—

### (٢٢١) اغروما الزر

ورم رخو يحدث من اتساع  
الكيس المخاطي في الوجه المقدم للزر (شكل ١٢)  
بذات النقطة التي يحصل فيها الاستسقاء المقدم ذكره  
علاجه نفس علاج الاستسقاء ولكن لصبغة اليود هنا حثنا  
نتيجة غالباً حسنة



## (٢٢٢) ورم المدفع المتعظم

ورم صلب مركزة احد جوانب العظم المعروف بالمدفع  
واعتياديا في مجاورة اتحاد هذا العظم بالشظية  
اسبابه: صدمة او سقطة. التشغيل قبل اشتداد القوى .  
فقد الاملاح الكلسية من العلف  
الاعراض: ألم شديد تحت الجبس . عرج . ورم صلب سخن  
غير متحرك وقد يكون قرب الركبة او على مسير المدفع او فوق  
الزورنما

علاجه: المروخات المحرقة في الابتداء ثم المحللات مثل مرهم  
ثاني يودور الزئبق او مرهم الزئبق القوي على شرط الفك به مدة  
طويلة كل مرة . او مرهم كرومات البوتاس . الكي الغائر بالمحدد



## (٢٢٣) التهاب الغدة السمسماني

اغلب حدوث هذا الالتهاب بعقب التهاب البلورا او  
ذات الرئة او التهاب غلاف القلب وهو يصيب اليد الواحدة او  
الاثنين بالتعاقب

الاعراض: عرج. سخونة اليد. ألم يزيد بضغط الجهة الخلفية السفلى لعظم المدفع أي فوق الزر. ورم وارتشاج في ذاك القسم. وتكون اليد مرفوعة وقت الراحة  
 العلاج: عند ظهور الألم حالاً يفرك بالسوائل المنقطة. الراحة. الفرك بهمهم يودور الرصاص أو الزئبق الكي بالمحديد المحي



### (٢٢٤) الصكة

عبارة عن رض مع تمزق أو دونه ناشيء عن تصاك القدمين أو عن مصادمتها لأجسام غريبة ومركز هذا المرض الكعبان أي الزران أو رمانات القوائم  
 أسبابه: ضعف عام ناتج عن التقدم في السن أو عن قلة الأكل أو عن ضعف في الصلب وفي كلا الحالين تصك القدم وقت السير وتلطم اختها أو أنه يحدث من اتساع القدم أو عدم موافقة النعلة

الاعراض: تختلف الاعراض باعتبار قوة الصدمة فتارة يكون خدشاً بسيطاً وتارة جرحاً غائراً مع حرارة والم وعرج وتورم

في الوجه الداخلي من الزر. ومن تكرار حدوث السبب تكون  
اورام متصلة واحياناً خراجات عسرة الشفاء  
العلاج: يعالج الجرح كجرح بسيط وتوضع للحيوانات هراشات  
(نوع جوارب كالطماق) لمنع حدوث السبب ويعتني ببيطرة  
الحيوان من حيث النعلة وموافقتها للحاضر وان حدث الاصطكاك  
عن الضعف يعلف الحيوان جيداً



### (٢٢٥) كسر السلامي (عظم في بيت الشكال)

يحدث هذا الكسر في القوائم الامامية والخلفية. واسبابه  
ضربة او صدمة او شد الحيوان قدمه بعنف وهو محصور بين  
حجرين مثلاً وهذه العلة كثيرة الحدوث للخيول المتقدمة بالعمر  
الاعراض: خشخشة العظم المكسور مع ألم وعدم المقدرة على  
القاء الحافر على الارض. تحريك القيد اي بيت الشكال. واحياناً  
يحبس بشظايا العظم المكسور. وهذه الاعراض تكون واضحة عند  
حدوث العرض وقد تبهم معرفتها اذا مضى عليه بضع ساعات  
بسبب الاحتقان الذي يحصل

العلاج: لا يرجى الشفاء التام في الحيوانات الكبيرة على انه اذا كان الحيوان ثميناً ومعداً للولادة فلا باس من معالجته . فتضم الاطراف المكسورة بعضها الى بعض وتمنع من التحرك ثم يوضع تفتيك مبلول بسائل منبه محلل كروح الكافور ومتى امتلا التجويف يوضع جبار من تفتيك مغسوساً بكلس مروب بياض البيض ويعلق الحيوان بحيث لا تمس قدمه الارض



### (٢٢٦) مرض الرسغ اي بيت الشكال

مرض يعتري بيت الشكال من تاثير القيد فيه حين عرصة الحيوان ويظهر نارة على هيئة جرح سطحي لا تشا عنه عوارض واخرى يكون غائراً حتى يصل الى الوتر فيصير حينئذٍ وربما كبيراً يمنع الحيوان من العمل وان اهل امره يصير شديد القبح موجبا لعوارض رديئة

علاجه: الضمادات الباردة القابضة كحللول ملح الرصاص مرهم الحامض الكربوليك . النظافة التامة . وقد يبقى لهذا الداء بعد البرء منه اثر مشوه على هيئة حبال لا شعر بمكانه

## (٢٢٧) التواء الزر

هو داء يحدث في منفصل بيت الشكال . واسبابه اعوجاج  
القدم حين وضعها على الارض والاتكاه الكاذب والزلق والسقوط  
والفعل العنيف الذي يفعله الحيوان لتخليص قدمه من شق ما  
او من بين حجارة

اعراضه: تورم مع ألم مختلف الشدة من ألم خفيف الى شديد  
بحيث لا يقدر الحيوان على وضع قدمه على الارض . سخونة . عرج .  
وقد يكون الالتواء المذكور في بعض الاحيان شديداً جداً بحيث  
تمزق الاربطة وينقلب الزر الى الامام وتظهر على المصاب  
امارات الحزن ويفقد شهوة الاكل ويجم . ومنى وصل الداء الى  
هذه الدرجة لا يرجى شفاؤه

العلاج: متى كان الالتواء خفيفاً يزول براحة الحيوان  
والوضعيات الباردة القابضة . وان كان شديداً يرد الزر ويعمل  
جبار ضاغط بمزج . ١ درهم من الشب المحروق وبياض ٦ بيضات  
تقطب بها رفايد يعصب بها العضو المغهور بالتفتيك ويزال الجبار  
بعد ٨ او ١٠ ايام ثم توضع الحراريق ويكوى بالنار

## (٢٢٨) الورم المتعظم في القيد

مركز هذا الورم الاجزاء المجانية التي لعظم الاكليل بقرب مفصله مع القدم ويظهر تارة في الجانب الباطن من عظم الاكليل وتارة في جانبه الظاهر وتارة فيهما معا . وهذا المرض عرضي لين في الابتداء ياخذ في الصلابة بالتدرج حتى يتعظم

اسبابه: الرض وضغط القيد. انشقاق او كسر العظم السلاحي اعراضه: تورم . ألم تحت الضغط . عرج . واحيانا اشتداد اوتار العضلات الباسطة ومن ثم وقوف القدم بحيث يدوس المصاب على راس حافره

العلاج: الكي الغائر بالحديد المحمى . مرهم يودور الزئبق . الحرايق . وان اهمل الورم حتى يتعظم فلا امل بشفاؤه

## (٢٢٩) كسر عظم الاكليل

ينكسر هذا العظم من صدمة شديدة وأكثر حدوثه في الخيل واعراضه عرج والم بحيث لا يقدر الحيوان على وضع قدمه على الارض

العلاج: وضع جبيرة. ثم الحرايق او الكي بالحديد المحمى.

## (٢٣٠) الجاوار الجلدي

ينقسم الجاوار الى جلدي ووتري فالجلدي ويقال له الجاوار البسيط بمثلة الدمامل التي تعتري الانسان لما بينهما من المشابهة التامة ويعتري الاقدام المؤخرة أكثر من المقدمة ومركزه محل القيد اي بيت الشكال او في جوانبه

اسبابه: مشي الحيوان في الوحل او السرجين او البول او اقامته فيه وكذلك انغراز جسم ما في القدم وقلة نظافة الجرح اعراضه: قد لا يظهر في بعض الاحيان الا دمل واحد وقد تظهر دمامل كثيرة في آن واحد وقد تزول الدمامل الاولى ويحلها غيرها وينشا عنها التهاب ولم شديد احيانا وعرج وحى ثم تنقيج الدمامل او الدملة ويسيل منها صديد دامر احيانا ينبتك سطح الجلد ويسقط قطعاً واسعة يختم الجرح مكانها بسهولة على انه يبقى احيانا مكانها ناسور موم يقتضى لشفائه اهتمام خصوصي

العلاج: النظافة وحفظ الرجل المريضة من وضعها في الوحل والسرجين وجميع الاجسام المهيجة. الغسولات واللج المليئة

وان ابطاً سقوط الجاد الميت يعاون على اسقاطه بتغطيس القدم  
بمذوب الشب الازرق ويغير على الجرح بصبغة الصبر او بالمرهم  
المصري. وان تكون ناسور يوضع بضعاً غائراً ويحفظ او يضمد  
بمذوب كبريتات النحاس اي الشب الازرق

### (٣٣١) الجوار الوتري

وهو بمنزلة ريج الشوكة في الانسان مركزة حول الاوتار  
الباسطة اما في ظاهر غلافها واما في باطنه وهو ورم فلغموني اقبح  
واشد المآل من الجوار البسيط المقدم ذكره ومحلته كحله في بيت  
الشكل ويمتد بسرعة فيحيط بالاكليل والزر الى ما فوق في بعض  
الاحيان

الاسباب والاعراض: اسباب هذا الداء كاسباب سابقه  
الذي هو في الغالب ناشئ عنه. ويتميز عنه بشدة الالم وورم  
التهابي وورم فلغموني متفحج يوجب في الغالب اضطراب الوظائف  
ويبدو على هيئة ازرار صغيرة تصير خراجات ثم تبدل بازرار اخر  
ويتورم جلد ثنية الفيد ثم يصير احمر ويشند الالم فيعرج الحيوان



وقد تحدث في بعض الاحيان نواسير عبيقة تخرج منها مادة  
ثينة عفنة مائلة الى الحمرة وتستمر هذه الحال حتى يصير الورم خراجاً  
ويخرج القيح. وقد يتحلل الورم بدون قيح فتتناقص الاعراض  
الانتهائية ببطء ولا تظهر الا بعد مدة طويلة. وقد تحدث احياناً  
غثغرينا ويتسوس العظم وتقرح بعض رُبط وترية او مفصلية  
علاجه: يسرع بشق الورم او الخراج الحادث شقاً غائراً مع  
الاحتراس من مس الاوعية الكبيرة والاعصاب. الغسولات والليخ  
المليئة بغطيس القدم بمذوب الشب الازرق وان كانت نواسير  
تشق وتحقن بصبغة الصبر او صبغة اليود او بمجلول فيلاني. الحرايق  
والكي اذا بقي ورم احتقاني. هذا مع اراحة الحيوان تماماً وحفظ  
قدمه من الرطوبة



### (٢٢٢) تشقق الجلد

يتشقق الجلد غالباً في بيت الشكال وحياناً الزر على هيئة  
جروح معترضة ويدل دائماً على تقرح وبسطة في بعض الاحيان  
المرض المعروف بماء الساقين وقد يرافقه  
اسبابه: عدم النظافة ومشى الحيوان في الوحل والسرجين

او غير مواد مهيجة او من قص شعر الزر قصاً عميقاً او ضغط القيد

الاعراض: تورم وحرارة والم وارتشاح مادة مصلية وهذه تجف وتكون قشوراً. احتقان العضو احتقاناً يختلف شدته. تشقق الجلد وثقيبه. ويكون السير مولماً ويفتح الجرح عند حركة الحيوان. وقد يسبق التشقق احياناً الجوارار الجلدي ويكون مستعصياً عسر الشفاء خصوصاً المسبب عن مشي الحيوان في ماء الثلج الذائب ويكون بمنزلة التثليج في الانسان

العلاج: بلخ بزر الكتان او طحين الشعير معجوناً بالعسل. الغسل بمغلي النخالة فاتراً مضافاً اليه قليل من كربونات الصودا. الدهن بالزبدة. وعندما تسقط القشور ويخف الالتهاب يرش مسحوق النشا. ترويض الحيوان مع الاحتراس من تشيته في الوحل ومن سوفه بسرعة

(٢٣٣) الكرابودين . ويقال له داء الحمار

هو ورم مزمن في الجزء المقدم من عظم الاكليل مصحوب بانتصاب الشعر وانفصال حافة الحافر عن حلقته وهناك ترشح

مادة حامضة منتنة نجف وتكون فشوراً. وقد يكون هذا المرض مصحوباً بماء الساقين او بالمرض التيني او المرض الكراثي وقد يؤول الى ان يكون شقوقاً او نملياً وان ثلث القدم. وهو يحدث للماء وعرجاً

علاجه: تطرية الحافر بالغسولات واللبخ وترقيقه بآلة البيطرة المعروفة بالكف. واجود مرهم هو القطران المكربل بنسبة ٤ حامض كربوليك الى ١٠٠ قطران وخصوصاً زيت الكاز الحقيقي يدهن منه يومياً. ويقتضى لعلاج هذا الداء مدة طويلة وقد يمكن ان لا يشفى تماماً على انه ينتفع بتشغيل الحيوان

### (٢٢٤) داء السيم

هو عبارة عن شق ضيق جداً يعترى جدار الحافر موازياً لللياف وهو أكثر حدوثاً لذوات الحافر مما لذوات الظلف. والغالب ان الحوافر الجافة الهشة عرضة لهذا المرض. وقد يكون الشق سطحياً او غائراً جزئياً او كاملاً

اسبابه: يكثر هذا الداء في الخيل التي اقدمها سمينة قليلة

الصلابة والخيل التي ترسل الى اماكن شديدة الحرارة الجوى فيمحيث  
تجف الحوافر وتيبس وتنقبض نسجها . ومن رداثة النعال وجراح  
عظم الاكليل وما اعتادت عليه المياطرة من ترفيق جدران  
الحافر ترفيقاً قبيحاً يجعله عرضة للرض الذي نحن في صددِه

اعراضه : شق ظاهر في الحافر يفتح وينضم على التعاقب وقت  
الانكاء ورفع الحافر . يندى اعنيادياً بشق صغير دام على  
الاكليل ويكون مؤلماً ويئد رويداً رويداً الى آخر الحافر فيتسبب  
عنه عرج قليل او كثير مع حرارة والم الحافر واحياناً يشتد الالتهاب  
ويفتح ويتغفر فيحدث تسوس العظم وفي هكذا حالة يحصل  
الجوار الغضروفي الذي سيأتي بيانه

العلاج : الاهتمام بالحافر من حيث النظافة وحسن السيطرة  
وان كان صلباً يابساً يدهن بمادة دهنية لتلينه . وان كان الشق  
سطحياً يشفى غالباً بكيه بالحديد المحمى والراحة . وللشق الغائر  
عملية خاصة به وهي تقوم بوضع شنكل يحفر له في حافتي الحافر  
ويوضع بحيث يقرب شفري الشق ويضمهما وهكذا يمكن الانتفاع  
بتشغيل الحيوان المصاب

## (٢٣٥) الزوائد في باطن الحافر

هي اورام قرنية تنمو في السطح الباطن من الحافر على هيئة نتوءات غير منتظمة بعضها مستدير وبعضها اسطواناني وهي توجد في الاقدام المقدمة اكثر من المؤخرة وتظهر في السنيك تارة وفي الجوانب اخرى ولكن اكثر وجودها في الزائدين الشبيهتين بالثديين وتارة تكون منفردة وتارة مصحوبة بالسيم السابق وتارة بتسوس عظم القدم او بامراض اخرى وقد تصير ناسورية

اسبابها: داء السيم ورض الحافر والتنعيل القبيح

الاعراض: يشاهد عند النسف من الحافر على الخط الالبيض جزء مخني نحدي به الى الداخل ويمتد على صحن الحافر. ولربما كان الورم القرني شاغلاً سماكة الحافر جزءاً او كلاً. عرج قل او كثير. ويكون جزء الحافر المصاب اشد حرارة والماء من سائر اجزائه والغالب ان الاكليل ينفع وقد ينقلب في الباطن جزء من حافة الحافر المقابل لحل المرض وقد ينقلب في بعض الاحيان الجانب المريض. واكثر تلك الزوائد مصحوب بشقوق باطنة تغور في سمك الجدار وتمتد بحسب طوله

العلاج: في اول ظهور العلة الغسولات واللج. نسف الورم  
القرني بكفة البيطار نسفاً غائراً حتى اللحم الحبي ثم يغير على الجرح  
بالمزج الكربوليك مع مراعاة النظافة والراحة



### (٢٣٦) انضغاط العقين

ينشأ عن المشي على ارض صلبة محجرة غير مستوية ويعتري  
الخيل التي تمشي على اعتابها وعن طول فرعي النعل وشدهما  
ورداءة التنميل

الاعراض: عرج مختلف الشدة مع الم بقرع او بحس  
الحل المصاب وسخوته. وان نسف الحافر يشاهد نقطة  
مختلف لونها من الاصفر الى الاسود حسب قدمية الآفة  
ولربما تقيح الجزء المصاب وتسبب عن ذلك تسوس العظم وتهتك  
الغضاريف

العلاج: ترفيق الحافر والتغير بمزج بسيط. وان تكوّن قرح  
فالأوفق الشق الغائر وفصل النقطة المصابة والتغير بمزج  
الشب الأزرق. استعمال نعل عريضة وحسن التنميل

## (٢٣٧) الجوار الغضروفي

هو تسوس النسيج الليفي الغضروفي الجانبي وتسوس الرباط  
المفصلي الجانبي المقدم للقدم

الاسباب: الرض. جرح الغضروف بحجم قاطع او واخز.  
اصطكاك الارجل. او يحدث عن جوار وتري او عن انضغاط  
العقبين المتقيج. او عن اصابة البيطار. وهو اكثر حدوثا لحيل  
الحجر ما لحيل الركوب

الاعراض: تورم الغضروف. ثم ألم وعرج. وتكون حويصلة  
او اكثر تفرز قيحا دائما تخالطه ندف مخضرة تلتصق بالحافر. وان  
جفت حويصلة يظهر غيرها. وان كان المرض قديما تشوه  
هيئة الحافر وقد يسري سريانا سريعا ويصل الورم الانتهاء الى  
الاكليل فيكبر حجمه. وتظهر نواسير وان اهل الحال تحدث  
غفغرينا ويتسوس العظم ونهتك الربط ويكون الألم شديدا جئا  
بحيث يستمر الحيوان واقفا على ثلاث قوائم فقط

العلاج: الحمامات الفائرة واللخ. الكي بمذوب كبريتات  
النحاس اي الشب الازرق مشبعا او بمذوب ملح التوتيا او بمذوب

السلاماني في السيرتو بنسبة واحد الى ١٠ على شرط ان يهتدى  
بمرشد يدخل في الناسور ويحقق فيه السائل حقيقة مرة او عدة  
مرات في اليوم . وفي بعض الاحوال يجب فصل الجزء المصاب  
بالآلة حادة . ثم توضع اللخ المسكنة المليئة



### (٢٢٨) وخر صحن القدم

تنشا هذه العوارض عن اجسام حادة او قاطعة يدوس  
عليها الحيوان حين مشيه فتوجب له آفات مختلفة باختلاف هيئتها  
واتجاهها وقوتها واختلاف ما اصابته من الاجزاء . وهذه الاجسام  
مثل مسامير وقطع صوان او زجاج وما اشبه ان دخلت في  
القدم فتارة تخرج وتارة لا واخرى يخرج بعضها . واحيانا تتوصل  
الى الاجزاء الحية وتارة تبقى في محلها مدة ما ثم تغور في القدم بحسب  
انكاسها على الارض

الاعراض : وجود الجسم الواخر او اثر فعله وجميع المسامير  
وما اشبهها التي تصل الى الاجزاء الحية ينشا عنها في الحال عرج  
قوته معادلة للتهدج والغالب ان ينشا عنها نتيج اذا ترك تقرح ورفع



الاخص والنسر وخرجت منه مادة منقيحة واحداث عوارض مختلفة . وقد يتفق بعض الاحيان ان المسامير المذكورة تدخل في العقب وتخرج من بيت الشكال بدون ان تحدث عوارض قبيحة وان كان الوخر خفيفاً عرج منه الحيوان غالباً بدون افات ظاهرة الا اذا كان الجسم الجارج مغرواً في القدم او كان الجرح الناشئ عنه قد اتسع اتساعاً ما ومتى حدث خراج تحت الحافر او كانت المادة الصديدية منحصرة في الباطن كانت القدم متألماً سخنة . ثم قد ينشا ورم ومتى وصلت الاجسام الغريبة الى عظام القدم حدث ألم مستمر وانقبض العضو المريض انتباضاً شديداً حتى لا يستطيع الحيوان ان يتكى عليه

العلاج : رفع القدم وتنظيفها . ازالة النعل وتقليم الحافر تقليماً بليغاً لا يخرج الجسم الغريب ولمعرفة سيره واثره . الراحة التامة . الضمادات الباردة والاحسن وضع القد في الماء البارد وان لم يخف العرج يوسع الجرح وتوضع عليه مادة كاوية كمشحوق السلياني واجود منه الشب الازرق مذروراً او محلولاً بنسبة ١ الى ١٠ . وان تسوس العظم يلجأ الى عملية جراحية لا يعبر عنها بالحروف ولا يتفن اجراؤها الا من شاهد عملها



## (٢٣٩) التهاب الحافر

اسم لالتهاب شديد يحصل في النسيج القرني للحافر وهو حاد ومزمن

اسبابه: العلف بمواد كثيرة التغذية. الفصول الحارة. مشي طويل قهري لا سيما في ارض صلبة محجرة. التشغيل المتعب بعد راحة طويلة. شرب الماء البارد حين العرق. مكث الحيوان متسندا على ثلاث قوائم بسبب علية او علة في القائمة الرابعة. آفة معوية

الاعراض العامة: هيئة حزن وخمول. حمى. تقزز. ارتعاش البدن. تيبس الصلب. احتقان الاغشية المخاطية

وقد تدوم هذه الاعراض من بضع ساعات الى يومين الاعراض الموضعية: سخونة القدم وزيادة حسه. تعسر المشي او تعذره. وان كان المرض في القوائم المؤخرة تكون هذه وقت الراحة مقدمة الى الامام. ولسي الحيوان في هذا المرض هيئة خصوصية فتراه يتحرك ببطء وبكل تأن ويدوس على عقبه وقوائمه الامامية تحت الجسم ليكون ثقله عليها وان رفعت القدم الواحدة

لا يقدر الحيوان ان يتكى على الثانية ويكثر المريض من رفع ووضع حوافره. وبعد بضعة ايام يبقى اغلب الوقت رابضاً ويحصل له من جرى ذلك قروح عميقة. وقد يشتد الالم احياناً على الحيوان الى اقصى درجات الاحتمال فينسند الى الحائط كما لو كان في دوار

ويحدث هذا المرض للبق في الاقدام المؤخرة فيعسر مشيها ويتحدب صليها ويظل اجترارها ونح وتهزل بسرعة. واسبابه فيها الشغل على ارض صلبة محجرة لا من زيادة التغذية

وقد يحصل ارتشاح دم في النسيج الشبكي فيتورم وترتفع عظمة القدم الى الخلف وغالباً ينفذ الدم من حافة الاكليل . او انه يتكون صديد في النسيج تحت القرن فيشتد الالم جداً ويتعذر الوقوف وينفذ القيح من العقب واحياناً يحدث غنغرينا وتدم البنية فيضعف النبض ويبرد الجسم وتترق الاغشية المخاطية . ويموت المصاب

وان انتقل الداء الى الازمان لتغير هيئة الحافر وطبيعة المفرزات التي تنبعث منه فتطول القدم وتترق ويتثنى الحافر ويصير قصفاً وينمو العقبان باكثر سرعة بالنسبة لنمو راس الحافر وتعلو (انظر شكل ١٤) ويمتلي صحن الحافر فتظهر الفرجة بين

العقنين اعمق وقد يتفشر دأثر الحافر ويتكوّن محل التفشر



تجويف مهتلي دم جاف  
ويمجد التجويف المذكور  
من الخلف طبقة من  
حافر متولد جديداً

(شكل ١٤)

العلاج: بدرجة الحدة. الفصد العام وتكراره اذا كان  
الحيوان قوي البنية. فصد السنيك. الوضعيات القابضة ليخ من  
الدلفان بشرط ان تبقى طرية رطبة. تغطس اقدام الحيوان في  
نهر او بركة وتركه فيه ما امكن. ويصح في الاصطبل بماء مختلط  
بملح او ماء محبض مخوي على املاج حديدية كالزاج مثلاً يوضع  
ضاماداً او تغطس فيه القدم. فرك العضو فركاً ناشفاً او بالخل  
وان امكن ترفيق الحافر بالكفة. ويغصب المصاب على الربوض  
على فراش من القش الناشف. ومن الداخل تعطى المساهل  
المليحة وماء ملح البارود لادرار البول. ولا يعلف الا قليلاً من  
طحين مدوف بماء

وان توصل الداء الى درجة الازمان لا يرجى شفاؤه وانما  
يعالج المصاب للانتفاع وقتاً بشغله. ولذلك يدلك الزر ويس

الشكال والأكليل بزيت الخزامى وتوضع حوالي القدم ليخ ملينة  
وان كان المصاب هزياً تعطى جنود الجنطيانا او خشب الكينا  
وان كان نحي وحرارة باطنة يعطى مشروباً من ملح البارود . ومنى  
تولدت جواهر ليفية او زوائد تحت الحافر وواجبت ارتفاعه  
او انحراف السلاميات وجب فصلها عن القدم بعمل جراحي بان  
يرقق الجدار بمبرد او آلة حافرة حتى يصير ضعيفاً فيجثد يعتدل  
عظم القدم هذا اذا لم يكن الداء قد ادى الى تلف شديد والا  
فالعوض بوجهه الكريم

### (٢٤٠) المرض الحصى

هو التهاب الشبكة الوعائية التي تحت اللقافة الخشنة المحيطة  
بالحديبات الاخضية من قدم الكلب واكثر حصول هذا  
الالتهاب لكلب الصيد لكونه معرضاً للسير الطويل في اراضي  
يابسة محجرة حارة من اشعة الشمس او على شوك او في ارض مغطاة  
بالثلج

الاعراض : التهاب حديبات القدم وحرارتها واحمرارها

وتورمها وزيادة حسها. وأحياناً يكون الجلد مخدشاً وأخرى يحصل شقوق أو تجمع مادة مصلية تصير صديديّة مع ألم وعرج وفقد شهوة الأكل وسحي عهومية

العلاج: الراحة. الوضعيات الباردة: ليح من الطباشير مجبولاً بالخل. دهن القدم بالسمن أو بالشحم وهذا مما يمرض الكلب لمدّامة لحس قدمه وهي أجود واسطة للشفاء

### (٢٤١) المرض الضفدعي

المرض الضفدعي يعتري خلال النسر وقد يصيب أكثر من قائمة بوقت واحد وهو من الأمراض العسرة الشفاء اسبابه: غامضة. المحلات الرطبة الواطئة. مكث الاقدام في الوحل والروث وأغلب حدوثه للبراذين الضعيفة البنية اعراضه: ورم النسر وليونة قرنيه ليناً خيطياً وتولد اضرار مختلفة الشكل يخرج منها مادة سوداء منتنة. وأحياناً يتدي الدماء من بيت الشكال فيصير الجلد هناك متورماً متشقّقاً كما في مرض ماء الساقين ثم يمتد الى العقبين ومنها الى النسر فيفسد الانسجة ويحيلها الى جوهر اسفنجي كأنه غير عضوي وفي باطنه جنود وفي

ظاهرة ازرار ليفية . وقد يمتد المرض المذكور بالتدرج ويغور غالباً بين الوترين الجانبيين حتى يصل الى عظم القدم ويقلعه . وقد ينفصل الحافر وتشوه هيئته ويزيد حجمه فيتسع العقبان وينخران ويتسع الجدار وينقلب الى الظاهر ويبس القرن ويتشق وقد لا يكون عرجاً او انه يكون خفيفاً وغالباً يخلط هذا الداء بماه الساقين ويظن ان المرضين من طبيعة واحدة

العلاج : يقطع جميع الجوهر النباتي والاحص والوساده الاخضيه حتى يصل القطع الى اطراف الجواهر النباتية فينشأ عن هذه العملية جرح يغطي بتفتيك مغموس في روح الكافور او العرق وفوقه تفتيك ناشف ويثبت بجبائر وبعد ثلاث ايام يكشف على الجرح وتزال عنه القشرة البيضاء باحتراس بحيث لا يدمي ويغير عليه بنسالة مدهونة بمرهم القطران المكربل وذلك كل يوم او مرتين في اليوم وفي كل مرة تكشط القشرة عن سطح الجرح وهكذا الى ان يتكون الحافر تكوناً جيداً وتحصل الاجزاء على صلابة كافية فيبتدئ يقل التغير ثم يندر حتى يحصل الشفاء ولا يتم هذا الا بعد مدة طويلة واعناء شديد

## ٢٤٢) ثقرح الظلف .

هو داء مختص بذوات الصوف عبارة عن قرح تحت  
الظلف يفسده بالتدرج ثم يفسد الاجزاء السفلى من القدم  
اسبابه: العدوى . وله مدة حضانه تختلف من ٤ الى ٦ ايام .  
وما يوجب حدوثه مكث الحيوان في وحل كاوٍ اوروث وبول  
وقد يصير في بعض الاحيان وبائياً

اعراضه: يصيب الظلف الواحد من القائمة الواحدة او  
الظلفين معاً واكثر من قائمة بوقت واحد وفي البدء يكون العرج  
قليلاً والصحة العمومية جيدة ثم ينفصل الظلف من حافته وكذلك  
العقبان في الغالب وقد ينفصل السطح الباطن من الظلف في  
بعض الاحيان . ومن اليوم الخامس الى السابع يحمر دائر الظلف  
ويسخن ويفرز مادة مصلية ويعرج المصاب . وان ازيل الجزء المنفصل  
من الظلف ظهرت خراجة صغيرة تفرج ويكون وسطها احمر  
يفرز مادة بيضاء كريهة الرائحة وقد تفقد شهوة الاكل ويزداد ألم  
القدم وحرارتها ويمتد القرح حتى يصير شنيع الهيئة والجزء المنفصل  
يكون صلباً موازياً للاكليل ويلتوي الظلف التواء خفيفاً والورم



يبد الحافر الى الامام فيظهر ان الظلف قد طال فيزداد الالم  
ويهزل الحيوان بسرعة ويزداد العرج حتى لا يستطيع الحيوان  
الانكماش على عضوه المريض فان كان المرض في القدمين المتقدمين  
زحف المصاب على ركبتيه وان عم الاربع ربض على جنبه حتى  
يهلك . وجميع النسيج التي تحت الحافر تنعفن وتفسد العظام  
والربط ويحدث خراجات ونواسير في الاكليل ويصير الجرح منتناً  
ثم يسقط الحافر وينسد ما فوقه من الاجزاء

العلاج : يبدأ بتفريق القطيع . قطع الظلف المنفصل لكشف  
النسيج الفاسد وكيه بماء الفضة اي الحامض النتريك او بالحامض  
الكربولييك او بزيت الاتيمون او بالشب الازرق او بخلات  
النحاس اي الزنجار . ويغير عليه بمرم اخدي هذه الجواهر . يوضع  
على باب المراج صندوق قليل الصق فيه مروب الكلس بحيث  
يدوس فيه القطيع عند دخوله وخروجه . وان لوحظ تعسر الشفاء  
بعد اجراء ما تقدم فالأوفق ارسال المصاب الى الجزر

### (٢٤٣) المرض التيني

هو عبارة عن تولد زوائد لحمية مستديرة تشبه عجر النين

بالهشوة في تظهر في بيت الشكال او على اكليل الحافر او على جميعها  
وقد تجتمع فتصير كتلاً ذات ازرار كثيرة سميت في الغالب  
بالعنقود. وبعضها مشتمل على قشرة سنجابية وبعضها يفرز مادة  
زلالية حامضة منتنة

وهذا الداء يعترى غالباً البغال والحمير ويدل دائماً على  
تلف الجلد ويتبع في الغالب مرض ماء الساقين ثم يصاحبه  
ولذلك يصير قبيحاً يندر البرء منه ومعالجته كعلاج ماء الساقين  
لكن ينبغي كنه او قطعة او ربطه



### (٢٤٤) المرض الكراثي

هو كسابقه في جميع الامور ما عدا الهيئة فان على اسطحه  
زوائد اللحمية او على اطرافها خيوطاً او قطعاً او حديدات كثيرة  
مختلفة الحجم تشبه البصيلات او ساق الكراث ومركز هذا المرض  
كسابقه في بيت الشكال والاكليل وهو تمام ماء الساقين  
والعلاج واحد



### (٢٤٥) رض الحافر

هو عبارة عن نوع تخلخل يعترى النسيج الشبكي ناشئ عن

ضرب الحافر ضرباً شديداً أو عن صدم الحافر جسماً كثيراً الصلابة  
اعراضه: ألم شديد وحرارة. عرج مختلف الشدة والضعف  
باختلاف درجات العارض المذكور

العلاج: الوضعيات الباردة القابضة. أو وضع القدم في  
طين لزج مجبول بالخل أو في مذوب كبريتات الحديد أي  
الزاج الأخضر أو توضع على الحافر لينة من هباب المداخن مجبولة  
بالخل. وإن كان الالتهاب شديداً يفصد السنبك. ولا تهمل  
معالجة القدم المروضة مخافة حدوث الداء المعروف بالتهاب  
الحافر

### (٢٤٦) المرض النهملي

هو داء يبدو مرتفعاً في الطرف الاسفل من السنبك ثم  
ياخذ في الاتساع شيئاً فشيئاً حتى يعيب الحافر وحدوثه عن  
مرض النسيج الشبكي الذي تحت الحافر أو من فعل نعل حامية  
مكثت على القدم مدة طويلة

اعراضه: متى بلغ المرض درجة ما اوجب للحافر دواجر  
وتغيرات اخر وانخفضت جوانب القدم وامتدت من السنبك

الذي طرفه يرتفع وينثني الى الاعلى اما جانب الحافر فينخفض  
انخفاضاً تاماً الى الباطن وارتفاع الحافر ناشئ عن تولد جوهر  
فرقي تحت الحافر الاصلي يرفعه ويزحزحه الى الظاهر فيصير  
طرف عظم القدم منحرفاً من موخره الى اسفله ثم يصير المرض  
المذكور قرنين متراكبين احدهما ظاهر جاف شديد الصلابة ومتي  
دفع ذاك المرض عظم القدم انفصل السنبك والاحمص عن  
الجدار وانتهى المرض بالمرض الهلالي

العلاج: اذا كان المرض خفيفاً زال من نفسه لكن ينبغي  
تغير النعل ليسقط الحافر بحيث يكون الاتكاء على الجوانب  
وينبغي ايضاً ان توضع حول القدم جواهر دمنة تلين الحافر  
وتسرع نموه. ومتي كان المرض مصحوباً بموت الانجزاء وجبت ازالتهما  
ليتولد حافر جديد ويعود عظم القدم الى حاله الاصلية ويغير  
على الجرح الحاصل كجرح بسيط

### (٢٤٧) المرض الهلالي

هو داء يعنري اخمص السنبك ويصير ورماً ناشئاً عن  
المرض النملّي او عن نتيجة عرضية بين صحن الحافر وعظم القدم

فان كان ناشئاً عن المرض النحلي كما هو الغالب كان مركزة ومقره  
السلامية الاخيرة التي طرفها ميل الى الاسفل والخلف ويضغط  
الاخص ويحمله مرتفعاً دائماً. ومتى بلغ هذا المرض درجة ما عطل  
مشي الحيوان وجعله لا يتنكي الا على طرف عظم القدم ويحس بالم  
شديد لا يستطيع عملاً. وان كان ناشئاً عن نتيجة عرضية وهي  
نادر اوجب اعوجاج عظم القدم اعوجاجاً عكس الاعوجاج الذي  
اوجبه المرض النحلي ثم دفعة الى الاعلى وضغطة نحو سنبك الجدار  
الذي تارةً يجعل هذا الضغط وتارةً لا

العلاج: اذا كان المرض ناشئاً عن المرض النحلي لم يبرأ الا  
اذا ازيل المرض الاصلي فينبغي علاجه والاعتناء به. وان كان  
عن نتيجة عرضية احتاج الى عمل جراحي وهو قطع القرن البارز  
وجزء من السنبك ان احتيج الى قطعه ثم قطع ما تولد تحت  
الحافر ثم يغطى الجزء المحي بتفتيك ويعالج على حسب القواعد  
التي ذكرناها في جراح القدم

### (٢٤٨) حرارة النسر

هو عبارة عن تغير خفيف النهائي مصحوب برشح مادة سودا

تمكث في خلال النسر وربما اوجعت عوارض كثيرة . ولا يصاب  
النسر بالآفة المذكورة إلا اذا أهملت القدم ولم تزل عنها النتائج  
القرنية التي تحصر المادة المهيجة في قعر التجويف الثلث الذي  
للنسر وذلك ينشأ بالخصوص عن مكث الاقدام في الاماكن  
الرطبة الوسخة لاسيما في البول والروث

علاجه : وضع الحيوان في مكان جاف ثم يقطع كثير من  
القرن الذي في خلال النسر وكثير من الحافر لتظهر الجيوب  
والتجويف التي ترشح منها المادة وبوضع ضماد من مذوب خلالات  
الرصاص حتى ينقطع الرشح بالكلية



### (٢٤٩) سقوط الحافر

هو عارض قبيح جداً واسبابه قوة ظاهرة ينشأ عنها انفصال  
الحافر انفصلاً تاماً عن الاجزاء اللينة وقد يكون ناشئاً عن مرض  
كالنقرح . ففي الحال الاول يتفلع الحافر من شدة تحامل الحيوان  
بقدمه على الارض او الحجارة او عن اضطراب الحيوان لتخليص  
رجليه من شق بين حجرين

العلاج: هذه العلة لا تقبل الشفاء التام وإن كان ناشئاً عن التهاب الأجزاء فالأولى تركه بدون علاج ومتى تحقق أن ليس في هذه الحال غنغرينا ظاهرة فتغيرات النسيج الباطنة تمنع تولد حافر جديد جيد بل يتولد حافر معيب يوجب ضغطاً مختلفاً فلا يقدر الحيوان أن يعمل عملاً فيترك للتناسل إذا كان صالحاً لذلك. وإن كان سقوط الحافر عن فعل عنيف ولم ينفصل انفصلاً تاماً وبقي النسيج الشبكي سليماً من الآفات الواضحة يرجى البرء منه فيبادر بهكذا حالة إلى وضع قفنيك جاف يثبت برباط ثم طبقة ثانية وثالثة تثبت برباط آخر وذلك لمنع التزف ويترك مدة كافية حتى تضيق الأوعية. وينبغي منع المصاب من الطعام حتى تزول الحمى فعند ذلك يعطى طحيناً مدوفاً بماء. وعندما يراد الكشف عن الجرح يبل الجهاز بماء فاتر لتسهيل إزالته. ويوضع مكانه قفنيك مدهون بمزيج الحامض الكربوليك أو بالزبدة ويغير على الحبل كل يوم حتى يصبر الحافر الجديد المتولد بصلاية كافية مع الاعتناء بأن يدهن بعد التغيير جميع القدم بمادة دسمة. وإن دل النبض على امتلاء دموي وجب فصد أحد الوداجين مراراً بحسب الحاجة. وينتضي لمعالجة سقوط الحافر اهتمام كلي وصبر جميل

## (٢٥٠) المرض الحزوني

هو مرض فرحي يعنري جلد ما بين الظلفين من البقر وذوات  
الظلف ثم يمتد بالتدرج ويغور شيئاً فشيئاً حتي يصل الى الرباط  
الاصبعي فيفسده وتلفه بالكلية

اسبابه: الوسخ والحصى التي تدخل في الجلد بين الظلفين  
ومكث السرجين والوحل الحامض وغيرها من المواد المهيجة في  
ذاك المحل . ويكثر في الحيوان الكثير الاعمال وقد يكون وبائياً  
فيهم كثيراً من بهائم اقاليم كثيرة

الاعراض: اولاً التهاب خفيف وورم في ما بين الظلفين  
يكون في الابتداء احمر ثم يصير ابيض بالتدرج ثم يموت الجلد  
هناك ويتغطى القرع بمادة جامدة سنجابية اللون منتنة الرائحة وقد  
تشولد قروح صغيرة سوداء تجميع فتصير قرحاً كبيراً لا يزال  
ياكل جلد ما بين الاصابع حتي يكشف الرباط الذي بينها فيشتد  
الالم حينئذ ولا يستطيع الحيوان ان يتكي على قدمه المريضة وتشتد  
الحى الرادة الفعل وينقطع الاجترار ويهزل الحيوان بسرعة  
علاجه: يتندا بازالة الاسباب الموجبة وازالة الالتهاب



بتوقيف المصاب في ماء جارٍ وربطة في محلٍ جاف بحيث لا يدوس في روث أو غيره من المواد المهيضة ثم توضع اللج الملمنة حتى تظهر حال التفرح فيوضع تثنيك مغسوس في نبيذ فاتر وبعد نقص الالتهاب تعمل الوضعيات القابضة كهدوب ملح الرصاص أو الشب الأزرق وإن لم تنفد فالمرهم المصري وإن صارت حافة الفرج سوداء وجب قطع اللحم الردي ليحدث جرح بسيط أو يكوى بالحديد الحمي كيما خفيفاً غير غائر ويستعمل اذ ذاك التضسيد بعرق مخلوط ماء وبعض مواد جافة قابضة . وإن وصل الفرج الى الرباط وهتكة فلا ينفع علاج بعدئذٍ . وهذا المرض والمعروف بتفرج الظلف واحدٌ تقريباً



### (٢٥١) الفقايع

علة خاصة بذات الظلف وهي عبارة عن فقايع تحدث ما بين الظلفين ويرافقها ألم واحمرار وحرارة ثم تنفجر عن مادة شفافة تكون في بعض الأحيان صفراء . ثم تصبح قرحاً صغيراً يمكث مدةً ويشج إذا اهل

العلاج: يوضع الحيوان في محل جاف ولتسكين الألم توضع اللج الملمنة ثم الضمادات القابضة كهدوب ملح الرصاص وما شاكل

## الفصل الثالث والعشرون

### عوارض مختلفة

(٢٥٢) لسعة الأفعى

تحدث لساثر الحيوانات خصوصاً للكلب  
الأعراض: الانقطاع عن الأكل . حي . تلبك الحركة .  
سرعة النبض وعدم انتظامه . ازرقاق الأغشية المخاطية . ولبعض  
الحيوانات غثيان وقيء . وفي محل اللسعة هالة حمراء ملتصقة مع  
فقاع وورم صلب مختلف السعة . وقد تكون خشكاشة  
غضروفية . وتختلف شدة الأعراض باختلاف كمية السم الممتص  
العلاج: المبادرة لمنع امتصاص السم فيربط العضو فوق  
اللسعة وتشق الهالة الحمراء ويمص الدم بواسطة المحاجم والعصر  
ثم يكوى المحل بالنار أو بروح النشادر . ويسقى من الداخل  
المنبهات مثل روح النشادر أو خللاته بماه



(٢٥٣) المحروق

للمحروق درجات فمن تحمير الجلد والفقايع إلى التقيح ومنه  
الأنسجة . وأسبابها النار أو سوائل غالية

الاعراض: احمرار المحل المحروق وزيادة حسه. فقايع وتورم  
تقيح. وان كان المحرق شديداً مات الجلد تماماً. حتى. حزن. سرعة  
التنفس. احمرار الأغشية المخاطية. تنزير

العلاج: الضمادات الباردة القابضة بالدهن بمروخ الكلس  
المركب من زيت الزيتون وماء الكلس اجزاء متساوية وتقطعية  
القسم بالقطن المندوف. الدهن بمواد دسمة. فتح الفقايع. وان  
كانت خشكريشة توضع اللج الملية ولج العسل. وان طالت  
مدة التقيح تلاحظ جودة علف الحيوان وسكناه في محل مجدد الهواء  
جيد. وامور النظافة

### (٢٥٤) التجليد

للتجليد درجات فمن التهاب بسيط الى غنغرينة وفقايع  
وخشكريشة وخمول تام

العلاج: تدفئة العضو شيئاً فشيئاً. الفك بالنييد. الضمادات  
القابضة الافيونية حسب الظروف. المشاريب السخنة المنبهة.  
خالات النشادر. الاثير نريك

## (٢٥٥) السلع الشحمية

عارض يحدث لسائر انواع الحيوان . اسبابه حك الفلاند  
وضغطها

الاعراض : ورم مختلف الحجم اعيادياً مستدير غير مؤلم  
يترك في النسيج الخلوي ويحس به متجنباً ضمة . مادة كاشم او  
العسل

علاجه : استئصال الورم بسخ الجلد عنه او شقه وتفرغ المادة  
الشحمية وتضيد الجرح بسيل منه او كاو قليلاً كماء الحامض  
الكربوليك

—x—

## (٢٥٦) اينديا

استسقاء تحت الجلد تخلف مساحته . كثير الحدوث لسائر  
انواع الحيوان وهو اما ذاتي او عرضي  
اسبابه : الرضات . الجراح . الخراجات او علل تعوق دورة  
الدم كعلل القلب . والخييل الهرمة عرضة له اكثر من سواها  
واغلب حصوله في الفوائم

اعراضه: ورم عيني اذا ضغط بالاصبع ابقى اثرًا. ألم قليل  
وبا انشريط تخرج منه مادة مصلية  
علاجه: ازالة السبب وشق الورم ومعالجة كجرح بسيط  
الدهونات المحللة والمحرقه. الكي بالنار



### (٢٥٧) الاسفكسيا اي الاختناق

يحدث من سببين. اما عدم كفاية الهواء بمانع يمنع انتشاقه  
كما في الشنق والخنق والغرق. او استنشاق هواء فاسد كبخار الفحم  
وما اشبه

العلاج: ابعاد السبب اولًا. فرك السلسلة الفقرية بسوائل  
منبهة كالنبيذ او الخل الساخن. التنفس الاصطناعي اي نفخ الهواء  
في صدر المصاب. تغطية الجسم بالصوف. المشروبات المنبهة.  
تنشيق الخل البكر. وان حصل الاختناق من البرد. يدفأ المصاب  
شيئًا فشيئًا. فرك الجسم بالتليج ثم الاستعاضة عنه بما اكثر سخونة



### (٢٥٨) ضرب الحرارة

يحدث بسبب كثرة الحر. واعراضه في وقت العمل. بطء

الحركة . العرق . عسر المشي وتلبكه . وفي وقت الراحة . يكون  
 الرأس منكساً والمناخر مفتوحة والتنفس سريعاً صغيراً . وحركة  
 الخواصر مضطربة والأغشية المخاطية مزرقّة والنهض في أول  
 الأمر سريعاً ثم يضعف شيئاً فشيئاً

## الفصل الرابع والعشرون

فيما يتعلق بالولادة

(٢٥٩) الحمل . العشار

الحمل حالة الانثى من حين علوقها الى حين الوضع ولمعرفة  
 العلوق علامات منها بطلان الحمال وكبر البطن والضرع وتغير  
 البول لان كمية الاملاح الكلوية تقل فيه غالباً . وحركة الجنين  
 قرب الشهر الخامس في البقر والسابع في الخيل ويحس بحركته اذا  
 وضعت اليد على الخاصرة اليمنى والانثى تشرب . انتفاخ الثدي  
 قلة الحليب في الحلابات . وفي البقر يكون الجنين مائلاً الى  
 الخاصرة اليمنى وفي الخيل الى اليسرى . ومعدل مدة حمل الخيل

أحد عشر شهراً ونصف ومدة حبل البقرة تسعة أشهر ونصف .  
وحبل الغنم والماعز خمسة أشهر . والخزيرة أربعة . والكلاب من  
ثمانية وخمسين إلى خمسة وستين يوماً . والهريرة من خمسين إلى  
ستين يوماً . والارانب شهر واحد . ومن النظر إلى الشكل ١٥



(شكل ١٥)

يتصور القاري هيئة وضع الجنين الطبيعية داخل رحم أمه واتجاهه  
أن الوضع

وللجنين داخل الرحم تكييفات كثيرة في الخمسة عشر يوماً  
الأولى من العلق تستقر البويضة في الرحم ويكون قطرها اذ ذاك  
ملياً بمترين أي اثنين من الالف من المتر ومن الاسبوع الثالث

الى الرابع بصير قطر الجبين من ٩ الى ١٤ ميليمتراً . ومن الاسبوع الخامس الى الثامن ينمو بأكثر سرعة بحيث يصير قطره من ٤٨ الى ٥٥ ميليمتراً وتأخذ اذ ذاك هيئة بالوضوح وتكون اطرافه كدرنات صغيرة . ومن الاسبوع التاسع الى الثالث عشر يصير قطره من ١٥٠ الى ١٦٠ ميليمتراً وتأخذ الحوافر في التكون والاعضاء التناسلية ايضاً . ومن الاسبوع الرابع عشر الى الثاني والعشرين يصير طوله في الخيل والبقر من ٢٢ الى ٣٥ سنتيمتراً وقد توزن الاعضاء التناسلية بالحكم على الجنسية اذ ذاك . ومن الاسبوع الثالث والعشرين الى الرابع والثلاثين يصير طوله ٧٠ سنتيمتراً ويتكون الجهاز العضلي وينمو القلب والاعوية الغليظة ويظهر الشعر . ومن الاسبوع الخامس والثلاثين الى الثامن والاربعين يصير طول الفلو من متر وخمسة وعشرين سنتيمتراً الى متر وثلاثين

والعلوق التوأمي قليل الحدوث في الخيل وأكثر حدوثاً في البقر على انه اعنيادي في الغنم . وقيل اذا كانت فلفة التوأم اثني في البقر تكون غالباً عاقراً



## (٢٦٠) مداراة الانثى الحامل

يجب ابعاد الحامل عن مجاورة الفحل وتشغيلها بالرفق بحيث لا تعب . ترويضها من وقت الى آخر او تركها في مرجة خضراء .  
تحسين علفها ونظافة مربطها من الامور الضرورية



## (٢٦١) الاسقاط او الاجهاض

الاسقاط هو اندفاع الجنين قبل اوانه وذلك عن علة في بنية الام او من عرض يطرا عليها كسقطه او لطمة وقيل ان لبعض انواع الغذاء وللتغيرات الجوية دخلاً في حدوثه . وقد يمكن ان يكون ايضاً من اعتلال البزرة وقد يكون وافدياً . وما يدل على قرب الاسقاط القلق وحرارة الجلد وفقد الشهوة . ثم نزف مصحوب بمغص . هيئة الحيا والضرع

ولمنع الاسقاط النصد الخفيف اذا كانت الحامل دموية قوية البنية وان كانت هزيلة ضعيفة تعطى المقويات المرة وان كانت الامعاء قابضة يعطى مسهل خفيف وان كان مغص تعال الحنفن الاقيونية بدرهم من خمر الافيون كل نصف ساعة حتى

يظهر الفعل هذا مع فرك الجسم فركاً ناشئاً وربط الأنثى في محل  
مظلم بعيد عن الضجة  
وإن كان الاستقاط عن علة وافدة فلا علاج لمنعو غير إبعاد  
السبب والنظافة ونظهير الاصطبلات بطرشها بالكس وتحسين  
العلف

### (٢٦٢) الوضع الطبيعي

هي وظيفة طبيعية تقوم من اندفاع الجنين من باطن الأم الى  
الخارج ومن علامات قرب الوضع هبوط البطن وغور الخواصر  
وانتفاخ الضرع وزيادة حسوسيلان من الحياء وفي الخيل يقطر  
من حلمة الثدي حليب مصفر ثمانية ايام قبل الوضع. ويقال  
للظواهر التي تسبق الوضع طلقاً وهي كناية عن مغص وانقباض  
الرحم ثم تمددها واختفاء عنق الرحم ثم سكون الألم ليعود ثانياً  
بأشد قوة وحدة وتطول وتتقارب الى ان تنفصل لفائف الجنين  
وينفتح قليلاً عنق الرحم فتبرز الأغشية الى المهبل ثم الرأس والقوائم  
الامامية فيشتد حينئذ الطلق وتنقاص العضلات البطنية  
وبمساعدة تقلص الرحم تتمزق الأغشية ويسيل السيل الامنيوسي

(ماء الواس) ويضع الجنين الى المهبل ثم الى الخارج تماماً بهيئة  
الوضع المرسومة في شكل (١٥) فان كانت الاثني واقفة ينقطع  
المهبل المري عند سقوط الجنين وان لم ينقطع ينقطع بعد عقده  
عن بعد فيراط ونصف عن الصرة. ثم لا تمكث المشيمة ان  
تنفصل وتندفع وقد انتهى الامر

وان تعسر الوضع وكان الم المطلق شديداً وعنق الرحم يابساً  
والفلق كلياً تمشى الاثني ويفرك بطنها بلطف وتعمل التهايل  
واللج المليئة والحفن بمغلي رؤوس الخشخاش او بمزيج درهم خمر  
الافقيون

وان كان المطلق خفيفاً وانقباض الرحم معدوماً تسقى  
المشاريب العطرية كمغلي ورق النعناع او الخمر او مغلي الجودار  
القرني من درهمين الى ٢ للجيل والبقرو من ربع الى ثلث درهم  
للحيوانات الصغيرة ولهذه الاخيرة يستعمل ايضاً عرق الذهب او  
كبريتات الكينين لانها تنبه الرحم

وقد يحدث ان يكون الجنين ميتاً فيعرف ذلك من تنانة  
سيال الامنيوس ومن برودة القسم الذي اندفع منه وعدم حركته  
تريد الامر ايضاحاً. على انه يكون احياناً بحالة الاغماء ففي هكذا  
حالة وقبل ان تقطع حبل سرتيه ينفخ فيه وينفخ في ماء كثير

الحقنة وعندما يبدي حراكاً ينشف ويلثم الضرع  
وقد يعقب الوضع مغص خفيف يزول تدريجياً مع رجوع  
الرحم الى حالتها الاصلية. ولا يتحقق هل بقي داخل الرحم قسم  
من المشيمة



### (٢٦٢) في تخليص المشيمة

المشيمة والاعشية التي تبقى بعد الوضع تسمى بالخلاص  
واندفاعها اي خروجها يسمى بالتخليص وهو يعقب الوضع طبيعياً  
على انه يحدث احياناً انها تمكث في الرحم واربعاً بقيت هناك من ١٠  
الى ١٢ يوماً ويتسبب عن ذلك مغص وفحة وقلق واحياناً يظهر  
من الحيا قسم من الاعشية وقد يسيل من المهبل سيال تن  
وينشف الدم وتهزل الانثى وتموت

العلاج: ينتظر ٨ ايام فلربما حصل التخليص الطبيعي هذا  
اذا كانت البنية جيدة والأفستعان على التخليص باليد وذلك  
بان يمسك الحبل باليد اليمنى ويكون محل المسك قريباً للحيا ما  
امكن ثم تمد الاصابع من اليد اليسرى في المهبل الى فتحة الرحم  
وترفع المشيمة واليد الاخرى تجذبها برفق الى الخارج تعمل هذه العملية

إذا كانت الاغشية قليلة الالتصاق ولا تجمع الاجزاء المنفصلة  
وتربط وتترك مدلاة الى خارج الحيا وذلك ليبقى عنق الرحم مفتوحاً  
وقد اشاروا باعطاء المركب الاتي

درهم

٥

كربونات البوتاس

١٠

ورق الابل ابي الدفران

١٥٠

ماء

اغل الماء وصبه فوق الورق والكربونات واسقه فانثراً وان  
لم تحصل نتيجة فاعد الجرعة بعد ٦ ساعات او اعط خمس الجرعة  
الاتية كل ٦ ساعات ايضاً

درهم

١٠٠

زيت الغار

٦٥

شمر

١٥٠

بيكربونات الصودا

١٥٠٠

ماء

اغل الماء وصبه فوق زيت الغار والشمر ثم اصف  
الكربونات

وبعد نزول الخلاص تمشي الانثى بعض دقائق ثم تربط

وتسقى مديدة لي طحين الشعير بالماء ونعل الحنن بمجلول الحامض  
الكربوليك اذا كان يسيل من الحيا سيال تنن ترافقه حي

### (٢٦٤) كولابوس البقر

حي خطرة جداً خاصة بانثى البقر بعد الوضع وأكثر حدوثها  
للانات الجيدة البنية والمعلوفة جيداً

واسباب هذه العلة غامضة وقد نسبوها للامتلا الدموي  
والراحة المستطيلة او من التعرض للبرد

اعراضها: يحدث فجأة بعد ٢٤ او ٤٨ ساعة من الوضع  
فشعريرة وقلق وفقد شهوة وقد تسقط الانثى الى الارض ولا تقدر  
ان تقوم مع انها تحاول ذلك كثيراً

وقد تختلف درجة حرارة الجسم على انها تكون غالباً واطئة  
واحياناً تنهض المريضة بعد ٢ او ٤ ايام من ربوضها وتعاودها  
امارات الصحة واخرى تشند الاعراض المقدم ذكرها ويسرع  
النبض ويتطبل البطن ويبطل انتظام التنفس ويبرد الجسم وتموت  
المصابة في اليوم الثاني الى الخامس من اصابتها

العلاج : للوقاية من حدوث هذا الداء الخبيث يعني بامر  
الانثى فتغلي التي بالاصاف المذكورة مدة حملها باغذية ملائمة  
سهلة الهضم وتروض وتوفي من البرد  
وان حدث الداء فالنصد والمساهل القوية مذابة في  
منقوع ورق النعناع او اليابونج . ويعطى من الكافور لولو الاثر كبريتيك  
او حشيشة القارلينا او المحتليت ويفرك الصلب بزيت التريبتينا  
او بالمروخ النشادري او بوضع عليه خردل . وان كان تطبل  
البطن كيا تبزل الخاصرة كما اشرنا الى ذلك في الكلام عن النفخة  
او التطبل



### (٢٤٧) الأكليسيا . اي التشنجات عقب الوضع

التشنجات عقب الولادة تعود نوباً وقلما تحدث هذه العلة  
لغير الكلاب . واسبابها مجهولة  
اعراضها : كابة . سخونة الانف . سرعة التنفس . عدم مقدرة  
المصابة على الوقوف . تشنجات تعاود نوباً . صرير الاسنان وكثرزها  
علاجها : النصد والمساهل . اعطاء ملعقة كل ربع ساعة

من مزيج ٢٢ درهماً من شربيط بسيط بعشرين قطرة كلوروفورم  
الحقن باليد من ممدوداً بماه

— — —

(٥٦٥) تعسر الوضع الحاصل من اوضاع الجنين في الرحم

لقد رأينا في الشكل ١٥ كيف ان راس الجنين يكون  
مدوداً على القوائم الامامية فهذه هي الحالة الطبيعية لوضعه عند  
اندفاعه من الرحم غير ان هذا الوضع يختلف احياناً لاسباب  
مجهولة فقد تلتوي العنق الى الوراء او ان الجذع ياتي احياناً بنوع  
اخر غير الطبيعي بالراس فيكون الجنين مستعرضاً فلا يمكن اندفاعه  
او ان يكون الجنين مقلوباً اي تكون اليته الموجهة الى الامام او  
تكون يده الواحدة مدودة تحت العنق والاخرى مطوية بنوع  
يمنع خروجه. ولا بد اذ ذاك من مساعدة الام والافتمت لاحالة  
اذا لم تساعد الطبيعة ففي هكذا حالة يبادر الى تحويل القسم  
المتقدم من الجنين بخلاف العادة الطبيعية ولذلك تدهن اليد بمادة  
دهنية وتدخل في الحياء ويفحص العامل بالجنس عن هيئة الحبي  
فان كان الراس زايفاً الى جهة ما تدخل الاصابع في فم الجنين  
ويجذب او يجلس وان كان قسم من الجنين خارجاً عن عنق الرحم



يدفع الى الداخل وتدخل اليد الى داخل الرحم فان كان العنق  
 مشتبهاً بحيث لا تطول اليد الراس يدخل خيطاً متيناً في ثنية العنق  
 وتجذب جذباً خفيفاً ويرفع بطن الام فيقرب الراس فتقبضه اليد من  
 فيه وتجلسه وان كان الجنين ميتاً يقطع الراس والقوائم ويجذب الجسم  
 بشناكل وهكذا تفعل اليد او الرجل وان كان الجنين مقلوباً تماماً  
 اي اليته الى الامام يدفع الى قعر الرحم ويقلب باليد وتجذب يداً  
 ورأسه الى الامام

ولا يخفى ما بذلك احياناً من الصعوبة وعدم امكان اجراء  
 العمل خصوصاً لمن ليس له خبرة في تركيب الاعضاء الانثوية وفي  
 اغلب الاحيان يلجئ الحمال الى استعمال عملية جراحية تتعذر  
 معرفتها على جاهل في التشرح والجراحة فاستدعاء طبيب في  
 هكذا احوال واجب ضروري لمن عزت عليه دابته



الى هنا انتهى الكلام عن الامراض واسبابها واعراضها وفي  
 الباب الاتي نرشد القاري الى مقادير الادوية الممكن اعطاؤها  
 لكل من انواع الحيوان والى التراكيب المعتمد عليها في الطب  
 البيطري وكيفية تركيبها والعلل التي تعطي فيها

## الباب الخامس

الاسوية ومفاعيلها ومقاديرها وتراكيبها

ابهل . دفران

شجيرة لون ورقها اخضر يشبه ورق السرو والمستعمل منها  
الاوراق وهي تحوي على زيت طيار وبه فعلها . وقد تستعمل  
الاوراق مسحوقة او منقوعة بالماء والزيت مذاباً بالسيرتو  
خواصة : من الظاهر ليجأ او مروخاً بالزيت بحبر الجلد  
ومن الداخل يهيج الامعاء ويزيد مفرزات الرحم  
المقادير

من ٥ الى ٢٠ در	للحيوانات الكبيرة
" ٢ " ١ "	للشجرة الصغيرة والخنازير
" ٥ قححات الى ٤٠ قم	للكلاب

مرهم الابهل

مسحوق اوراق الدفران الجافة ٤ در  
شم او مرهم بسيط ٨ "

يستعمل هذا المرهم دهناً على الاورام غير المؤلمة

## ارنكا

نبات ينبت في جبال اوروبا والمستعمل منه الازهار منقوعة  
 بالماء او الصبغة (الازهار مهضومة بالسيرتو) شراباً وفرگاً  
 خواصة: منبه قوي يقبى<sup>٢</sup> احياناً يستعمل في العلل الضعيفة  
 العفنة ومن الظاهر على هيئة صبغة ضامداً للرضات ونحوها  
 المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٢ الى ٧ در
" المتوسطة "	" ٠٢ " ١ "
" الصغيرة "	" ٥ " ١٠ قحاحات

## صبغة الارنكا

زهور الارنكا ١٥ درهماً تنقع ٨ ايام في ١٢٥ درهم سيرتو  
 ثم تعصرون تصفى وتحتفظ

## افستين

وتعرف العامة بالشيبة وهونبات ينبت في المحلات الوعرة  
 والاجام. طعمه مر. رائحته عطرية. والمستعمل منه القهم

والأوراق طرية كانت أم يابسة وقد يعطى مسحوقاً مع العليق أو  
مجهولاً بالعسل أو منقوعاً بالماء

خواصه : مقوٍ منبه طارد للدود . يستعمل في العلل  
التيفويدية وغسولاً في القروح الرديئة . وقد تظهر مرارته في الحليب  
ولذلك لا يعطى للحلابات

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ١٥ الى ٣٠ در
" المتوسطة "	" ١٠ " ٥ "
" الصغيرة "	" ٢ " ١ "



### أفيون

هو عصير رؤوس الخشخاش . ويحضر بشق غلاف راس  
الخشخاش قبل نضجه فيرتشع عصير لبني يحف بتعرضه للهواء وهو  
يحنوي حسب جودته ومحل وروده على مورفين وكودئين  
ونركوتين و خشخاشين ومواد آخر شبيهة بالقلويات وأكثرها  
مخدرة وبعضها منبهة فقط

ويستعمل الافيون من الداخل مسحوقاً او مذاباً او معجوناً  
ومن الظاهر ضماً او ليجاً

خواصة: ان عمل ليجاً من الظاهر يسكن الالم وان اعطي  
من الداخل ينوم ويخفف الالم والاعتقال. وكثيراً ما يعطى في  
التيتنوس والخوريا وجميع التهيجات العصبية

### المقادير

لذوات الحافر	من ٢ الى ٢ در
للجيرة الكبيرة	" ٢ " ٥ "
" الصغيرة	" ١ " ٤ "
للخنازير والكلاب	" ١ الى ٢٠ ق م

### صبغة الافيون

خلاصة الافيون	١٠ قحبات
سبرنو	٤٠ در

ذوب واحفظ

### لودنم. سحر الافيون

افيون جيد	٢١ در
زعفران	" ١٠
قرقة	" ١
قرنفل	" ١
نيمد حلو	" ١٥٠

رض المواد وإنتعاه ا يوماً في الخمر ثم اعصرها وشرح السبال  
اي صفه من لباد مثلاً واحفظه الى وقت الحاجة. فكل ٢٠ اقطرة  
من هذا النبيذ المعروف بلودنم سيدنهام تفعل فعل قححة واحدة  
من الافيون النقي

### مرهم الافيون

٢ در	محموق الافيون
" ٨	مرهم بسيط
	امزج جيداً

### مشروب من صبغة الافيون

١ در	صبغة الافيون
" ١٠٠	ماء العادة

يعطى دفعة واحدة لتوقيف ذرب المهارى

### مشروب للغنم والكلاب

٢٠ ق	خلاصة الافيون
٥ رؤوس	رؤوس الخنثاش
٧ در	ارز
" ١٥٠	ماء العادة

اغل المواد بالماء وصف. يعطى جرعة واحدة في الدوسنطاريا

### مشروب ضد المغص

٦ در	من اللودنم اي خمر الافيون
------	---------------------------

اثر كبريتيك  
مفروع الشاي بارداً  
امزج واعطِ دفعة واحدة

مشروب ضد التشنج

صبغة الافيون ٢٠ در  
اثر كبريتيك ١٠  
سيدنو ٢٠٠  
زيت النعناع ١

امزج . يعطى النصف كل ست ساعات

حبوب مسكنة

افيون ٢ در  
كافور ٢  
محقوق الانيمون ٦

تمزج الاجزاء وتعجن بالعسل وتعمل حبة واحدة تعطى في  
علل الصدر الزكامية في الخيل

ايكاكوانا . عرق الذهب

جفرتبات ينبت في البرازيل ولا يستعمل الامن الداخل  
خواصه: مقبى ويهيج انقباضات الرحم ولذلك يقوم مقام

المجودل القرني. وكثيراً ما يوصف في مرض الكلاب وفي الاسهال  
والدوسنطاريا وفي خمول الرحم او التزف بعد الوضع وهو يجرى  
الاجترار

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٢ الى ٥ در
" المتوسطة	" ١ " ٢ "
" الصغيرة	" ٦ " ٢٠ ق م

### حبوب ضد السعال

محقوق عرق الذهب	٢ در
" الكافور	" ٥
" جنرال السوس	" ١٠

تخلط الاجزاء وتعجن بالعسل وتعمل حبتين تعطى منها

واحدة الصبح

### محقوق ضد ذرب الكلاب

محقوق عرق الذهب	١ در
" الراوند	" ٢
" الافيون	" ١٠ ق م


تخلط الاجزاء وتقسّم اثني عشر قسمًا يعطى منها من واحد الى

اربعة يومياً



## اثيرنتريك او ازوتيك

هو سيال كثير النفع عندما يبرد جسم الحيوان ويرتفع  
ويتغطى بعرق بارد. يعطى منه ١٠ الى ١٥ ادرها فيقوي النبض  
وينعش المصاب ويرجع حرارة الجسم بسرعة غريبة



## اثيركبريتيك

هو سيال ضاف طيار مقبول الرائحة وطب الطعم ثم لزاع  
قابل الاشتعال جداً. يحضر من السيرون والحماض الكبريتيك  
استفظاراً يستعمل من الباطن والظاهر وتنشيقاً  
خواصة: منه القناة الهضمية ثم مخدر وان نشق يرمي في  
سبات ويبتل الحس وكثيراً ما يستعمل في المحروق ولتسكين الالم  
من الظاهر ضماداً ويعطى من الداخل لتسكين المغص المرافق  
باتفاخ البطن

## المقادير

للحيوانات الكبيرة	من	١٠	الى	٤٠	در
" المتوسطة "	"	٢	"	٤	"

” الصغيرة ” ” ” ” ”

مشروب طارد الدود

ايثر من ٢٠ نقطة الى مئة. زيت خروع ١٠ دراهم تمزج  
وتعطى دفعة واحدة. للكلب

### أكسيد الحديد

مسحوق احمر لا يذوب في الماء. يستعمل معجوناً ومسحوقاً  
محدوداً بقاء. وهو مقوِّ قابض  
المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٢٠ الى ٣٠	در
” المتوسطة ”	” ٥ ” ١٠ ”	”
” الصغيرة ”	” ١ ” ٢ ”	”

### أكسيد التوتيا. مكلس التوتيا. أكسيد الخارصين

مسحوق ابيض لا يذوب في الماء عديم الطعم والرائحة. يستعمل  
من الظاهر ذروراً على الجروح فينشها ومن الباطن حبوباً او  
معجوناً او مذروراً على العلف

خواصة: قابض . مقي . مضاد التشنج والسعال العصبي

المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٥ الى ١٠ در
" المتوسطة "	" ١٠ " ٢ "
" الصغيرة "	" ٢ " ١ "

## بابونج . فحوان

هو زهر نبات معروف يحوي على زيت طيار منه خواصة .  
يستعمل منقوعاً بالماء

خواصة: منه مقو طارد الريح مانع الفساد . كثيراً ما يوصف  
لتففيه المعدة للمضم وزيت دهنه للتخليل

المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٥ الى ١٠ در
" المتوسطة "	" ١٠ " ٢ "
" الصغيرة "	" ٢ " ١ "

## زيت البابونج

زهر البابونج المجافة ١٦ در

زيت زعفران ١٢٥ "

تخل على نار خفيفة ثم صف واحفظ للحاجة

## منقوع البابونج

٢ در

زهر البابونج

" ١٥٠

ماء غالـ

صب الماء فوق الزهر واعطِ فاترا



## برومور البوتاسيوم

ملح ابيض مبلور يذوب في الماء بسهولة يعطى من الباطن  
 مذاقا بياها ويستعمل من الظاهر دهونا  
 خواصة: منبه. منوع. مسكن المجهوع العصبي ولا سيما النخاع  
 الشوكي واكثر استعماله في الصرع والنحوريا والشبق الحيواني  
 والتيتنوس

## المقادير

من ٢ الى ٥ در	للحيوانات الكبيرة
" ١ " "	" المتوسطة "
٢٠ " ٥ " ق	" الصغيرة "

## مرهم برومور البوتاسيوم

٢ در

برومور البوتاسيوم

" ١٢

شمختر

امزج: مسكن. محلل

## بلاذونا

نبات ينبت في أوروبا المستعمل منه الجذور والاوراق وهو  
 مجنوي على مادة سامة جداً تسمى انرويين بها قائم فعله . وهو  
 يعطى مسخوفاً ومعجوناً ومن الظاهر لخباً وتها يلاً  
 خواصة : يمدد العضلات الحلقية وخصوصاً حدة العين  
 وبكمية اوفر يفعل بالتخاع الشوكي . واكثر استعماله لتمدد عواصر  
 العين والمثانة والاسـت . وهو مضاد للذرب والسعال العصبي  
 والخوريا والصرع والعلل التيفويدية

### المقادير

للحيوانات الكبيرة من المسخوق	من ٤ الى ٨ در
للصغيرة	" " ١ " ٢ "
للخنازير	" " ٢ " ٤ "
للكلاب	" " - " ٤ "

### مرهم البلاذونا

من خلاصة البلاذونا ١ در  
 من ثمغ المختزير او المرهم البسيط ٤ "  
 امزج : وهذا المرهم محلل الاورام مسكن الالم

### صبغة البلادونا

اوراق البلادونا مرضوضة ١ در

سبرتو ٤ "

اتقع ٨ ايام وصف . تستعمل ضماداً للنسكين



### بلسان

شجيرة كثيرة في بلادنا المستعمل منها الازهار من الباطن  
منقوعة ومن الظاهر ليجاً وغسولاً  
خواصة: محلل ويوصف في الحمرة والاحتقانات ويجعل  
حمالاً في القطرات



### تبغ . دخان

نبات معروف في كل الاقطار يجنوي على مادة تسمى تبغين  
حريفة جداً وعليها مدار فعله والمستعمل منه الاوراق . ويعطى  
التبغ من الداخل منقوعاً بماء ومن الظاهر سعوطاً وهو مهيج وان  
زادت كميته فمقيئ سام قتال . وعلامات التسمم به تشنج ثم فقد  
الحس وتمدد الحديقة وشلل النصف المؤخر يسبق الموت وهو

يستعمل في الدوار ولطرد الديدان ومن الظاهر في امراض الجلد  
ولقتل الهوام التي تربو على الجلد

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ١٠ الى ٣٠ د
للجئرة الصغيرة	" ٢ " ٥ "
للخنازير	" ٤ " ١ "
للكلاب	" ٤ " ٢ "

### حقنة التبغ

تبغ	٤٠ در
ماء	" ٤٠٠ "

اغل الماء وصبه فوق التبغ ودعه ليبرد . يعطى على دفعتين  
او ثلاث

### غسل التبغ

تبغ	٤٠ در
ماء	" ٤٠٠ "

انفع التبغ في الماء الغالي الى ان يبرد . يستعمل في امراض  
الجلد ولقتل الفراء

### تربتينا

مادة جامدة لرجة نسيل من عدة اشجار من الفصيلة المخروطية

وموادها النعالة زيت طيار ورائنج . وتستعمل الترينثينا من  
الداخل مخلولة بماء او معجوناً ومن الظاهر تدخل في عدة  
مراهم لاجحة الجروح

خواصها: من الظاهر تستعمل لزوقاً لتحسين القروح المتقيحة  
ومن انداخل تطف الاغشية المخاطية خصوصاً اغشية المجاري  
البولية والاعضاء التناسلية وفي السيلانات المختلفة

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ١٠ الى ٢٠ در
" المتوسطة "	" ١ " ٤ "
" الصغيرة "	" ٤ " ١ "

### مشروب مدر البول

ترينثينا ٢٠ در  
مح اي صفار البيض ٣ عدد  
اخفق الكل في افة ونصف مغلى بزر الكتان . يعطى ثلاث  
او اربع دفعات بالتهار

### معجون مدر البول

ترينثينا	٥ در
محقق ورق الدفران	" ٥
محقق جذر السوس	" ٥



اخلط المواد واجعلها بالعسل . يعطى دفعة واحدة في الاستمقاء والاينيا وما شاكل

مرهم التريبتينا

تريبتينا ٢٠ درهم تخفق بصغار ثلاث بيضات ثم يضاف  
وليل من الزيت ليصير المزيج بقوام مرهم نصف مائع



جلبا

جذر نبات مسهل ينبت في المكسيك . يعطى من الباطن  
مشروباً ومججناً وقلياً يسهل الحيوانات وفعله غير ثابت  
المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٢٠ الى ٣٥ در
" المتوسطة "	" ١٠ " ٢٠ "
" الصغيرة "	" ٢ " ٦ "



جليسيرين

هو سبال شرابي القوام ايض سكري الطعم يذوب في الماء  
يستعمل من الباطن وخصوصاً من الظاهر

خواصة: يطري الجلد والاقسام التي فيها دمان ويلطف  
السطوح الملتبهة. وقد يخلط مع جواهر اخرى  
جليسرين يودي

ا در

صبغة اليود

" ٤

جليسرين

امزج: يستعمل حفتا في الزكام الاذني للكلاب. او دهنا على  
الاورام والقروح الموصوف فيها اليود

## جودار قرني

عبارة عن نبات فطري يتولد على القمح وغيره من الفصيلة  
النبيلية على هيئة حبوب مغنولة قليلاً سوداء طول السنبلة من  
ثلاثي قيراط الى قيراط وعرضها بالنسبة الى ذلك. مكسرها ابيض  
ورائحتها خاصة بها. ويعطى الجودار مسحوقاً وبلوفاً ومعجوناً ومشروباً  
خواصة: يفعل على جدران او عية الرحم والياقن العضلية  
ولاسيما وقت الحمل والطلق فيحدث انقباض العضو ودفع  
متضمناته ووجع كيرة يحدث ما يسمونه ارجوتسم وهو يعرف  
باعراض تشنجية ونوعاً من الغنغرينا. ويعطى في وقت الوضع

التعسر من جرى خمول الرحم ولقطع الانتفاة الرحمية والكلوية

### المقادير

للفرس والبقر	من ٥ الى ١٠	در
للجيرة الصغيرة والخنازير	" ١ " ٢	"
الكلبة والهريرة	" ٠٤ " ١	"

مشروب معين على الوضع

جودار محقوق	٥	در
مقوع البايونج	١٥٠	"
يعطى فاتراً		

### جنطيانا

جزر نبات يثبت في بعض جمال اوروبا. يحتوي على مادة  
مرة عليها نار فعليه. يعطى من الباطن مسحوقاً وبلوغاً ومججاً  
ومشروباً

خواصه: مقوٍ مرئ يستعمل في اعلل الضعفية

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٢٠ الى ٥٠	در
-------------------	--------------	----

" المتوسطة " ٥ " ٢ "

" الصغيرة " ١ " ٢ "

صبغة الجنطيانا

جذر جنطيانا مريضاً ٨ در

سيرنو ٢ "

انقع ٨ ايام وصف

يعطى منه من ٢ الى ١٠ دراهم للحيوانات الصغيرة و ٢٠ درهماً  
واكثر للكبيرة

خمر الجنطيانا

صبغة الجنطيانا ٢٠ در

خمر ٢٠٠ "

امزج . يعطى كالصبغة اعلاه

—•—

جوز القىء. ( كشلة بالدراج )

ثم شجرة تنبت في الهند الشرقية والمستعمل منها بزرها وهو  
على هيئة اقراص محدبة مقعرة قطرها نصف فيراط الى فيراط وهي  
صلبة لونها سنجابي مصفر طعنها مر جداً . تحوي على مادتين  
سامتين جداً الاستركين والبروسين وعليها مدار الفعل . ويعطى

جوز النقي مسحوقاً ومن الظاهر صبغة للفرك  
 خواصة: بجرعات صغيرة منه اعضاء الهضم وجرعات كبيرة  
 يحدث اخنلاج العضلات يتبعه تيبس تيتنوسي وموت من الاسفكسيا  
 اي الاختناق لیبوسة الخجيرة. وهو يستعمل في الضعف العام  
 وضمور بعض الاجزاء

## المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ١ الى ٥	در
" المتوسطة	" ١٠ "	"
للخنازير	" ٢٠ "	"
للكلاب	" ٢ "	ق م

## مسحوق مقوي

من الحامض الزرنيخوس (طعم الفار الابيض)	٢٠	ق م
من مسحوق جوز النقي	٨٠	"

يعطى هذا المقدار مذكوراً على العلف ١٥ يوماً في مدة النقه  
 المستطيل

## صبغة جوز النقي

مسحوق جوز النقي	٨	در
سيرونو	٤٠	"

انقع ثمانية ايام وصف

## جوز العادة

الجوز شجر معروف والمستعمل منه أوراقه وقشر ثمره ويعطى  
منقوعاً وغلياً ويعمل من الظاهر ليجاً. وهو قابض مقو



### حامض تنيك . تينين

هو مسحوق ابيض مصفر يذوب في الكحول وفي الماء  
يعطى من الداخل مثلاً او معجوناً ومن الظاهر يعمل مرهماً  
وحقناً

خواصه : هو اشد القوابض فعلاً . موقف الانزفة مانع  
الفساد قاطع السيالات المختلفة

#### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٢ الى ٥	در
" المتوسطة	" ١ " ٢	"
" الصغيرة	من قمحيتين الى ٥	"

معجون لقطع بول الدم

١٠ در

تينين

محموق الجبطينا ٢٠ "

طحين شعيركية كافية

امزج المواد واعجنها بماء واعط الربع كل ساعتين في البول  
اللبموي والذروب والبول الحادث عن ضعف

مرهم التينين

حامض تيك ٢ در

شم او مرهم بسيط ١٠ "

امزج. تدهن به الفروح الدامية والمترهلة



## حامض خليك . روح النخل

سيال حامض قابل التبلور يستقطر من الخشب وهو عديم  
اللون رائحته خاصة . طيار اذا تبخر لا ينفث منه شيء . وهو لا  
يستعمل الا من الخارج كاويا للزوائد التي تنمو على الجلد كالشآليل  
وما اشبه



حامض زرنخوس . زرنج . رنج . طعم الفار الابيض

يكون في المنجر على هيئة اقراص او قطع او مسحوق ابيض

تبلل سلم جلفاً يدوب في ١٠٠ جزء من الماء للبارد والخل من ذلك في الماء الغالي فاذا برد الماء يتبلور. اذا خر على النار بمصاعد رائحة بصلية. وهو يستعمل مغاطس في الامراض الجلدية ومن الداخل مسحوقاً ومحلولاً كما في سيال فوفلر. واعلم ان فعلة محلولاً يكون عشرة اضعاف مما لو اعطي مسحوقاً فتنبه

خواصة: مقوٍ ومنوع ومضاد الامراض الجلدية ومهيج القناة الهضمية واذا اعطي بجرعة كبيرة بسم فيميت. وهو كاي ومحلل الاورام الغدية

### المقادير من المسحوق

للحيوانات الكبيرة	من ٢٠ الى ٦٠ قمر يومياً
للحيوانات الصغيرة	٢٠ " ٤٠ "
للخنازير	٣ " ٥ "

### المقادير من سيال فوفلر

للحيوانات الكبيرة	من ١٥ الى ٢٠ در
للحيوانات الصغيرة	٢ " ٦ "
للحيوانات الصغيرة	٢٠ " ٤٠ قطرة

### المغطس الزرنجني

مسحوق الحامض الزرنجوس	٢٠٠ در
كبريتات البوتيا	١٥٠٠ "
ماء العادة	٨٠ اقة



تغطس فيه الحيوانات الصغيرة كالغنم والمعزى المصابة  
بأمراض جلدية وخصوصاً الجرب المزمن ومدة ابتداء الحيوان فيه  
٥ دقائق

### مسحوق الزرنج الكاوي

حامض زرنفوس ٢ در

زنجفر ٢٠ "

دم الاخوين - "

تخلط الاجزاء جيداً يستعمل ذروراً وهو كاوي

### مسحوق نافع لماء الساقين

حامض زرنفوس ٤٠ قم

قلقونة ٥ در

زنجفر ١٠ "

تخلط الاجزاء مسحوقة. يذر منه بتأنٍ لانه يحدث خشك ريشة

عميقة

### سيال او محلول فوقلر

حامض زرنفوس ١٠٠ قم

كربونات البوتاس ١٠٠ "

ماء المادة ١٥٠ در

اغل الاملاح في الماء الى ان تذوب ثم عوض عن الماء  
الذي تبخر واحفظ لوقت الحاجة

## حامض ساليسيليك

هو مسحوق ابيض عديم اللون والرائحة حامض الطعم قليلاً  
فلما يذوب في الماء البارد بل يذوب أكثر في الماء الساخن  
خواصه : مانع الفساد والاختار وهو يقوم مقام الحامض  
الكربوليك من الداخل ويفضل عليه نظراً لعدم خاصته الكاوية



## حامض كبريتيك . زيت الزاج

سيال يشبه الزيت بقوامه عديم اللون والرائحة طعنه  
حامض جداً اذا خلط بالماء احدث حرارة شديدة  
خواصه : من الظاهر هو كاو شديد يفسد جميع الانسجة  
التي يلامسها واذا خفف بماء واخذ من الباطن فهو مبرد ومقو  
وقابض وكثيراً ما يستعمل من الظاهر لكي القروح والجروح  
الرديفة والتحليل الانتفاخ الذي يحصل في مفاصل البقر ومن  
الداخل مخففاً في العال القلاعية والغنغرينية والدوسنطاريا  
وبول الدم والانتزفة الدموية العرضية .

مشروب مبرد

من الحامض الكبريتيك ٢ در  
من ماء العادة ٤٠٠

امزج واعط كل ساعتين النصف

سيال كاو

زيت التريثينا ١٢ در  
حامض كبريتيك ٢

امزج . يستعمل في مرض البنان والمرض الضفدعي وفي  
تعفن صحن الحافر

الكاوي الاسود

هاباب المداخن ٢٠ درهم . تعجن بما يكفي من الحامض  
الكبريتيك لتصير بقوام عجين رخو . يستعمل لكي القروح الردية

حامض كربونيك

ويقال له ايضاً الحامض الفنيك وفينول . هو حامض  
يستخرج من القطران الحجري بالاستقطار والتكبر . ويرد على هيئة  
بلورات ابرية عديمة اللون او محمرة قليلاً والموجود في النجر منه

سيال زيتي القوام احمر او مسود اللون رائحة قوية تشبه رائحة الكرياسوت اي روح القطران. قليل الذوبان في الماء يذوب بسهولة في السيرتو

خواصة: كاو مضاد الفساد مصلح الروائح وقابض. يستعمل كاوياً للقروح الردية وحنثاً في التواسير وغسولاً في الجرب وامراض الجلد القوباوية. ومن الباطن في الامراض الغنغرينية والذرب

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٢ الى ٥ در
" المتوسطة	" ١٠ " ٢٠
" الصغيرة	" ٥ " ٢٠ ق

### ماء الحامض الكربوليك

حامض كربوليك	٢ در
ماء العادة	" ٢٠٠

امزج

### مروخ الحامض الكربوليك

حامض كربوليك	٢ در
زيت ترينثينا	" ٤
زيت زيتون	" ٤

امزج. دهناً في امراض الجلد

## مرهم الحامض الكربوليك

حامض كربوليك ١ در ٢٠  
شم او مرهم بسيط ١٠ "  
امزج . كالسابق

## قطران مكربل

حامض كربوليك ٢ در  
قطران ٢٠ "  
امزج . نافع في الامراض الجلدية القوباوية



## حامض نتريك اوازوتيك

ويعرف بماء الفضة وبروح ملح البارود وهو سيال مصفر  
رائحة حريفة شديدة وطعمه حامض جداً  
خواصه: من الخارج كاو شديد يستعمل لاصلاح حالة  
الفروح في مرض اليبان والمرض الضفدي والثآليل ومن  
الباطن مدوداً بالماء بنسبة ١٠٠ الى ١ في البول الدموي واليرقان  
والحمى الفلالية

## روح ملح البارود الحلو

٨ در

حامض نترك

٢٤ "

سيترتو

امزج واحفظ . يعطى منه ١٠ دراهم في ماء مدراً البول

## مشروب ضد البول الدموي

١٠ در

روح ملح البارود الحلو

١٣٠٠ "

مغلى الشعير

يعطى ثلاث دفعات بمدة النهار

— ١٠٠٠ —

## حامض هيدروكلوريك او مورياتيك

ويقال الحامض الكلور هيدريك وروح الملح هو سيال عديم اللون او اصفر قليلاً رائحته خائفة طعمه حامض جداً يطلق دخاناً ابيض كثيفاً في الهواء

خواصه: من الخارج كاو شديد يستعمل لكي القروح الردية والقلاعية والدفثيرية واذا خفف بالماء واعطي من الداخل يقوي ويبرد ويقبض . يستعمل في عسر الهضم المزمن والعلل التيفويدية والجحيرة

مشروب ضد سوء الهضم المزمن في المجتررة

روح الملح	٥ در
سينو	٢٠ "
ماء	١٢٠٠ "

تمزج ويعطى بمدة النهار

مضغه حامضة

قصعين	٢٠ در
روح الملح	٥ "
طحين شعير	٢٠ "
عمل	٨٠ "
ماء	٢٠٠ "

انفع القصعين في الماء غالباً ثم صفّ واضف المواد الباقية  
يبل به فم الحيوان عدة مرات في النهار وذلك في الفلاع او ثقرح  
اللسان



### حب الملوك

حب نبات ينبت في الهند الشرقية بجنوبي على زيت  
يستخرج منه عصراً. وهو زيت لزج قليلاً لونه اصفر فاتح او مسمر  
قليلاً رائحته غير مقبولة وطعمه حريف

خواصة: زيت حب الملوک مهيج ومسهل حريف ومن  
الخارج ينقط القسم الذي يدهن به

المقادير من الزيت

للجذرة الکبيرة من ٦٠ الى ٨٠ قطرة مزوجة بقليل من زيت الخروع

" " " " " " ٦٠ " ٤٠ " لذوات الحافر

" " " " " " ٢٠ " ١٠ " للجبنة الصغيرة

" " " " " " ١٠ " ٥ " لاکلة اللحم كالکلاب

دهون منقط

١ در من زيت حب الملوک

" ٢٠ من السيرتو

" ٢٠ من الاثر کبريتک

امزج . يستعمل دهناً للتنظيف

حشيشة الدينار

نبات من الفصيلة الانجریة المستعمل منه الازهار والسنابل

خواصة: مقوٍ مرٍ نافع في النقرس والعلل المعدية . يعطى

منقوعاً باماء

المقادير

للحيوانات الکبيرة من ١٠ الى ٢٠ در



١	للحيوانات المتوسطة	من ٢	" ٥	در
"	الصغيرة	" ١	" ٢	"

## حلتيت

الحلتيت صمغ راتنجي يرشح من نبات يسمى عرق الانجلمان ينبت في العجم وأفغانستان وسوريا . وهو يذوب في السيرون المصحح ويستحب مع الماء

خواصة : منه الفناة الهضمية ومضاد التشنج وطارد الدود يعطى من الباطن مستحباً ومجوعاً وبلوغاً ومن الظاهر حقناً

## المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ١٠ الى ٢٠	در
" المتوسطة	" ٢ " ٥	"
" الصغيرة	" < " ١	"

## مشروب مضاد التشنج

كافور	٥	در
حلتيت	٥	"
ماء	١٥٠	"

امزج . يعطى دفعة واحدة او دفعتين

## خردل

بزر نبات من الفصيلة الصليبية وهو نوعان ابيض واسود  
والبزر الاحسن هو المستعمل في الطب البيطري وهو يحنوي  
على زيت عليه مدار فعلة

خواصة: يستعمل الخردل ليجأ لتحجير الجلد وللتحويل في  
اكثر الامراض الباطنة ويجب جبل الخردل المحقوق بماء بارد  
يعمل اللج لا بماء سخن والاحسن ان يجبل بخل



## خشخاش

رووس الخشخاش ثمر نبات ينبت في سوريا ومصر وبزوع  
في كل اقطار المسكونة . ومنها الافيون الذي عليه يقوم مدار  
فعلها

خواصة: مسكن يستعمل في امراض العين والاذن وفي علل  
الصدر والامعاء وغسولا وحقتا من الظاهر

## خل

الخل سيال حامض يحضر من فضلة العنب والخمر  
 بالاختيار الخلي واجوده ما يحضر من الخمر  
 خواصه: اذا فرك به سخناً فهو محمر قليلاً ومحلل ومن الباطن  
 مبرد وقد يعمل غسولاً وحقناً او يمايل للحيوانات الحائلة  
 عسل الخل

٣٠ در

خل

" ٦٠

عسل

امزج واغل حتى يصير بقوام الشراب

خل الكافور

١٠ در

كافور محقوق

" ١٠٠

خل قوي

امزج . يفرك به للتخليل

## خلّات النحاس . زنجار

محقوق مؤلف من بلورات صغيرة لونه ازرقي منضر

خواصه: كاور قابض يستعمل من الخارج ذروراً ومحلولاً  
في الشقوق والجراح الناسورية والمنفصليّة وأمراض الحافر

### المرهم المصري

عسل	٢١٢ در
زنجار	" ١٥٥
خل	" ١٥٥

اخلط واغل في وعاء واسع . حرك المرهم قبل استعماله

### عجينة لمرض البياض

خلات النحاس	٣٠ در
طحين شعير	" ٨
ترينينا	" ٢٥

امزج جيداً . يوضع على المحل المصاب

### مرهم مجفف

خلات النحاس	٣٠ در
شمع خنزير	" ١٢٠

يستعمل دهناً في مرض ماء الساقين

## خلات الرصاص . ملح الرصاص

ويقال سكر الرصاص وملح زحل . هو كتل بيضاء مؤلفة

من بلورات مشتبكة راتجة عطية وطعنة حلو خلي يذوب في الماء وهو سام ولذلك يحترس من ان تدهن به الاقسام التي يقدر الحيوان على لمسها لتلايم

خواصة : يستعمل من الظاهر للقبض والتجفيف محلولاً ومرهما خليط قابض

ملح الرصاص ٢ در

مح اي صفاريض " ٥

امزج . يستعمل قطوراً في زكام الاذن في الكلاب

مرهم قابض

خلات الرصاص ١ در

نريثينا " ٣

اخفق بصفاريضة واحدة

الماء الابيض . ماء جولارد

من ملح الرصاص ٦ در

من ماء المادة " ٣٠٠

من السيرتو " ٣٠

امزج . يستعمل ضماداً في الرضات والحروق وزيفان

المفاصل وتشقق الجلد . وان اضيف الى الماء المذكور درهان من

الحامض الكربوليك فلك الماء الابيض المكربل وهو اذ ذاك

اكبر فعلاً

## مرهم خلالات الرصاص

٢ در

خلالات الرصاص

١٠"

مرهم بسيط اوزينة

امزج جيداً . وهذا المرهم قابض مجفف



## خلالات النشادر

مبال عدم اللون يستعمل مشروباً في العلل الغنغرينية  
والاستسقاء وغسولاً في لسع الدبابات السامة

## المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٥٠ الى ٦٥	در
" المتوسطة	" ٨ " ١٥	"
" الصغيرة	" ٣ " ٥	"

## مشروب مانع الفساد

خشب الكينا مرضوضاً	٣٠	در
خلالات النشادر	٣٠	"
كافور	٢	"
اثير كبريتيك	٦	"
ماء المادة	٦٠٠	"

اغل الكينا بالماء وعندما يبرد اصف المواد الاخر . يعطى  
على دفعتين في مدة النهار

## خمر. نبيذ

الخمر سيال معروف وهو منه مقو وفعلة متوقف على كمية الكحول فيه . يعطى في العلل الضعفية ومن الظاهر يعمل ضماداً للجروح والقروح القديمة والجرعة منه من ١٠٠ الى ٣٠٠ درهم

## دكسترين

مسحوق اصفر يحصل من فعل الحوامض المعدنية بالنشاء وهو يستعمل للصق لفائف الجبار في الكسر والخلع

## مزيج لاصق

دكسترين	٣٠ در
روح الكافور	" ٢٠
ماء سخن	" ١٢

حرك الكل حتى يصير المزيج بنوام العسل المائع وبل به الرفائد المراد التجبير بها

## ديجنال

نبات يستعمل منه الورق وهو يحنوي على ملح اسمه  
 الديجنالين عليه مدار الفعل  
 خواصه: مدر البول يخفف فعل القلب ويطيء النبض  
 ويجرعة كبيرة يحدث غمياً. يعطى في علل القلب واغلفته ومدرراً  
 للبول في الاستسقاء

## المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ١ الى ٢ در
" المتوسطة	" ١٠ " ٢٠ قم
" الصغيرة كالكلاب	" ٢ " ٦ "

## معجون الديجنال

محقوق الديجنال	٢ در
طحين	١٥ "

يجبل بالعسل ويعطى في الحصى التيفويدية

## منقوع الديجنال

ديجنال	٥ در
ماء سخن	٥٠٠ "

انفع وعند ما يبرد يعطى كل ثلاث ساعات الربع في الاستسقاء



## ذباب هندي . ذراح

ويقال الذرنوح وهي زيزان طولها ٨ خطوط الى ١٠ لونها  
الخارجي اخضر راسها كريمة وهي تحتوي على مادة اسمها ذراحين  
عليها مدار الفعل

خواصه : منقط وقد ينقص ويدر البول واحيانا يحدث  
عن امتصاصه بول الدم . ولا يستعمل الا من الظاهر لتخفيف  
الجلد او لعمل الحرايق

### مرهم منقط

٢٠٠ در	محقوق الذباب الهندي
" ٦٥	محقوق الفريون
" ١٢٠	قلقونة وزفت اسود من كل
" ١٠٠	شمع اصفر
" ٤٠٠	زيت زيتون

ذوبه الراتنج والزفت والشمع ثم اصف الزيت والمسا حيق  
وداوم التحريك حتى يبرد المزيج . يدهن به عند ما يبراد التنقيط

### زيت الذراح

٣٠ در	محقوق الذراح
" ٣٠٠	زيت زيتون

اغل المسحوق بالزيت ثم صفِّ واحفظ لوقت الحاجة.  
يستعمل دهنوناً للتنظيف

### راوند

الراوند جذور عدة أنواع من النبات ينبت في الصين  
وغيرها . وهو يحنوي على مادة يسمونها راوند ين بها فطة  
خواصة : فلما يستعمل للحيوانات الكبيرة وإنما يستعمل للكلب  
ربع درهم منه مثل مقو وثلاثة دراهم كمسهل

### رب الراوند. الصمغ النقطي

ويقال ايضاً الكبوج هو صمغ راتنجي يستخرج من شجر ينبت  
في ملكة صيام ويرد على هيئة انايب مخططة من الظاهر مكسرة  
زجاجي ولونه اصفر ناصع  
خواصة : مسهل طارد مدر الماء يستعمل احياناً في الاسهال  
الزمن والدوسنطاريا

## المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٥ الى ٨ در
" المتوسطة	" ١ " ١٤ "
" الصغيرة	" ١٠ " ٤٠ ق

## رتانيا. كراميريا

جذرنبات ينبت في امريكا وغلاظ الجذر قيراط لونه احمر  
 قاتم او مسمر طعمه حلو قابض  
 خواصة: قابض فعال يستعمل في الاسهال وبول الدم  
 شرباً وحقناً

## المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٦٠ الى ٨٠ در
" المتوسطة	" ١٠ " ٢٠ "
" الصغيرة	" ٣ " ٦ "

## رمان

الرمان شجر معروف والمستعمل منه قشر جنوره تغلى  
 كثيراً بالماء او تسحق وتجبيل بالعسل

خواصة: طارد الدود قلما يعطى للكلاب لانه يحرض فيها القي  
المقادير

لحيوانات الكبيرة	من ٥٠ الى ٦٥ در
" المتوسطة "	" ١٥ " ٣٠ "
" الصغيرة "	" ١٠ " ٢٠ "



### زئبق

الزئبق معدن سائل ابيض لماع يتصاعد بالحرارة. ويتكون  
منه عدة املاح

خواصة: لا يوهثر الزئبق السائل في الجسد الا اذا تاكسد فامتص.  
ريوثر ايضا اذا تجزأ جداً ثم فرك به سطح الجلد او اخذ من الداخل  
وهو مضاد الالتهاب محلل يقتل الهوام المختلفة التي تنمو على الجسم  
ولا يجوز اعطاء الزئبق للحיות التي تكثر كثيراً من فعله.  
وان افراط من استعماله يحدث مرض يسمونه الفنية الزئبقية مع  
تلعب وفساد اللثة ( نيرة الاسنان ) وتقرح الفم وعلاج هذا  
العرض الاخير كلورات البوتاس شرباً  
مرهم الزئبق القوي

" ٥٠

شم خنبر

تسحق في هاون من رخام او صيني او زجاج حتى ثلاثي  
كريات الزيت تماماً

يستعمل دهنونافي الاحتقانات المزمنة والالتهابات الفلغيمونية  
والحمرة والتهاب البريتون ولقفل الهوام الجلدية

### زيت ترينينا

زيت يقطر من راتنج نوع من الصنوبر وهو عديم اللون مائي  
النوام ورائحة تقرب من رائحة الصنوبر وهو قابل الاشتعال  
خواصة : دهناً من الظاهر مهيج يولم الخيل جداً ومن  
الباطن مضاد الاعتقال ومدر للبول وبخرة كبيرة بسهل وبطرد  
الدود وأكثر استعماله للتخليل والتحويل في الحوادث التي تستدعي  
سرعة الفعل وهو مفيد في العمل التيفويدية والغنغرينية  
المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ١٠ الى ١٥ در
" المتوسطة	" ٢ " ٠٤
" الصغيرة	" ١ " ٢

## مشروب مانع من الفساد

زيت التريتينا	٢	در
صبغة خشب الكينا	٦	"
خمر	١٥٠	"
ماء	١٥٠	"

يعطى في العلل التيفويدية والغنغرينية .

## مروح مهيج

زيت تريتينا	٢٠	در
روح النشادر	٨	"
سيرنو	٤٠	"

امزج : يفرك به في ورم المفاصل وزيفاتها الحاد المزمن



## زيت الخروع

زيت يستخرج عصراً من بزر الخروع الذي ينبت في سوريا  
وسائر المشرق

خواصه : مسهل لطيف لا يهيج الامعاء ويفضل اعطاؤه في  
الغص صرفاً او مضافاً اليه ايثر كبريتيك او خمر الافيون ولب  
بزر الخروع مسهل فعال يعطى منه من ربع درهم الى درهم ونصف

للخنازير ومن درهين الى ستة للحيوانات الكبيرة

مشروب ضد المغص

زيت خروع	١٥٠ در
اثير كبريتيك	١٢ "
خمر الاقوين	٥ "

يعطى في نوبة المغص على دفعة او دفعتين في منقوع البابونج بارداً

## زيت السمك

يستخرج هذا الزيت من كبد نوع من السمك اسمه المور  
ومن غيره ايضاً. وهو نوعان ابيض واسمر. ويفضل الاسمر  
لاحتوائه على يود وبروم  
خواصه: مغذ يزد خواص الدم ويفيد في مرض الكلاب  
والامراض الضعفية

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٢٠ الى ٥٠ در
" المتوسطة "	" ١٠ " ٢٠ "
" الصغيرة "	" ٥ " ١٠ "

## ساليسيلات الصودا

ملح ايض حلو الطعم قليلاً يذوب في الماء . يعطى في  
الاجاع الحرارية

### المقادير

لحيوانات الكبيرة	من ١٠ الى ١٢ در
" المتوسطة "	" ١ " ٢ "
" الصغيرة "	" ٢ " ١ "



## السيرتو . الكحول

ويقال له روح الخمر وهو يستخرج من السوائل التي قد تم  
اختارها كالنيذ وغيره وذلك بالاستقطار فيحصل من ذلك  
مشروب روحي هو العرق فاذا استقطر ثانية فهو السيرتو المصحح  
هو سيال عديم اللون ورائحته خمرية يختلف ثقله النوعي حسب  
اختلاف تركيزه

يستعمل من الظاهر والباطن ممزوجاً او صرفاً  
خواصه : منبه بكميات قليلة وبكميات كبيرة يستعمل من



الظاهر محلاً وكاويًا ومن الداخل لا عانة الهضم وفي العلل  
التيفويدية ممزوجاً بالعسل أو باللبس

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٤٠ الى ٨٠	در
" للصغيرة	١٠ " ٢٥	
لاكلة اللحم كالكلب والهر	٥ " ١٠	

### سذاب

نبات كريحه الرائحة تستعمل منه الأوراق وهو يحنوي على  
زيت طيار عليه مدار الفعل. ويعمل مشروباً وحقناً وليناً  
خواصه: فعلة الموضعي مهيج ومن الداخل ايضاً وهو يزيد  
مفرزات الرحم ويطرد الديدان

### المقادير من الأوراق طرية

للحيوانات الكبيرة	من ٢٠ الى ٤٠	در
للجئرة الصغيرة	٥ " ١٠	
للخنازير	١ " ٣	

## سرخس ذكر

ويعرف بالخنشار نبات ينبت في المحلات المظلمة الرطبة  
والمستعمل منه الجذر. يعطى مسحوقاً ومججناً أو مغلي أو حيوانياً  
خواصة: ضد الدودة الوحيدة يمينها ويعين على اخراجها  
وبعد ساعتين يعقب بمسهل من زيت الخروع

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٦٠ الى ٨٠ در
" المتوسطة "	" ١٠ " ٢٠ در
" الصغيرة "	" ٥ " ١٠ "



## سنامكة

السنا ورق نبات اخضر باهت حلو الطعم . خاصيته  
الاسهال ويستعمل مغلي بالماء

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٤٠ الى ٥٠ در
" المتوسطة "	" ١٠ " ٢٠ "
" الصغيرة "	" ٢ " ٥ "

## مشروب مسهل للنخيل

سنا مكة	٦ در
راوند	" ٦
كبريتات الصودا	" ٦٠
ماء	" ٣٠٠

اغل السنا والراوند بالماء ثم صف واضف الكبريتات

## مشروب مسهل للبقر

سنا مكة	٢٠ در
كبريتات الصودا	" ١٥
ملح بارود وملح طرطير من كل	" ٢
ماء	" ٣٠٠

اغل السنا ثم صف واضف الاملاح واعط فانرا



## سنتونين . ملح خراساني

ملح ابيض يستخرج من ازهار نبات يعرف بالخراساني وهو طارد للديدان للكلاب والهررة وجرعته للكلب من قحئين الى ٤ وللهر من نصف الى قحمة ويعقب بمسهل من زيت الخروع

## سنديان . شجر البلوط

شجر معروف والمستعمل منه فشر الخراعيب، وخواصه من  
الظاهر والباطن القبض يعطى في الاسهال شرباً وحقناً وغسولاً  
على الفروح الدامية

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٥ الى ٢٠	در
" المتوسطة	" ١ " ٤	"
" الصغيرة	" ٠.٢ " ١	"

يعطى مغلياً او مسحوقاً او معجوناً بالعسل



### شمار . شجرة

هو بزر نبات ينبت في اماكن كثيرة من اوروبا واسيا  
خواصه : طارد الريح يعطى في النفخة الحادثة عن سوء الهضم  
وجرعته من ١٠ الى ٣٠ درهماً  
ويستعمل لطرد الريح ايضاً الكمون والكزبرة والكرويا

## شوكران

نبات ينبت في اراضي البور والمستعمل منه البذر والورق  
 خواصة: مخدر ومحلل فلما يستعمل في الطب البيطري الا لزقا  
 لزقة الشوكران

من مسحوق ورق الشوكران جزء. ومن الطحين جزء. اعجن  
 بماء واعل لزقة. تستعمل لتحليل التهاب الضرع



## صابون

الصابون مؤلف من زيت الزيتون والصودا. يستعمل في  
 الطب البيطري حمالاً لعدة مواد دوائية. استعماله من الخارج  
 وخواصة محلل

## صابون نشادري مكوفر

١٠ در	صابون محنوت
" ٢	روح النشادر
" ٨	كافور
" ٤	زيت الصندر

زيت حصى لبان " ٢

سبيرتو " ٨

ذوب الصابون والكافور في السبيرتو ثم اصف المواد  
الآخر يستعمل فركا في الاورام والرضات القديمة

### صابون للجرب

زيت زيتون ١٠٠ در

حنات الصابون " ٤٠

كبريتور البوتاس " ٢٠

ذوب الصابون والكبريتور في قليل من الماء ثم اصف  
الزيت واخط الكل جيدا

### صابون زرنجى

زرنج ابيض ١٠٠ در

كربونات البوتاس " ٤٠

ماء مقطر " ١٠٠

حنات الصابون " ١٠٠

كلس حي " ١٢

كافور " ٢

اغل الزرنج والبوتاس في الماء الى ان تذوب الاملاح ثم  
اضف الصابون وبعد ذوبانه الكلس والكافور  
وهذا الصابون نافع في الجرب والحكة وسائر الامراض الجلدية

## صبر

الصبر عصير نباتات وهو نوعان بربادي وسفطري. وهو  
كتل صفراء مائلة الى السمرة طعمه مرّ جداً يرتخي بالحرارة يذوب  
في السيرنو وقليلاً في الماء

خواصه: دهناً بصغته من الخارج ينبه الجروح والقروح  
ومن الداخل مسهل حريف يستعمل في سوء الهضم والاسهال  
وعلم انتظام الاجترار واليرقان والدوار

## المقادير

من ٤٠ الى ٥٠ در	للجذرة الكبيرة
" ١٠ " ٥ "	" الصغيرة
" ٢٠ " ٢٠ "	لذوات الحافر
" ٢ " ٢ "	للخنازير والكلاب

## صبغة الصبر

٨ در

صبر مسحوق

" ٦٥

سيرنو

ذوب واحفظ . يستعمل دهناً على القروح والجروح

القديمة

## طرطرات البوتاس الحامض . ملح الطرطير

مسحوق ابيض اذا كان مسحوقاً . طعمه حامض ينوب قليلاً في الماء

خواصة : مبرد ومسهل لطيف يستعمل في التهاب الامعاء والعلل التيفوئيدية واليرقان

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٥٠ الى ٨٠ در
" المتوسطة "	" ٢٥ ، ٤٥ "
" الصغيرة "	" ١٠ " ١٥ "



## طرطير مقي . طرطرات البوتاساوالانتيمون

هو ملح ابيض طعمه حريف ينوب في الماء . يستعمل من الظاهر مرهماً وغسولاً ومن الباطن مذاباً بالماء  
خواصة : من الظاهر على هيئة مرهم ينفظ القسم الذي يدهن به ومن الداخل مقيء او مسهل حسبما يكون الحيوان الذي



يشربه من الحيوانات التي تبقى أولا. وهو ايضا مبول ومحط  
النبض ويقلل عدد التنفسات

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٢ الى ٥	در
" المتوسطة	" ٢٠ " ٤٠	م
" الصغيرة	" ١ " ٤	"

### مرهم منقط

طرطير منقوع	محموق جدا	در ٨
شم خنبر		" ٢٤
اخطا جدا		



## عسل

مفرز سكري يفرزه النحل . يستعمل حمالا لعدة مواد دوائيه  
خواصه : معهل قليلا وقد يستعمل ليجأ على العين والضرع والقوائم  
لتخفيف الالتهاب



## عنص

العنص تولدات على خرا عيب نوع من السنديان مسيبة عن وضع بيض  
دوية صغيرة . وهو كروي بعضه ازرق والبعض الآخر ابيض ومجنوي على  
حامض نيك وحامض عنصيك وعليها مدار فعلا

خواصة : أشد المواد قبضاً يستعمل مسحوقاً وغسولاً على الجروح المزمنة والاحتمانات

## عنصل . بصل الفار . اسقيل

هو بصل نبات ينمو على الشواطئ البحرية . حجمه من حجم الليمونة الى حجم البطيخة مؤلف من حراشف كالبصل المعتاد  
خواصة : اذا وضع على الجلد طرياً نفضته . وان جفف واعطي من الداخل فهو مدر للبول منفض . يعطى على هيئة مسحوق او صبغة او سكبجين

### المقادير من المسحوق

من ٢ الى ٥	در	للحيوانات آكلة النبات
" ١ " ٤ "	"	للجيرة الصغيرة
" ٤ " ١٠	قم	للكلاب والهررة

### سكبجين العنصل

من ٥٠	در	من خل العنصل
" ١٠٠	"	عسل

اغل حتى يصير بقوام الشراب . يعطى منه قدر ٢٠ درهماً ثلاث مرات  
بالنهار كمنفض في الاسعال الجاف

### خل العنصل

١٠	در	عنصل جاف
" ١٢٠	"	خل

انفع واحفظ لعمل السكبجين المتقدم ذكره

## قالريانا . حشيشة الهر

نبات يثبت في اماكن شتى من اوروپا والمستعمل منه جذره وهو يخزنوي  
على زيت طيار وحامض قالريانيك وعلوه مدار فعله  
خواصة : منه ومضاد الاعقال والشيخ والصرع واكثر الامراض العصبية  
يعطى محضوقاً ومنقوعاً وحقناً ومهروناً

### المقادير

لهيوانات الكبيرة	من ٢٠ الى ٤٠ در
" المتوسطة "	" ١٠ " ٥ "
" الصغيرة "	" ٣ " ١ "

## قرمز معدني

القرمز المعدني مزيج كبيرهين واول اكسيد الاتيميون الهيدراتي ومن  
محمق بني اللون عديم الرائحة لا يذوب في الماء  
خواصة : مقوي . مفتت . معرق . يستعمل في ذات الرئة وعمل الشعب  
اي النصبه

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ١٠ الى ٢٥ در
" المتوسطة "	" ٣ " ١ "

« الصغيرة « « | «

مشروب منفث

در	٦	قرمز معدني
»	٦	محموق جذر السوس
»	٣٠	عسل
»	٦٠٠	ماء

يعطى على دفعتين للفرس والبئر



## فريون

هو صمغ راتنجي يرتفع من عدة نباتات في جزائر كناريا ويستعمل من  
الظاهر مرهاً ومروحاً وهو محرق قوي يدخل في المروخات المحرقة فيزيد فعلها  
كثيراً

## لزقة محبرة

فريون محموق ٢٠ او ٣٠ درهما تذر على عجينة شعير مدود على خرقة  
وتوضع على الحبل المراد تحميمه

## مروخ محرق

در	١٠٠	زيت زيتون
»	٢٠٠	زيت التريبتينا
»	١٠	محموق الفريون
»	١٠	محموق الدباب الهندي

سخن المساحق بزيت الزيتون ساعين على نار هادية ثم نزل عن النار واذف زيت التريبتينا

وهذا المروخ يستعمل في التمدد الزلالي الذي يحصل في قوائم الخيل وما يفضل على الكي بالنار هو كونه لا يمنع نبت الشعر في الحبل الذي يدهن به

### مروخ آخر

فريون مسحوق	٨٠	در
ذراح مسحوق	٨٠	"
زيت كنان	١٠٠٠	"
زيت تريبتينا	٦٥٠	"

اغل المساحق بزيت الكنان واتزل عن النار وعندما يبرد المزيج اصف عليه زيت التريبتينا

وفعل هذا المروخ كالذي قبله ويستعمل للتقريق وتحليل الاورام الزلالية

### مروخ ثالث

زيت زيتون	٦٣٠	در
قطران	١٥	"
مسحوق الذراح	١٦	"
مسحوق الفريون	١٦	"
بترين	٨٠	"

سخن الاجزاء الا البترين ولا تضعها الا عندما يبرد المزيج تمامًا ويقال للمروخات الثلاثة في العرف المتداول نار سائلة لانها تكوي كالنار بدون ان تمنع نبت الشعر ثانية

## قطران

هو سبال اسمر مسود رائحة خاصة يستحضر بالنظير من خشب الصنوبر  
 الغاني وغيره من جنس الصنوبر  
 خواصة : يستعمل في علل الصدر والاعضاء التناسلية البولية مدراً للبول  
 ومائناً للفساد . ومن الظاهر في علل الجلد والحافر

## المقادير

للحيوانات الكبيرة	من	١٠	الى	٢٠	در
" المتوسطة	"	٢	"	٥	"
" الصغيرة	"	١	"	٢	"

## مرهم القطران

قطران	٢٠	در
شم خنزير	٢٠٠	"
امزج . دهناً في امراض الجلد		

## ماء القطران

قطران	٢٠	در
ماء	٢٠٠	"

امزج . يعطى من الداخل في امراض الصدر كل يوم ثلث او نصف الكمية  
 المذكورة

## قطران مكربل

قطران	٢٠٠	در
-------	-----	----

حامض كربوليك ٢٥ "   
 امزج . دهناً في امراض الحافر

## كافور

الكافور زيت طيار جامد يصعد بالاستقطار من خشب نبات يعرف  
بشجر الكافور . وهو اقراص او قطع بيض صلبة عسرة السطح (مالم يضاف اليها  
قليل من الصيرتو او الاثير) رائحة خاصة يذوب في السبترتو والزيت وقليلاً  
جداً في الماء

خواصه : ممكن مجموع العصبي مانع الفساد طارد الدود مضاد الاعتقال  
والامراض التنفسية . ومن الخارج تدلك به الاحتفانات والمفاصل المؤلمة  
والمواضع المتبسة والقروح المتعفنة

## المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٢ الى ٥ الى ١١	در
" الصغيرة	" ٠.٤ " ١ " ٢	"
للخنازير	" - " ٤ " ١٠	"
للكلاب	" ٥ " ٤٠	قم

## روح الكافور

كافور	٨	در
سبترتو	٤٠	"

ذوب . يمتعل مروحاً في الرضات وزيفان المفاصل

## زيت الكافور

٨ در  
٤٠ "

كافور  
زيت

ذوب في هاون . دلكا في المفاصل

## مرهم الكافور

٨ در  
٣٢ "

كافور  
شمع خنزير  
امزج . دهنا كالسابق

## كبريت

المستعمل هو الكبريت المحروق المغسول ويعرف بزهر الكبريت وهو  
محروق اصفر عديم الطعم والرائحة مالم يحترق فيحتفظ نضدا منه رائحة الحامض  
الكبريتوس

خواصه : من الداخل منبه الاغشية المخاطية واذا اعطي بمحركات كبيرة  
يسهل . يستعمل مفتحا ومعرقا في علل الشعب والرتة . ومن الخارج دهونا في  
الامراض الجلدية المزمنة كالجرب والحكة والسفة

## المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ١٠ الى ٢٥ در
" المتوسطة	" ٢ " ٥ "
" الصغيرة	" ١ " ٣ "



## مرهم الكبريت

٤٠ در

زهر الكبريت

" ١٢٠

شم خنزير

امزج في هاون . وان اضيف اليه ٢٠ درهما من كربونات اليوتاس  
يكون افعل

## معجون الكبريت

١٥ در

زهر الكبريت

" ١٠٠

معحوق جذر السوس

سكجيين العنصل ما يكفي لجعل المعحوق معجوناً . يعطى للتنفيس اي لتفطيع  
البلغم في الامراض الصدرية



## كبريتات الالومين واليوتاس . الشب الابيض

هو بلورات شفافة بيضاء طعمها حامض حلو قابض وتوجد في الصيدليات  
على هيئة بلورة ومحرقة اي مكلسة

خواصة : الشب الذي ابي غير المحروق قابض يستعمل غسولاً على الالتهابات  
والمحروق ولقطع الدم والانتزعة وان مزج ببياض البيض يعمل لصوقاً للجيار  
والشب المحروق يستعمل ذروراً لكي المحروق والقروح والنواصير

## معجون الشب الابيض

٢ در

معحوق الشب الابيض

" ٢٠

معحوق قشر السنديان



## معجون مقوي

در	١٢	محقوق جذر الجبطينا
"	٦	" خشب الكينا
"	٢	كربونات الصودا
"	٢	زاج فني
		نجم المواد بعسل او دبس . يعطى مغوياً في اللؤلؤ النفوذية



## كبريتات الزنك . ملح الخارصين

ويعرف بلخ التوتيا . بلورات تشبه بلورات الملح الانكليزي تذوب في الماء البارد . طعمها قابض حريف . يستعمل من الخارج غسولاً وحفناً وقطوراً خواصة : قابض شديد

## حقن ملح التوتيا

در	٢	كبريتات الزنك
"	٢٠٠	ماء

حفناً في المناخر في الزكام المزمن والحاد

## محقوق ملح الزنك المركب

در	١٠	كبريتات الزنك
"	١٥٠	كبريتات الحديد
"	١٠	ملح الشادر
"	١٠	أكسيد النحاس
"	١٥٠	شبه ابيض

اصنع المواد وامعها على النار ثم صيها اقراصاً واصنعها عندما تبرد .  
يستعمل مذاباً بالماء على الرضات وقروح الفلاند



## كبريتات الصودا

بلورات بيض تشبه بلورات الملح الانكليزي طعمها مالح مرتدوب في الماء  
البارد قليلاً وفي الصحن كثيراً  
خواصها : مسهل لطيف كثير الاستعمال في طب الخيل  
المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ١٥٠ الى ٢٥٠ در
" المتوسطة "	" ٢٠ " ٥٠ "
" الصغيرة "	" ١٠ " ٣٠ "

مشروب مسهل للمهاري

كبريتات الصودا	٤٠ در
عسل	" ٤٠
ماء	" ١٥٠

امزج . يعطى في التهاب المفاصل عند حدوث العلة

## كبريتات الكينين . ملح الكينا

ملح ابيض على هيئة بلورات ابرية طعمها مرّ جداً قلما تدوب في الماء مالم  
يحض قليلاً بالحمض الكبريتيك

خواصها : توقف الامراض المنقطعة والامراض العصبية وبعض الامراض الالتهابية . وتعرض انقباضات الرحم العضلية وقت الوضع . تعطى مذابة بالماء او حبوباً

## المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ١ الى ٢	در
" المتوسطة	" " "	"
" الصغيرة	٥ " ١٠	م

## كبريتات المغنيسيا . ملح انكليزي

بلورات عديدة اللون صغيرة ابرية تذوب في الماء البارد طعمها مرّ مالح قليلاً  
خواصها : سهل يناسب في معالجة الحميات . تعطى مذابة بالماء

## المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٦٠ الى ١٥٠	در
" المتوسطة	" ١٥ " ٤٠	"
" الصغيرة	" ٨ " ١٥	"

## كبريتات النحاس . الشب الازرق

هو بلورات زرقاء شفافه طعمها قابض تذوب قليلاً في الماء البارد وكثيراً في الماء الساخن . يستعمل من الخارج مسحوقاً ومحلولاً قليلاً يستعمل من الداخل

خواصة: من الظاهر كاي مستحسن للفروج القديمة وفي مرض الجذام  
ووخز القدم وعقر السرة . وحقاً في النواصير القديمة على هيئة محلول قيثاني

### محلول قيثاني

شرب اذرق	٢٠	در
خلات الرصاص	٢٠	"
ملح التوتيا	٢٠	"
خل ابيض	٢٢٠	"
ذوب واحفظ لوقت الحاجة		

## كبريتور الانتيمون الاسود . الاثمد

هو مسحوق باوري رمادي فولاذي اللون . وهو مفيد مسهل معرق يخفف  
دورة الدم . يعطى في امراض الصدر والشعب المزمنة

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ١٠ الى ٢٠	در
" المتوسطة	" ٢ " ٤	"
" الصغيرة	" ١ " ٢	"

### معجون معرق

كبريتور الانتيمون	٥	در
مسحوق زهر البانونج	١٠	"
عمل . قدر كافٍ لجعل المزيج معجوناً		

## كبريتور البوتاس . كبد الكبريت

كل صفراء مخضرة راتحتها كريهة مثل راتحة البيض المذير . يستعمل خصوصاً من الظاهر مغاطس وغسولاً وحقناً في الامراض الجلدية

## مغطس كبد الكبريت

كبد الكبريت	٦٠	در
ماء	١٢	اقعة

ذوب

## كرومات البوتاس

كرومات البوتاس المستعمل في الطب البيطري بلورات حمراء برتقالية يعمل مراه للتخيل ولا يعطى من الداخل

## مرهم كرومات البوتاس المركب

كرومات البوتاس	١	در
بودور البوتاسيوم	١	"
مرهم الزئبق القوي	١٠	"

اخط جيداً في هاون زجاج اوصيني . يستعمل دهناً في الاورام المتعظمة

## كلس

يستعمل الكلس المطفأ من الظاهر كاوباً ومن الداخل بمص الغازات من

المعدة وينقبض الامعاء

## المقادير من ماء الكلس

٢٠٠	در	للحيوانات الكبيرة
٥٠	"	" المتوسطة
٢٠	"	" الصغيرة

## ماء الكلس

٨	در	كلس مطناً
٢٠٠	"	ماء العادة

يعطى رائحة

## مرهم الكلس المقطرن

٨	در	كلس مطناً
٢٠	"	قطران
٢٠	"	ترشينا
٢٠	"	شم

اخط . يستعمل في امراض الجلد المرافقة باكلان وفي مرض المياتن  
والمرض الضفدعي والقروح والجروح . وان خلط الكلس ومحمق الفم بالشحم  
واستعمل دهناً ينفع كثيراً في امراض الجلد

## كلورات البوتاس

بلورات صفيحة شفافة طعمها مبرد تذوب في ١٦ جزءاً من الماء واذا سحق  
في هاون مع كبريت تنفرقع بقلة  
خواصة : مبرد مبول ويؤثر في الاغشية المخاطية فيعمل غرغرة وغسولا  
للحم في التهاب وفي القلاع والحنثاق وحنثاً في المناخر في الزكام المزمن



## المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٢ الى ١٠	در
" المتوسطة	" ١ " ٣	"
" الصغيرة	" ٠.٤ " ٠.١	"

## كلورور الحديد

اعلى كلورور الحديد سيال اصفر محمر طعنة قابض يستعمل من الباطن ومن الظاهر صرغاً ومزجاً بماء  
خواصة : فعلة الوضعي قابض يقطع نزف الدم ويمنع الفساد وشراباً يقطع  
الاتزقة الدموية ويقوي

## المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٢ الى ٥	در
" المتوسطة	" ١ " ٤	"
" الصغيرة	" ٠.٤ " ٠.٢	"

## كلورور الزنك . زبدة التوتيا

ملح ابيض ينع في الهواء . كاي يحصل من فعلة خشكر يشة صلبة واكثر استعماله لازالة الاورام الغير الموثلة

## معجون كاي

كلورور الزنك	٨	در
طحين	١٦	"

امزج واتجن بقدر كافٍ من الماء ليصير المعجون شديد القوام . يدهن به  
الحل بعد ازالة الشعر عنه

## اول كلورور الزئبق . كالومل . زئبق حلو

محقوق اميض عدم الطعم والرائحة . يستعمل من الظاهر ذروراً ومن  
الداخل حبوباً ومجوناً  
خواصه : يزيل ضبابة العين كحلاً . ومن الباطن منوع وبكميات كبيرة  
مسهل طارد الدود . نافع في برفان الكلاب

### المقادير

لذوات الحافر	من ١ الى ٢ در
للجمرة الكبيرة	٢٠ " ١ "
" الصغيرة	" ٤ " ٦ ق
للخنازير	" ٣٠ " ٢٥ "
للكلاب	" ٥ " ٣٠ "

ويعطى بالوزن ثلاثة امثال من المقادير المذكورة اذا اريد الاسهال

### مسهل للفرس

كالومل	٢ در
زيت الكتان	٢٠ "
امزج . يعطى دفعة واحدة	

منجج لليرقان في البقر

كالومل	٢٠ ق
--------	------

افيون ٢٠ " امزج . يعطى الصبح . ثم يكرر اعطائه ثاني يوم وثالث يوم

مسهل للكلاب

كالومل ٦ ثم مسهوق الجلبا ٥ در

امزج . يعطى في مرقة اللحم دفعة واحدة

## ثاني كلورور الزئبق . السليمانى

ويقال السليمانى الاكال ملح ايض عدم الرائحة كاي سام جداً يندوب في الماء والسيرتو يستعمل من الظاهر ذروراً ومحللاً ومرهماً ومن الداخل حبوباً ومدوباً

خواصة : من الظاهر كاوشديد ينص احياناً الى الداخل فيسم خصوصاً في الحيوانات المجترة . نافع من امراض الجلد وقاتل الهوام يستعمل في قروح الاذن ولورام البثرة وتحليل الاحفقات وغسولاً على الجلد في الحكنة . قلما يستعمل من الباطن

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ١٠ الى ٢٠ در
" المتوسطة	" ٠١ " ٠٢ "
" الصغيرة	" ٠٠ " ٠١ "

### الماء الاكال

٢٠ قم

سليمانى

٢٠٠ در

ماء الكلس

امزج . يستعمل في امراض الجلد القوباوية

غسل السليمانى

٢٠ قم

سليمانى

٢٠٠ در

ماء مقطر

امزج . نافع في الحكاك الشديد الذي يلجى الحيوان الى تمزيق جلده

سيال فان سوينين

٢٠ قم

سليمانى

٢٠ در

سيرنو

٢٠٠ "

ماء مقطر

ذوب . يستعمل شرباً من ٦ الى ١٥ درهماً في قدر كوبة ماء

## كلورور الكلس

مستحق ايض في الهوام رائحة خراقة طعنة حريف لذاع يذوب في الماء  
يستعمل من الظاهر مذاباً بالماء غسولاً وحقناً في السيلانات المزمنة وتسوس العظم

والجروح المتعفنة

خواصة : مانع الفساد مطهر الهوام بوضع منه في المرباط في زمن الاوية

للقاية منها

## كلورور الصوديوم . ملح الطعام

هو الملح المألوف يعطى مذكوراً على العليق ومذاباً بماء وحقناً

خواصة : منه متوي يعرف على المضم اذا دُر منه ١٠ دراهم على العليق  
المرطب قليلاً بماء

### حقنة الملح

٢٠ در

٦٠٠ "

من ملح الطعام

مغلى بزر الكتان

تعطى في المفص

## كلوروفورم

سيال عديم اللون ثقيل طيار رائحة اثيرية وطعمه حلو بدوب قليلا  
في الماء

خواصة : اذا اخذ داخلا يجدر ونضاد الاعتقال والتشنج وقد يستعمل  
نشوقا في امال العصية والدوار الثاني . والجرعة من ٣ الى ٥ دراهم ممزوجة  
بعسل

## كوسو . الحشيشة الحبشية

رووس وازهار نبات ينبت في بلاد الحبش  
خواصة : تطارد الدود خصوصا من الكلاب . يعطى على الثراغ صباحا من  
دريهن الى ٦ للكلاب في ماء او مرقعة لحم

## كوكلان

حب شجرة تعرف بشجرة الكوكلان يحنوي على زيت طيار ورائحة ومادة مرة  
يستعمل من الداخل معجوناً او مخلوطاً بالعليق

خواصة : منه مغر مدر للبول . نافع في علل الامعاء وخصوصا علل الكبد

### المقادير

للموانات الكبيرة	من ٢٠ الى ٤٠ در
" المتوسطة	" ٥ " ١٠ "
" الصغيرة	" ٢ " ٦ "

## كولشيك . خانق الكلب

ويقال له زعفران المروج نبات يستعمل منه فروم و زره وهو يحوي على  
فيراترين وكولشيسين وهما مادتان سامتان عليها مدار فعله . يستعمل فركا  
على هيئة صبغة ومن الباطن ومنقوعا او مرسا بماء  
خواصة : مهيج مدر للبول مخدر نافع في الاحقنات والاسنفاء والعلل  
الحذارية اي التشيك

### المقادير

للموانات الكبيرة	من ١ الى ٤ در
" المتوسطة	" ١ " ٢ "
" الصغيرة	" ٢ " ٥ قم

### صبغة الكولشيك

كولشيك	٨ در
سيبرتو	" ٢٢ "

انتع ٨ ايام ثم صف واحفظ لحين الحاجة . مسكن الم الحذر

## كولوديون

سعال بقولم الشراب . يلفصق بشدة . يستعمل لضم الجروح ولتبع الهواء  
عن الانتفاخ الحاصل في الحمرة وحروق وتشقق الجلد ولقطع الانزفة من  
الجروح

## كولوديون قاطع الدم

كولوديون ١٠ در  
حامض كربوليك ١ "  
امزج . يقطع دم الجرح حالاً ويقرب شفائه ويحسن حالة

## اعلى منغنيات البوتاس

بلورات ارجوانية قائمة ابرية طعمها حلو قابض . ويلون مقدار قليل منه  
مقداراً كبيراً من الماء لوناً ارجوانياً . لا يستعمل الاغسولاً وقد اشاروا به في لدغ  
الافعى

خواصة : يوقف الاختثار ويصلح الرائحة الردية والخواص المضرة في المواد  
المتحللة

## نترات البوتاس . ملح البارود

كتل بلورية شفافة مخططة طعمها مبرد تذوب في الماء . يستعمل من  
الداخل مثلاً بماء

خواصة : حسب المقدار المعطى . فهو مهيج مقيى مبول مسكن دوران الدم  
وبجهرات كبيرة بفعل بالمجموع العصبي فعل المخدرات الحريفة مثل البلادونا  
وما شاكلها . يعطى في قبض الامعاء ولا درار البول في الارتشاحات المصلية وفي  
المحدر المنصلي اى التشبيك

### المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٠٥ الى ١٠ در
" المتوسطة	" ٠٢ " ٠٣ در
" الصغيرة	" " ٠٤ "

### مشروب مسهل مدر للبول

ملح بارود	١٠ در
كبريتات الصودا	٦٠ "
ماء	٤٠٠ "

امزج . يعطى كل ست ساعات النصف

### نترات الفضة . ازوتات الفضة

ويعرف بحجر جهنم . بلورات عديمة اللون غير انة يعمل على هيئة اقلام  
بيض او سود فيعرف اذ ذاك بنترات الفضة المصبوب . يستعمل من الخارج  
كاوياً صرفاً او محلولاً بماء ومن الداخل مثلاً  
خواصة : قابض ومهيج ومنشط او كاو حسب كيفية استعماله يعمل قطوراً  
في التهاب اللحمية والتهاب الاذن ومرها للجروح القديمة وحقناً في النواصير .  
وقد يعطى احياناً من الداخل في الاسهال القديم والامراض العصبية



## المقادير

للميوغات الكبيرة	من ١٠ الى ٢٠	قم مثابة في ٦٠ در ماء
المتوسطة	" ٣ " ٤ "	" " ١٥ "
الصغيرة	" ١ " ٢ "	" " ٨ "

## مشروب من نترات الفضة

نترات الفضة	٥ در
ماء منطر	" ١٢

ذوب . يعطى منه ملعقة صغيرة ثلاث مرات في اليوم في مرض الخوربا الذي يحصل للكلاب

## قطرة حجر جهنم

نترات الفضة	٢٠ قم
ماء منطر	٣٠ در

ذوب . يقطر منه بمص قطرات في العين الرمدة

## هيدرات الكلورال

بلورات بيضاء شفافة ذات طعم حاد لذاع ورائحة قوية بذوب في الماء والسيرتو . يعطى مشروباً وحنناً

خواصة : يحدث من تهيج موضعي ويحترق التي . ومن الداخل ينوم ويخدر يستعمل في عنة امراض عصبية كالخوربا والتيتنوس ومحلوله بنسبة امنة الى ١٥ ماء دهناً من الظاهر بسكن الالم وحكة الجلد

## المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ٨ الى ١٥	در
" المتوسطة	" ٢ " ٤	"
" الصغيرة	" ٢ " ١	"

## يود

اليود حراشف سود لامعة رائحتها خرافة تذوب في السيرتو والابتر.  
يستعمل من الظاهر على هيئة صبغة ومن الداخل محلولاً أو بلوفاً  
خواصة : من الخارج يكوي القسم الذي يوضع عليه . وحقناً في الاورام  
الزلالية يحدث التهاباً الصاقياً يزيل المرشح منها . ومن الداخل في العلل  
الحنازيرية . ويحطل الاورام

## المقادير

للحيوانات الكبيرة	من ١ الى ٢	در
" المتوسطة	" ١٠ " ٢٠	ق
" الصغيرة	" ٢ " ٥	"

## صبغة اليود

يود	١	در
سيرتو	٤	"

ذوب في هاون زجاج أو صيني . يستعمل دهناً على الجلد أو حقناً في الاورام  
الزلالية

## مرهم محلل

١	در	يود
٤	"	يودور البوتاسيوم
٦٤	"	شمم خنزير

اسحق اليود واليودور في هاون زجاج ثم اصف الشمم. تدلك به الاورام المزمنة

## يودور البوتاسيوم

بلورات بيض طعنها حاد تذوب في الماء. يعطى من الداخل مذاقاً ومن الظاهر دهوناً

خواصة : من الظاهر محلل ومن الباطن يبدد الاورام والاحتقاقات المختلفة يستعمل في ذات الرئة للنفيل وفي الاكثيا المزمنة

## المقادير

١٠	الى	٣	من	للحيوانات الكبيرة
١	"	-	"	" المتوسطة
١٠	"	٥	"	" الصغيرة
تم				

## مرهم محلل

٨	در	يودور البوتاسيوم
٢٤	"	شمم خنزير

اخلط جيداً. تدهن به الاورام القديمة

## يودور الزئبق الاخضر

اول يودور الزئبق . هو مسحوق اخضر مصفر يصير قاتماً اذا تعرض للنور  
لا يستعمل الا من الظاهر مرهاً بنمبة واحدة الى ١٠ ثم خترير وذلك في  
الاكثما المزممة

## يودور الزئبق الاحمر

ثاني يودور الزئبق مسحوق احمر قاني لا يذوب في الماء ويذوب قليلاً في  
الكحول وكثيراً في الاثير وهو اشد فعلاً من اليودور المقدم ذكره . يستعمل  
خصوصاً من الظاهر محلاً في الاورام الزلاية والونرية والمتعظمة والمفصلية على  
شرط استعماله مدة

### مرهم ثاني يودور الزئبق

ثاني يودور الزئبق	٤	در
شمخ خترير	١٠	"

امنح جيداً . بحلل الاورام القديمة

## يودور الرصاص

مسحوق اصفر يذوب في الماء العالي يستعمل مرهاً لتصرف انتفاخ المفاصل  
الخنثري والندد المتضخمة وما شابه ذلك

## مرهم بودور الرصاص

بودور الرصاص ١ در  
 شحم خنزير ٨ "   
 امزج جيداً . لتحليل اورام الغدد والمفاصل

## بودوفورم

اليودوفورم بلورات او حراشف صفراء باهتة لا تذوب في الماء تذوب في  
 السبيرتو والايثر والكلوروفورم والزيوت يستعمل مرهاً بنسبة ١ الى ٨ لتحليل  
 الاورام المولدة



هذا ما استنسبنا حجة في هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير الفائدة ونظن  
 اننا استوفينا فيه مع الايجاز كل ما من شأنه ان يلتفت اليه صاحب الدواب  
 وطبييها في كل الاوقات لكن لا بد لحسن الاخذ به من اعمال فكر ثاقب  
 وفطنة كافية لاننا نحاشبنا التطويل اعتماداً على ذكاء اهل بلادنا  
 وحذق الشرقيين والله الموفق الى سواء السبيل وهو حسبنا  
 ونعم الوكيل

هذا وقد وقع بعض اغلاط من تحريف وتصحيف وابدال وتغيير  
 حركات ونحو ذلك مما لا يخفى على اللطيف فلذلك لم  
 نتعرض لوضع جدول لما والعصمة والكمال  
 لله وحده

## فهرس

وجه	وجه
٤٩ علامات دالة على الصحة	٢ مقدمة الكتاب
٥٤ علامات دالة على المرض	٦ مقدمة في البيطرة
٥٧ الباب الرابع في الامراض العامة	القسم الاول في طبائع الدواب
الفصل الاول الامراض	١٠ الاهلية
٥٧ المخبرية	١٠ الباب الاول في ذوات الحافر
٥٧ اولاً جدري ذوات الحافر	١٠ الفصل الاول في الخيل
٥٨ ثانياً جدري البقر	٢٢ الفصل الثاني في الحمير
٥٩ ثالثاً جدري الغنم والماعز	٢٥ الفصل الثالث في البقر
٦٢ الحمى القلاعية	٢٧ الباب الثاني في الهجرة
٦٥ الحصبة	٢٩ الفصل الاول في البقر
٦٦ الشرى	٣٤ الفصل الثاني في الجاموس
٦٧ الحمى التيفوئيدية	٣٥ الفصل الثالث في الغنم
٧٠ الكلب	٣٩ الفصل الرابع في الماعز
٧٣ ذئبة الخيل اي الخنثان	٤٠ الفصل الخامس في الجمال
٧٦ الصراجة	٤٢ الفصل السادس في الخنزير
٧٨ التيفوس	٤٥ الباب الثالث في آكة اللحوم
٨٠ الجمرة	٤٥ فصل في الكلاب
٨٥ هيضة الدجاج	٤٨ القسم الثاني في الامراض
ذات الرئة التيفوئيدية اي	٤٨ تمهيد

وجه	وجه
١١٧ ذكائر القصة والشعب	٨٦ طاعون البقر
١٢٠ امفيسيا رثوية	٨٨ السقاوة
١٢٢ اللهات	٩٠ مرض الكلاب
١٢٣ نفث الدم	٩٢ الحدار او التشيك
١٢٤ احقان الرئة	٩٥ الداء الخنازيري
١٢٤ ذات الرئة	٩٦ الكساح
١٢٨ البرسام اي ذات الصدر	٩٧ السمل الرثوي في البقر
١٢٩ خققان القلب	٩٩ الدم الاسود
١٣٠ التهاب التامور	١٠٠ انيميا اي فقر الدم
١٣١ التهاب بطانة القلب	١٠١ القرمزية
١٣٢ التهاب نسج القلب العضلي	١٠٢ الدم الايض
الفصل الثالث في علل الكبد	١٠٤ اسر البول
١٣٣ والطحال	١٠٥ سلس البول
١٣٣ اليرقان	١٠٦ سوء الفنية المائية
١٣٤ احقان الكبد	الحب الافرنجي او الداء
١٣٦ ذات الكبد	١٠٧ الزهري
١٣٧ سكتة الكبد ونزقها	١٠٨ الكزاز والفينوس
١٣٨ حصي الكبد	١١١ الخوريا
١٣٩ احقان الطحال	١١٢ الصرع او داء الفتنة
الفصل الرابع في علل البريقون والكلبي	١١٤ الدوار البسيط
١٤٠ والحجاب الحاجز	١١٥ النخلة
١٤٠ التهاب البريقون	١١٦ رعشت الغنم
١٤٢ استسقاء بريوني	١١٧ الفصل الثاني في علل الصدر

وجه	وجه
١٦٧ اسكارس الخيل	١٤٤ الترف الكلوي
١٦٨ اسكارس الخنزير والبقرة	١٤٥ التهاب الكلية
١٦٨ اكسورس دودي	١٤٧ البول الزلالي
١٦٩ ذوات العين الكبدية	١٤٨ بول الدم
١٦٩ التينيا العريضة	١٥٠ فائض الحبل الفقري
الفصل السابع (وهو الثامن)	١٥١ تمزق الحجاب الحاجز
١٧٠ في علل المججمة والدماغ	١٥٢ الفصل الخامس في علل المعدة
١٧٠ فتح جلد الرأس	١٥٤ المنص المصدي
١٧١ كسر عظم المججمة	١٥٤ الفتحة. التطبل
١٧٢ ارتجاج الدماغ	١٥٨ احتقان الكبد
١٧٣ استسقاء الدماغ	١٥٩ ثلبك المعدة
١٧٤ شلل عصب الشفاه	١٤٩ في الدم
١٧٤ احتقان الدماغ	الفصل السادس في علل
١٧٥ التهاب السنج داخل المججمة	١٦٠ الامعاء
١٧٦ الترف الدماغى. اى المكثة	١٦٠ التهاب الامعاء
١٧٧ الدوار الدودي	١٦٣ الزحير
الفصل الثامن (وهو التاسع)	١٦٣ القولنج
١٧٩ في علل العين	١٦٤ انتفاخ الامعاء
١٧٩ الكثرة او الماء الاسود	١٦٥ هبوط المستقيم
١٨٠ الرمد	الفصل السابع (كتب غلط السادس)
١٨١ الرمد الزكامي	١٦٥ واستمر في ما يلي
١٨٢ يياض القرنية	١٦٦ في الديدان
	١٦٧ العلق



وجه	وجه
١٩٨ الفأليل	الفصل التاسع (الصواب العاشر)
١٩٩ عقد اللسان	١٨٣ التهاب الاذن
الفصل الثاني عشر في امراض	١٨٥ قرح الاذن
٢٠٠ العنق	١٨٥ الدود الاذني
٢٠٠ التهاب الغدة النكفية	١٨٦ ذكام الاف
٢٠١ الكواتر	١٨٨ الشخير
٢٠١ التهاب العنق	١٨٩ الجحر
٢٠٣ ناسور العنق	١٩٠ الزكام الغشريفي
٢٠٣ داء الخلد	١٩١ احقان قاعدة القرون
الفصل الثالث عشر في علل	١٩٣ الرعاف في الكلاب
٢٠٣ البلعوم والقصة والمري	الفصل العاشر (الصواب ١١)
٢٠٣ التزلة الباعومية	١٩٣ في علل الفم
٢٠٤ التزلة التذفيرية	١٩٣ خلع الفك السفلي
٢٠٥ انفصام القصة الرئوية	الفصل الحادي عشر
٢٠٦ الاجسام الغريبة في المري	١٩٣ (لثة مكرر)
٢٠٧ تمدد المري	١٩٣ علل الاسنان
الفصل الرابع عشر في آفات	١٩٤ جروح اللسان
٢٠٨ القص والسلسلة	١٩٥ شلل اللسان
٢٠٨ كسر وخلع الاضلاع	١٩٦ الفلأع
٢٠٩ اورام ظاهر الصدر	١٩٧ الترماس
٢٠٩ جرح الغارب	١٩٧ خراج اللسان
٢١١ عقر السرة	١٩٧ جروح الفم
٢١١ انكسار الفقراة	١٩٨ جروح المشفاه

وجه	وجه
٢٢٨ أكرما قوباوية	٢١٢ استسقاء النخاع الشوكي
٢٢٨ الحزاز	٢١٢ تيبس السلسلة
٢٢٩ الجرب	الفصل الخامس عشر في
٢٣٠ جرب الكلاب	٢١٣ التهاب الجلد
٢٣٠ الفراد	٢١٤ ارتثاء احضان الجلد
الفصل السادس عشر في الفتن	٢١٤ الحكة
٢٣١ السري . وعال الضرع	٢١٥ الاكرما البسيطة
٢٣١ الفتن السري	٢١٦ الاكرما البثرية
٢٣٢ التهاب الضرع	٢١٦ استيجو
٢٣٤ قشب الضرع وقشقة	٢١٦ الاكثيا
٢٣٥ سيلان اللبن	٢١٧ الحبرة
٢٣٥ انسداد ثوب الضرع	٢١٩ بميجوس
٢٣٦ ناكل الضرع	٢١٩ قروح الصيف
٢٣٦ سرطان الضرع	٢٢٠ الدمامل
الفصل السابع عشر في عل	٢٢٠ ماء الساقين
٢٣٧ الجهاز التناسلي	٢٢٢ السعفة
٢٣٧ شلل القضيب	٢٢٢ الفرحة الآكلة
٢٣٨ تجميع المادة الدهنية	٢٢٣ الاستسقاء العام
٢٣٩ قائل القضيب	٢٢٥ الحاروسية
٢٣٩ الانعاط المولم	٢٢٥ الفرزية
٢٤٠ جراح القضيب	٢٢٦ الارثيا القوباوية
٢٤٠ التهاب الحشفة والثلمة	٢٢٦ البسورياس
٢٤١ سيلان المني	٢٢٧ بترياس

وجه	وجه
٢٥٩ هبوط الرحم	٢٤٢ التهاب الخصية
٢٦٠ انفراق الرحم	٢٤٣ القيلة المائية
٢٦١ التهاب المهبل	٢٤٤ دوالي الصفن
٢٦١ هبوط المهبل	٢٤٤ القيلة الدموية
الفصل العشرون في علل الذنب	٢٤٥ جراح الخصية
٢٦٢ والقوائم الخلفية	٢٤٦ حرق البول
٢٦٢ جراح الذنب وكسره	٢٤٧ زكام المثانة
٢٦٣ رض وجراح الانفخاذ	٢٤٨ انقلاب المثانة
٢٦٤ كسر عظم الفخذ	٢٤٩ حصي المثانة
٢٦٥ التهاب مفصل الرقبة	الفصل الثامن عشر في علل
٢٦٦ استسقاء المفصل	٢٥٠ الاست والاربيين
٢٦٦ زيغان الرقبة	٢٥٠ المخرج فوق الحالب
٢٦٧ كسر ارقدة	٢٥١ المخرج والرض الاربي
٢٦٨ شلل العصب الفخذي	٢٥١ التقي الاربي
٢٦٨ احتقان ليفاوي	٢٥٢ جروح الاست
٢٦٩ جراح القصة والعرقوب	٢٥٤ الناصب والاسي
٢٧٠ كسر القصة	٢٥٤ الواسير
٢٧٠ انقطاع رباط القصة	٢٥٥ حكة الاست
٢٧١ تورم المابض	الفصل التاسع عشر في علل
٢٧١ تورم العرقوب	٢٥٥ الرحم
٢٧٣ المجاردون	٢٥٠ التهاب الرحم
٢٧٤ الورم الزلاي	٢٥٧ النزف الرحمي
٢٧٦ التميع	٢٥٨ الشبق الحيواني

وجه	وجه
٢٩١ مرض الرشح	الفصل الحادي والعشرون
٢٩٢ التواء الزر	٢٧٧ في علل الابدئي
٢٩٣ الورم المتعظم في القيد	٢٧٧ خراج الكتف
٢٩٣ كسر عظم الاكليل	٢٧٧ ارتشاج دموي
٢٩٤ الجوار الجدي	٢٧٨ شلل عضلة الكتف
٢٩٥ الجوار الوتري	٢٧٩ كسر اللوح
٢٩٦ تشقق الجلد	٢٧٩ زيفان اللوح
٢٩٧ داء الحار	٢٨٠ التهاب الغشاء الزلالي الكتفي
٢٩٨ داء السيم	٢٨٠ الكسر عموماً
٣٠٠ زوائد باطن الحافر	٢٨٣ الخلع عموماً
٣٠١ انضغاط العيين	٢٨٤ استئصال الكوع
٣٠٢ الجوار الغضروفي	٢٨٤ رض وشج الركبة
٣٠٣ وخز صحن القدم	٢٨٤ الورم الزلالي في الركبة
٣٠٥ التهاب الحافر	٢٨٥ توتر الرباط
٣٠٨ المرض الحصوي	الفصل الثاني والعشرون في
٣٠٩ المرض الضفدعي	٢٨٦ امراض القدم
٣١١ فقرح الظلف	٢٨٦ الورم المعروف بالموليت
٣١٢ المرض التبيي	٢٨٧ استسقاء الزر
٣١٣ المرض الكراتي	٢٨٧ اغفروما الزر
٣١٣ رض الحافر	٢٨٨ ورم المدفع
٣١٤ المرض النبلي	٢٨٨ التهاب الغد الحساني
٣١٥ المرض الملالي	٢٨٩ الصكة
٣١٦ حرارة السر	٢٩٠ كسر السلامي

وجه	وجه
٢٣٥ الحمل	٢١٧ سقوط الحافر
٢٣٨ مدارا الحمل	٢١٩ المرض الحلو في
٢٣٨ الاسقاط	٢٣٠ الفنايع
٢٣٩ الوضع الطبيعي	الفصل الثالث والعشرون في
٢٣١ تخلص المشيمة	٢٢١ عوارض مختلفة
٢٣٣ كولا بسوس البئر	٢٢١ لسعة الافعى
٢٣٤ الاكلبسيا	٢٢١ الحروق
٢٣٥ نعر الوضع	٢٢٢ التجلد
٢٣٥ الباب الخامس	٢٢٣ السلق النخمية
في الادوية ومفاعيلها ومقاديرها	٢٢٣ ايزنما
وتراكيبها (وهي مرتبة على حروف المعجم	٢٣٤ الاسعكسيا
كما ترى)	٢٣٤ صرب الحرارة
	الفصل الرابع والعشرون في
	٢٣٥ ما يتعلق بالولادة



٣٠٦٠ م	داخله نمبر
٦٢ ج	فن نمبر

